1879

513
S-26

2010

513
5-26

1908
1881
27

ՏԱՐԵՐՔ
ԵՐԿՐԱՋԱՓՈՒԹԵԱՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

رخصتنامه جلیله نظارت عمومیه معارف
Մե՛ծարժէք է՝ հրահանգ նորերէն է ճեմելեաց բոհոմիական

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ
Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Ա. ՅԱԿՈԲ ՊՕՅԱՃԵԱՆ
1881

Մատենագիտական Ցանկ տախտակը
Բ. Ը. Մ, - Հալէպ Փոստար դ 348
իրատու

57437-ահ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ГОС. Б-КА
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА АРМЯНСКОЙ ССР
2680-41 12002

ՏԱՐԵՐՔ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹԵԱՆ

ԳԻՐՔ Ա·

ՍԿԶԲՈՒՆՔ

Սահմանք։

1· ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹԻՒՆՆ այն գիտութիւնն է որ տարածութիւն չափելու վրայ կը խօսի։


Տարածութիւնն երեք գլխաւոր ուղղութիւն ունի. երկայնութիւն, լայնութիւն եւ բարձրութիւն կամ խորութիւն։

2· Գիծն այն է որ երկայնութիւն ունի առանց լայնութեան կամ խորութեան։

Գծի մը ծայրերը կէտ կը կոչուին. ուստի կէտ մը ոչ երկայնութիւն, ոչ լայնութիւն եւ ոչ խորութիւն, այլ միայն դիրք ունի։

3· Ո՞ւղիղ գիծը երկու կէտերու միջեւը միւսը քաշուած ամենէն փոքր գիծն է։

4· Ամէն գիծ որ ուղիղ չէ, կամ ուղիղ գծերէ բաղկացեալ չէ, կոր գիծ է։



Զորօրինակ, ԱԲ ուղիղ գիծ է. ԱԳԴԲ բեկեալ գիծ կամ ուղիղ գծերէ բաղկացեալ գիծ է. եւ ԱԵԲ կոր գիծ է։


Գիծ բառը, երբ մինակ կը գործածուի, ուղիղ գիծ կը նշանակէ։

3· Մակերեսոյն այն է որ երկայնութիւն եւ լայնութիւն ունի առանց խորութեան։

6. Մակերեսը մակերեւոյթ մ'է որուն վրայ, եթէ որ եւ իցէ երկու կէտերու մէկէն միւսը ուղիղ գիծ մը քաշուի, նոյն գիծը բոլորովին մակերեւոյթին վրայ պիտի կենայ:

7. Ամէն մակերեւոյթ որ մակարդակ չէ կամ մակարդակներէ բաղկացեալ չէ, կոր մակերեսոյթ կը կոչուի:

8. Հապաւոն մաթմին կամ մաթմին կը կոչուի այն որ տարաձուլեան երեք չափումները, այսինքն՝ երկայնութիւն, լայնութիւն եւ խորութիւն ունի:




9. Երբ երկու ուղիղ գիծ, ԱԲ եւ ԱԳ, իրարու կը դպչին, անոնց հակումը կամ բացուածքը անկիւն կը կոչուի: Իրարու դպած կէտը, Ա, անկեան գագաթն է. եւ ԱԲ ու ԱԳ գծերը անկեան կողմերն են:

Անկիւնը երբեմն կը նշանակուի գագաթին վրայ դրուած Ա գրով, եւ երբեմն ԲԱԳ կամ ԳԱԲ երեք գրերով, գագաթին վրայ եղած գիրը միշտ մէջտեղը դրուելով:

Անկիւնք, բոլոր ուրիշ քանակութեանց նման, կրնան գումարուիլ, հանուիլ, բազմապատկուիլ եւ բաժնուիլ:


Զորօրինակ, ԴԳԵ անկիւնը ԴԳԲ եւ ԲԳԵ անկեանց գումարն է. եւ ԴԳԲ անկիւնը ԴԳԵ եւ ԲԳԵ անկեանց տարբերութիւնն է:




10. Երբ ուղիղ գիծ մը, ԱԲ, ուրիշ ուղիղ գծի մը, ԳԴ, այնպէս կը դպչի որ ԲԱԳ եւ ԲԱԴ առընթերաբաց անկիւնները իրարու հաւասար կ'ըլլան, այս անկեանց իւրաքանչիւրը ուղիղ անկիւն կը կոչուի, եւ ԱԲ գիծը ԳԴ գծին ուղղահայեաց է կ'ըսուի:



11. Որեւիցէ անկիւն, ԲԱԳ, որ ուղիղ անկիւնէ փոքր բացուն է, սրանկիւն կը կոչուի, եւ ուղիղ անկիւնէ մեծ բացուն եղողը, ԴԵՖ, բթանկիւն:



12. Զուգահեռական կը կոչուին այն երկու գծերը, որք, միեւնոյն մակարդակին վրայ քաշուելով, երբեք իրարու չեն հանդիպիր, որչափ եւ երկարին մէկ կամ միւս կողմը:



13. Մակերես մը ամէն կողմէն ուղիղ կամ կոր գծերով չրջապատեալ մակարդակ մ'է: Երբ գծերն ուղիղ են, չրջապատեալ միջոցը բազմանկիւն կը կոչուի. եւ գծերն ալ, ամէնքը մէկտեղ, բազմանկեան պարագիծը կամ շրջագիծը կը կազմեն:



14. Երեք կողմ ունեցող բազմանկիւնը ամենէն պարզն է ու եռանկիւն կը կոչուի. չորս կողմ ունեցողը՝ քառանկիւն, հնգակողմեանը՝ հնգանկիւն, եւայլն:



15. Հաւասարակողմ եռանկիւնն այն է որուն երեք կողմերն իրարու հաւասար են. Երկկողմնակողջ եռանկիւնն այն է որուն երկու կողմերն իրարու հաւասար են. եւ անկողմնակողջ եռանկիւնն այն է որուն երեք կողմերն ալ անհաւասար են:

16. Ողղանկեան եռանկիւնն այն է որուն մէկ անկիւնը ուղիղ անկիւն մ'է: Ուղիղ անկեան դիմացի կողմը հակաձիգ կը կոչուի: Զորօրինակ, ԱԲԳ եռանկեան մէջ Ա ուղիղ անկեան դիմացի կողմը, ԲԳ, հակաձիգն է:



17. Քանի մը տեսակ քառակողմ կայ.

Ա. Քառակուսի, որուն չորս կողմերը իրարու հաւասար, չորս անկիւնքն ալ ուղիղ են:



Բ. Ուղղանկիւն, որուն անկիւններն ուղիղ են, բայց կողմերն իրարու հաւասար չեն:




Գ. Զուգահեռագիծ, որուն ընդդիմակաց կողմերը զուգահեռական են:



Դ. Տափանկիւն, որուն կողմերն իրարու հաւասար են բայց անկիւններն ուղիղ չեն:



Ե. Տրապէզացի, որուն միայն երկու կողմերը զուգահեռական են:



18. Տրանկիւնը երկու ընդդիմակաց անկեանց գագաթներն իրարու հետ միացընող դիծն է: Զորօրինակ, ԱԳ, ԱԴ, ԱԵ, ԱՖ տրամանկիւնն են:



19. Հաւասարակողմ կը կոչուի այն բազմանկիւնը որուն բոլոր կողմերն իրարու հաւասար են. եւ հաւասարանկիւն կը կոչուի այն՝ որուն բոլոր անկիւններն իրարու հաւասար են:

20. Երկու բազմանկիւնք փոխադարձաբար հաւասարակող կը կոչուին, երբ, անոնց կողմերը միեւնոյն կարգաւ շարուած ըլլալով, մէկուն առաջին կողմը հաւասար է միւսին առաջին կողման, երկրորդը՝ երկրորդին, երրորդը՝ երրորդին, եւայլն: Փոխադարձաբար հաւասարանկիւն խօսքն ալ նոյն նշանակութիւնն ունի անկեանց նկատմամբ:

Երկու պարագայից մէջ ալ՝ իրարու հաւասար կողմերը կամ իրարու հաւասար անկիւնները համանուն կողմեր կամ անկիւններ կը կոչուին:

Սահմանք երկրաչափական բառից:

1. Աքսիոմը ինքնայայտ ճշմարտութիւն մ'է:

2. Հայեցողութիւնը ճշմարտութիւն մ'է, որ ապացոյցով կոչուած տրամաբանական ընթացքով մը ի յայտ կու գայ:

3. Խնդիրը լուծուելու առաջարկութիւն մ'է:

4. Աքսիոմը այն է որ հայեցողութիւն մը ապացուցանելու կամ խնդիր մը լուծելու կ'օգնէ:

5. Նախապատրաստութիւն ընդհանուր անունը՝ հայեցողութեանց, խնդրոց եւ առմանց անխափ կը տրուի:

6. Հետեւութիւնը մէկ կամ քանի մը նախապատրաստութիւններէ հանուած ակնհայտ ճշմարտութիւն մ'է:

7. Պարզումը մէկ կամ քանի մը նախընթաց նախապատրաստութեանց վրայ եղած ծանօթութիւնն է, որ կը ծառայէ անոնց կապակցութիւնը, գործածութիւնը, սահմանը կամ ընդարձակութիւնը ցուցընելու:

8. Ենթադրութիւնը նախապատրաստութիւն մը արտայայտելու կամ ապացուցութիւն մը ընելու առեն բան մը դնել, այսինքն՝ այսպէս կամ այնպէս համարիլն է:

Բացատրութիւն գործածելի նշանաց:

1. Հաւասարութիւն ցուցընելու համար սա նշանը = կը գործածուի. զորօրինակ, Ա = Բ, ըսել է Ա֊ը Բ֊ին հաւասար է:

2. Երբ հարկ կ'ըլլայ ցուցընել թէ Ա֊ը Բ֊էն փոքր է, այսպէս կը գրուի, Ա < Բ. իսկ եթէ հետեւեալ կերպով գրուելու ըլլայ, Ա > Բ, կը նշանակէ թէ Ա֊ը Բ֊էն մեծ է: Փոքր թիւը միշտ նշանին գագաթան կողմը կը դրուի:

3. Գումարման նշանն է +, որ աւելի կը կոչուի:

4. Հանման նշանն է —, որ նուազ կը կոչուի. զոր-

օրինակ, Ա + Բ կը ցուցընէ Ա.ին եւ Բ.ին գումարը. Ա — Բ կը ցուցընէ Ա.ին եւ Բ.ին տարբերութիւնը կամ Ա.ին մնացորդը, երբ Բ.ը անկէ կը հանուի. Ա — Բ + Գ կամ Ա + Գ — Բ կը ցուցընէ թէ Ա.ը եւ Գ.ը գումարելու եւ այն գումարէն Բ.ը հանելու է։

3. Բազմապատկութեան նշանն է ×. զորօրինակ, Ա × Բ՝ Ա.ին եւ Բ.ին արտադրեալը կը ցուցընէ։ Բազմապատկութեան նշանին տեղը երբեմն միջակէտ մը կը դրուի. զորօրինակ, Ա. Բ եւ Ա × Բ նոյն բանն ըսել է։

Ա × (Բ + Գ — Գ) Ա.ին եւ Բ + Գ — Գ քանակութեան արտադրեալը կը ցուցընէ։ Եթէ հարկ ըլլար Ա + Բ.ը Ա — Բ + Գ ով բազմապատկել, արտադրեալը ցուցընելու համար այսպէս պիտի դրուէր (Ա + Բ) × (Ա — Բ + Գ), վակապծի մէջ եղածներուն բոլորը մէկ քանակութիւն համարելով։

Եթէ թուանշան մը գծէ մը կամ քանակութենէ մը առաջ դրուի, այն գծին կամ այն քանակութեան բազմապատկիչը կը համարուի. զորօրինակ, 3Ա՝ Ա.ի գծին երեք անգամը կը ցուցընէ, եւ $\frac{1}{2}$Ա՝ Ա. անկեան կէսը կը նշանակէ։

6. $\overline{\text{ԱԲ}}^2$ կը ցուցընէ Ա.Բ գծին քառակուսին. $\overline{\text{ԱԲ}}^3$՝ անոր խորանարդը։ Գծի մը քառակուսին կամ խորանարդին ինչ ըսել է եւ ըսելը պիտի բացատրուի։

7. Արմատական նշանն է √. զորօրինակ, $\sqrt{2}$ կը ցուցընէ 2 ին քառակուսի արմատը. $\sqrt{\text{Ա}\times\text{Բ}}$՝ Ա.ին եւ Բ.ին արտադրեալին քառակուսի արմատը։

Աքսիոմներ։

1. Միեւնոյն իրին հաւասար եղողները իրարու հաւասար են։

2. Եթէ հաւասարներու հետ հաւասարներ գումարուին, գումարները հաւասար պիտի ըլլան։

3. Եթէ հաւասարներէ հաւասարներ հանուին, մնացորդները հաւասար պիտի ըլլան։

4. Եթէ անհաւասարներու հետ հաւասարներ գումարուին, գումարները անհաւասար պիտի ըլլան։

5. Եթէ անհաւասարներէ հաւասարներ հանուին, մնացորդքն անհաւասար պիտի ըլլան։

6. Միեւնոյն իրին կրկինը եղողները իրարու հաւասար են։

7. Միեւնոյն իրին կէսն եղողները իրարու հաւասար են։

8. Ամբողջն իր մասերուն որեւէ մէկէն մեծ է։

9. Ամբողջն իր բոլոր մասանցը գումարին հաւասար է։

10. Բոլոր ուղիղ անկիւնք իրարու հաւասար են։


11. Մէկ կէտէ ուրիշ կէտ մը միայն մէկ ուղիղ գիծ կրնայ քաշուիլ։

12. Կէտի մը վրայէ կրնայ քաշուիլ միայն մէկ ուղիղ գիծ որ ուրիշ գծի մը զուգահեռական ըլլայ։

13. Այն մեծութիւնք որ իրարու վրայ դրուելով իրենց բոլոր տարածութեանը մէջ մէկմէկու կը յարմարին, իրարու հաւասար են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու ուղիղ գիծ երբու դպչին, երկու ընդհատ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար պիտի ըլլայ։



Եթէ ԴԳ եւ ԱԲ ուղիղ գծերը Գ կէտին վրայ իրարու դպչին, ԱԳԴ եւ ԴԳԲ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար պիտի ըլլայ։


Գ կէտին վրայ ԱԲ գծին ուղղահայեաց քաշէ ԳԵ։ ԱԳԴ եւ ԴԳԲ անկեանց գումարը ԱԳԵ եւ ԵԳԲ անկեանց գումարին հաւասար է (Առ. 13)։ Բայց, որովհետեւ ԱԳԵ եւ ԵԳԲ երկու ուղիղ անկիւն են, ԱԳԴ եւ ԴԳԲ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է։

Հետ. 1. Եթէ ԱԳԴ եւ ԴԳԲ անկեանց մէկը ուղիղ է, անուշադիր միւսն ալ ուղիղ է։



Հե՛տ. 2. Եթէ Դե գիծը ԱԲ ին ուղղահայեաց է, ԱԲ գիծն ալ Դե ին ուղղահայեաց է։


Քանզի, որովհետեւ Դե գիծը ԱԲ ին ուղղահայեաց է, ԱԴ անկիւնը իր առընթերակաց ԴԳԲ անկեան հաւասար է եւ երկուքն ալ ուղիղ անկիւն են (Սահ. 10)։ Բայց, որովհետեւ ԱԴ ուղիղ անկիւն է իր առընթերակաց ԱԳԵ անկիւնն ալ ուղիղ է (Հետ. 1)։ Ուրեմն ԱԴ անկիւնը ԱԳԵ անկեան հաւասար է (Առ. 10)։ եւ ԱԲ Դե ին ուղղահայեաց է։



Հե՛տ. 3. Բֆ ուղիղ գծին մէկ կողման վրայ կազմուած բոլոր անկիւնները, ինչպէս ԲԱԴ, ԳԱԴ, ԴԱԵ, ԵԱՖ, ամէնքը մէկտեղ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար են. քանզի անոնց ամենուն գումարը երկու առընթերակաց, ԲԱԴ եւ ԴԱՖ, անկեանց գումարին հաւասար է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ երկու ուղիղ գիծ միեւնոյն երկու կէտերուն վրայէն հաշուին, անոնք, որքան որ երկնցան, ըստքընոց պիտի ըլլան ու միեւնոյն ուղիղ գիծը կազմեն։




Ա եւ Բ երկու կէտերն ըլլան։ Ցայտնի է թէ երկու գծերը, Ա եւ Բ հաասարակաց կէտերու մէջտեղ, զուգընթաց պիտի ըլլան, ապա թէ ոչ Ա կէտէն Բ կէտը երկու ուղիղ գիծ կրնան քաշուիլ որ անկարելի է (Ա՛ռ. 11)։ Բայց դիցուք թէ այն գծերն երկընաւով Գ կէտին վրայ իրարմէ բաժնուին եւ մէկը ԳԴ ըլլայ, միւսը ԳԵ։ Գ կէտէն ԳՖ գիծը անանկ քաշէ որ ԱԳՖ ուղիղ անկիւն ըլլայ։ Արդ, որովհետեւ ԱԳԴ ուղիղ գիծ է, ՖԳԴ ալ ուղիղ անկիւն է (Նախ. Ա. Հետ. 1). եւ, որովհետեւ ԱԳԵ ուղիղ գիծ է, ՖԳԵ ալ

ուղիղ անկիւն է։ Ուրեմն ՖԳԴ անկիւնը հաւասար է ՖԳԵ անկեան (Ա՛ռ. 10), որ միայն անսաեն կրնայ ըլլալ երբ ԳԴ եւ ԳԵ զուգընթաց են։ Ուստի այն ուղիղ գծերը, որոնց Ա եւ Բ կէտերն հասարակաց են, երբ կ'երկնցան, չեն կրնար իրարմէ բաժնուիլ, այլ միեւնոյն ուղիղ գիծը կը կազմեն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երէք անկէտ գիծ մը անկէտ երկու անկէտ գծէ տարբեր հաասրակաց կէտէ մը վերայ, անանկ որ երկու անկէտ գիծերուն անկեանց գումարը երկու անկէտ անկեանց հաասար ըլլայ, այն գծերը միեւնոյն անկէտ գիծը պիտի կազմեն։




Եթէ ԳԴ գիծը ԱԳ եւ ԳԲ գծերուն դպչի, Դ հասարակաց կէտին վրայ, անանկ որ ԴԳԱ ու ԴԳԲ առընթերակաց անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար ըլլայ, անսաեն ԳԲ գիծը ԱԳ ին չարունակութիւնը պիտի ըլլայ, կամ ԱԳ եւ ԳԲ միեւնոյն ուղիղ գիծը պիտի կազմեն։

Քանզի, եթէ ԳԲ գիծը ԱԳ ին չարունակութիւնը չէ, թող ԳԵ ըլլայ անոր չարունակութիւնը. անսաեն, ԱԳԵ գիծն ուղիղ ըլլալով, ԱԳԴ եւ ԴԳԵ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է (Նախ. Ա.)։ Սակայն ենթադրուեցաւ թէ ԱԳԴ եւ ԴԳԲ անկեանց գումարն ալ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է. ուրեմն ԱԳԴ+ԴԳԵ=ԱԳԴ+ԴԳԲ։ Ա՛ս հաւասարութեան երկու անդամներէն ԱԳԴ հասարակաց անկիւնը հանուելով, կը մնայ ԴԳԵ=ԴԳԲ, որ անկարելի է (Ա՛ռ. 8)։ Ուրեմն ԱԳ եւ ԳԲ միեւնոյն ուղիղ գիծը կը կազմեն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Երբ երկու անկէտ գիծ իրար կը կտրեն, անոնց ընծայած հակառակ անկիւնները հաւասար են։



Հոս ԱԲ եւ ԴԵ ուղիղ գծերը Գ կէտին վրայ իրար կը կտրեն. եԹԷ անկիւնը ԱԳԴ անկեան, ԱԳԵ անկիւնն ալ ԴԳԲ անկեան հաւասար է։

Ջանզի, որովհետեւ ԱԳ ուղիղ գիծը ԴԵ ուղիղ գծին կը դպչի, ԱԳԵ եւ ԱԳԴ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է (Նախ. Ա.), եւ, որովհետեւ ԵԳ ուղիղ գիծը ԱԲ ուղիղ գծին կը դպչի, ԱԳԵ եւ ԵԳԲ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է. ուրեմն ԱԳԵ+ԱԳԴ=ԱԳԵ+ԵԳԲ (Առ. 1)։ Արդ, եթէ ԱԳԵ հաւասարակաց անկիւնը երկուքէն հանուի, կը մնայ ԱԳԴ անկիւնը իր ԵԳԲ գագաթեան անկեանը հաւասար (Առ. 3)։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ԱԳԵ=ԴԳԲ։


Պոր. Երկու ուղիղ գծից, միմիմիկ կտրելով, կէտի մը բոլորտիքը չինած չորս անկիւնները չորս ուղիղ անկեանց հաւասար են. քանզի ԱԳԵ եւ ԵԳԲ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար ըլլալով, եւ ԱԳԴ եւ ԴԳԲ անկեանց գումարն ալ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար ըլլալով, չորս անկեանց գումարը չորս ուղիղ անկեանց հաւասար է։



Եւ, առ հասարակ, եթէ քանի մը ուղիղ գիծ, զորօրինակ ԳԱ, ԳԲ, ԳԴ եւայլն, Գ կէտին վրայ միմիմիկու դըպչին, սառնց չինած բոլոր անկեանց գումարը, ինչպէս ԱԳԲ+ԲԳԴ+ԴԳԵ +ԵԳՖ+ՖԳԱ, չորս ուղիղ անկեանց հաւասար պիտի ըլլայ. քանզի եթէ երկու միմիմիկու ուղղահայեաց գիծ, Գ կէտին բոլորտիքը, չորս ուղիղ անկիւն չինեն, ճիշդ նոյն միջոցը պիտի գրաւեն, որ ԱԳԲ, ԲԳԴ, ԴԳԵ, ԵԳՖ եւ ՖԳԱ անկիւնները գրաւած են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

ԵՐԲ երկու եռանկեանց մէկու երկու կողքերը և անոնց կազմած անկիւնը մէսին երկու կողմանց ու անոնց կազմած անկեան հաւասար են, եռանկիւններն ալ իրարու հաւասար են։




Եթէ ԵԴ եւ ԲԱ եռանկեանց մէկուն ԵԴ կողմը մէսին ԲԱ կողման, ԴՖ կողմը ԱԳ կողման եւ Դ անկիւնը Ա անկեան հաւասար է, ԵԴՖ եռանկիւնն ալ ԲԱԳ եռանկեան հաւասար է։

Թող ԵԴՖ եռանկիւնը ԲԱԳ եռանկեան վրայ անանկ դրուի որ Ե կէտը Բ կէտին վրայ դայ, եւ ԵԴ կողմը նոր հաւասար եղող ԲԱ կողման վրայ. արդ, որովհետեւ Դ անկիւնը Ա անկեան հաւասար է, ԴՖ կողմը ԱԳ կողման վրայ պիտի երթայ. եւ, որովհետեւ ԴՖ =ԱԳ, Ֆ կէտը Գ կէտին վրայ պիտի դայ, եւ երրորդ կողմերը, ԵՖ եւ ԲԳ, զուգընթաց պիտի ըլլան (Առ. 11). ուրեմն ԵԴՖ եռանկիւնը ԲԱԳ եռանկեան հաւասար է (Առ. 13)։

Հետ. Երբ երկու եռանկեանց սա երեք բաները իրարու հաւասար են, այսինքն ԵԴ=ԲԱ կողման, ԴՖ =ԱԳ կողման եւ Դ=Ա անկեան, մնացած երեք բաները ալ իրարու հաւասար են, այսինքն ԵՖ=ԲԳ կողման, Ե=Բ անկեան եւ Ֆ=Գ անկեան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

ԵՐԲ երկու եռանկեանց մէկու երկու անկիւնները և անոնց մէջտեղի կողմը մէսին երկու անկիւններուն և անոնց մէջտեղի կողման հաւասար են, եռանկիւններն ալ իրարու հաւասար են։



Եթէ ԵԴՖ եւ ԲԱԳ եռանկեանց մէկուն ե անկիւնը միւսին Բ անկեան, Ֆ անկիւնը Գ անկեան եւ ԵՖ կողմը ԲԳ կողմեան հաւասար է, ԵԴՖ եռանկիւնն ալ ԲԱԳ եռանկեան հաւասար է։

Թող ԵԴՖ եռանկիւնը ԲԱԳ եռանկեան վրայ անանկ դրուի որ ԵՖ կողմը իրեն հաւասար եղող ԲԳ կողման վրայ դայ, արդ, որովհետեւ Ե անկիւնը հաւասար է Բ անկեան, ԵԴ կողմը ԲԱ կողման վրայ պիտի երթայ, եւ Դ կէտը ԲԱ գծին մէջ պիտի ըլլայ. նմանապէս, որովհետեւ Ֆ անկիւնը Գ անկեան հաւասար է, ՖԴ կողմն ալ ԳԱ կողման վրայ պիտի երթայ, եւ Դ կէտը ԳԱ գծին մէջ պիտի ըլլայ. ուստի Դ կէտը միեւնոյն ատեն ԲԱ ու ԳԱ երկու ուղիղ գծերուն մէջէն ալ ըլլալով, անոնց մէկզմէկ կտրող Ա կէտին վրայ պիտի ըլլայ. ուրեմն ԵԴՖ եւ ԲԱԳ եռանկիւնները իրարու չափով եւ հետեւապէս հաւասար են (Ա.· 13)։


Հետ. Երբ երկու եռանկեանց սա երեք բաներն իրարու հաւասար են, այսինքն՝ Ե=Բ անկեան, Ֆ=Գ անկեան եւ ԵՖ=ԲԳ միջանկեալ կողման, մնացած երեք բաներն ալ իրարու հաւասար են, այսինքն՝ Դ=Ա անկեան, ԵԴ=ԲԱ կողման եւ ԴՖ=ԱԳ կողման։

Պոր. Երկու եռանկիւն որ մէկմէկու վրայ դրուելով կատարելապէս իրար կը գոցեն, հաւասար են (Ա.· 13)։ Ուստի հաւասար եռանկիւններ փոխադարձաբար հաւասարակողմ եւ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են (Սահ. 20)։ Այս նախադասութեան հակադարձն ալ ճշմարիտ է, այսինքն՝ *Եթէ երկու եռանկիւն որ փոխադարձաբար հաւասարակողմ եւ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են, իրարու հաւասար են։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եռանկեան մը որեւէ երկու կողմանց գումարը երրորդ կողմէն մեծ է։

ԱԲԳ եռանկեան մէջ, ԱԲ եւ ԲԳ կողմանց գումարը ԱԳ կողմէն մեծ է։



Քանզի ԱԳ ուղիղ գիծը Ա կէտէն Գ կէտը քաշուած ամենէն փոքր գիծն է (Սահմ. 3). ուստի ԱԲ+ԲԳ՝ ԱԳ էն մեծ է։

Հետ. Եթէ ԱԳ < ԱԲ+ԲԳ անհաւասարութեան երկու անդամներէն հանուի կողմանց մէկը, ինչպէս ԲԳ, անհաւասարութիւնը կ'ըլլայ ԱԳ—ԲԳ<ԱԲ. այսինքն՝ եռանկեան մը երկու կողմանց տարբերութիւնը երրորդ կողմէն փոքր է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ եռանկեան մը մէջ կէտ մը երկու ուղիղ գիծ տարւի եռանկեան ուրեք մէկ կողման ծայրերուն, սա գիծերը եռանկեան մնացած երկու կողմանց գումարէն փոքր պիտի ըլլայ։

Եթէ ԲԱԳ եռանկեան մէջ Օ կէտէն ՕԲ եւ ՕԳ ուղիղ գծերը քաշուին ԲԳ կողման ծայրերուն, ԲՕ+ՕԳ փոքր պիտի ըլլայ ԲԱ+ԱԳ էն։




Թող ԲՕ գիծը չարունակուի մինչեւ դպչի ԱԳ կողման Դ կէտին վրայ. անտեսն ՕԳ<ՕԴ+ԴԳ (Նախ. Է.), կամ, ԲՕ գումարելով երկու անդամներուն վրայ, ԲՕ+ՕԳ<ԲՕ+ՕԴ+ԴԳ (Ա.· 4), կամ ԲՕ+ՕԳ<ԲԴ+ԴԳ։

Դարձեալ, ԲԴ<ԲԱ+ԱԴ, կամ, ԴԳ գումարելով, ԲԴ+ԴԳ<ԲԱ+ԱԳ։ Բայց արդէն տեսնուեցաւ որ ԲՕ+ՕԳ <ԲԴ+ԴԳ, ուստի առելի եւս ԲՕ+ՕԳ<ԲԱ+ԱԳ։

2680-41
ZUUՈ-Ayun ССР

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եղիր երկու եռանկեանց մէկուն երկու կողքերը մէսին երկու կողքերուն հետ հաւասար են, և անոնց կողմած անկիւնները անհաւասար, երբեմն կողքերն ալ անհաւասար են, և մեծ կողմը մեծ անկիւն ընդդէմ եռանկեանն է։




Եթէ ԲԱԳ *եւ* ԵԴՑ *եռանկեանց մէջ* ԱԲ=ԴԵ *կողման եւ* ԱԳ=ԴՑ *կողման, եւ* Ա> Դ *անկիւնէն, բայց ալ մեծ է* ԵՑ *կողմէն։*

Դե գծին հաւասար ԱԿ գիծը քաշէ, ԿԱԳ *անկիւնը* ԵԴՑ *անկեան հաւասար ընելով։* ԿԱԳ *եռանկիւնը* ԵԴՑ *եռանկեան հաւասար է* (Նախ. Ե.). *ուստի* ԿԳ=ԵՑ *կողման։*


Ա.ա նախադասութիւնը սա երեք կերպով կ'ապացուցուի։

Ա. Երբ Կ կէտը ԱԲԳ եռանկեան դրսէն կ'ընկնայ։ ԿԳ <ԿԻ+ԻԳ (Նախ. Է.), եւ ԱԲ<ԱԻ+ԻԲ, *ուստի* ԿԳ+ ԱԲ<ԿԻ+ԱԻ+ԻԳ+ԻԲ, *կամ* ԿԳ+ԱԲ<ԱԿ+ԲԳ։ Հանէ ԱԲ *մէկ կողմէն եւ անոր հաւասար եղող* ԱԿ *միւս կողմէն, եւ կը մնայ* ԿԳ<ԲԳ (Ա.ա. Յ). *արդ* ԿԳ=ԵՑ, *ուստի* ԲԳ>ԵՑ։

Բ. Երբ Կ կէտը ԲԳ կողման վրայ կ'ընկնայ։ Յայտնի է *թէ* ԿԳ, *կամ անոր հաւասարը* ԵՑ, ԲԳ *էն վարքը է* (Ա.ա. 8)։



Գ. Երբ Կ կէտը ԲԱԳ եռանկեան մէջ կ'ընկնայ։ ԱԿ+ԿԳ<ԱԲ+ԲԳ (Նախ. Ը.). *եւ* ԱԿ *մէկ կողմէն եւ անոր հաւասարը* ԱԲ *միւս կողմէն հանելով, կը մնայ* ԿԳ<ԲԳ, *կամ* ԲԳ>ԵՑ։




Պաբ. Հակադարձաբար, *եթէ* ԲԱԳ *եւ* ԵԴՑ *եռանկեանց մէկուն* ԲԱ *եւ* ԱԳ *կողմերը մէսին են եւ* Դ *անկիւնը հաւասար են, բայց առաջնոյն* ԲԳ *կողմը երկրորդին* ԵՑ *կողմէն մեծ է, առաջնոյն* ԲԱԳ *անկիւնն ալ երկրորդին* ԵԴՑ *անկիւնէն մեծ է։*

Ֆանպի, *եթէ* ԲԱԳ *անկիւնը* ԵԴՑ *անկիւնէն մեծ չէ, կամ անոր հաւասար է եւ կամ անկէ փոքր։ եթէ հաւասար է՝* ԲԳ *կողմը* ԵՑ *ին հաւասար է* (Նախ. Ե. Հետ.). *եթէ փոքր է, որ* ԲԳ *փոքր է* ԵՑ *էն. բայց սա երկուքն ալ մեր ենթադրութեանը հակառակ են, ուրեմն* ԲԱԳ >ԵԴՑ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարաչափ են, անոնք փոխադարձաբար հաւասարանկիւն ալ են և իրարու հաւասար։

Եթէ ԵԴՑ *եւ* ԲԱԳ *երկու եռանկեանց* ԵԴ=ԲԱ *կողման,* ԵՑ=ԲԳ *կողման եւ* ԴՑ=ԱԳ *կողման, ուրեմն* Դ = Ա *անկեան,* Ե=Բ *անկեան եւ* Ց=Գ *անկեան։*



Ֆանպի, ԵԴ *եւ* ԴՑ *կողմերը* ԲԱ *եւ* ԱԳ *կողմերուն հաւասար ըլլալով, եթէ* Դ *անկիւնը* Ա *անկիւնէն մեծ ըլլար, եւ կողմը* ԲԳ *կողմէն մեծ պիտի ըլլար* (Նախ.

Թ.)։ Եւ, եթէ Դ անկիւնը Ա անկիւնէն փոքր ըլլար, նոյն կողմը ԲԳ կողմէն փոքր պիտի ըլլար։ սակայն ենթադրութեամբ ԵՖ=ԲԳ, ուրեմն Դ անկիւնը Ա անկիւնէն ոչ մեծ է ոչ փոքր այլ անոր հաւասար է։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ Ե=Բ անկեան եւ Ֆ =Գ անկեան։ ուրեմն երկու եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Զ. Պար.)։

Պոր. Կը տեսնուի թէ հաւասար անկիւնները հաւասար կողմերուն դիմացը կ'ըլլան։ զորօրինակ, Դ եւ Ա հաւասար անկիւնները ԵՖ եւ ԲԳ հաւասար կողմերուն դիմացը կ'ըլլան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկկողմնաղոյզ եռանկեան մը հաւասար կողմերուն դիմացի անկիւնները իրարու հաւասար են։



ԲԱԳ երկկողմնաղոյզ եռանկեան ԲԱ եւ ԱԳ հաւասար կողմերուն դիմացի անկիւնները, Բ եւ Գ, իրարու հաւասար են։

Ա գագաթէն ԱԴ դիծը քաշէ, ԲԳ խոլիսքը Դ կէտին վրայ երկու հաւասար մասանց բաժնելով. ԲԱԴ եւ ԴԱԳ փոխադարձաբար հաւասարակողմ եռանկիւններ են. քանզի ենթադրութեամբ ԲԱ=ԱԳ, ԱԴ երկուքին հաւասարակաց է, եւ ԲԳ հաւասար չհնուած է ԴԳ ին. ուստի Բ անկիւնը Գ անկեան հաւասար է (Նախ. ժ.)։

Հետ. 1. Հաւասարակողմ եռանկիւնը հաւասարանկիւն ալ է, այսինքն բոլոր անկիւնները իրարու հաւասար են։

Հետ. 2. ԲԱԴ եւ ԴԱԳ եռանկեանց հաւասար ըլլալէն յայտնի է թէ ԲԱԴ հաւասար է ԴԱԳ անկեան եւ ԲԴԱ հաւասար է ԱԴԳ անկեան. ուստի վերջի երկուքը ուղիղ անկիւններ են. ուրեմն, երկկողմնաղոյզ եռանկեան մը գագաթնէն դնուած խոլիսքը հիմքին կէտը հատցուած գիծը գագաթնանկիւնը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ եւ խոլիսքին ուղղահայեաց է։

Պոր. Երկկողմնաղոյզ չեղող եռանկեան մը անհաւասար կողմերուն դիմացի անկիւնները մէկ կողմը իրարու հաւասար կրնայ չըլլալ, եւ անոնցմէն դիմացի անկիւնը գագաթի կ'ըլլայ։ Բայց երկկողմնաղոյզ եռանկեան մը ընդհանրապէս այն կողմը իրարու կը հաւասարի, որ միւս երկու կողմանց միջինն հաւասար չէ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ եռանկեան մը երկու անկիւնները իրարու հաւասար են, անոնց դիմացի կողքերն ալ իրարու հաւասար են, և եռանկեանը երկկողմնաղոյզ է։



Եթէ ԱԲԳ եռանկեան մէջ Բ անկիւնը հաւասար է Գ անկեան, ԱԳ կողմն ալ հաւասար է ԱԲ կողմեան։

Քանզի, եթէ ասոնք երկու կողմերն իրարու հաւասար չեն, ենթադրենք թէ ԱԲ մեծ է։ Կտրէ ԱԲ էն ԲԴ մասը ԱԳ ին հաւասար, եւ ԴԳ քաշէ։ Արդ, ԲԴԳ եւ ԲԱԳ եռանկեանց մէջ ԲԴ հաւասար չհնուած է ԱԳ ին. Բ անկիւնը ենթադրութեամբ հաւասար է ԱԳԲ անկեան. եւ ԲԳ կողմը հասարակաց է. ուրեմն երկու եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ե.)։ Սակայն մասը ամբողջին հաւասար չի կրնար ըլլալ (Աքս. 8). ուստի ԲԱ եւ ԱԳ կողմերն անհաւասար չեն, եւ ԲԱԳ եռանկիւնը երկկողմնաղոյզ է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Անհն եռանկեան մեծ կողմը մեծ անկեան դէմը կ'ընայ, և հակադարձաբար մեծ անկիւնը մեծ կողման դէմը։

Ա. Եթէ ԱԲԳ եռանկեան մէջ Գ անկիւնը մեծ է Բ անկիւնէն, Գ անկեան դիմացի ԱԲ կողմը՝ Բ անկեան դիմացի ԱԳ կողմէն մեծ է։ ԳԴ գիծը քաշէ, ԲԳԴ անկիւնը Բ անկեան հաւասար ընելով։ ԳԴԲ եռանկեան մէջ ԳԴ հաւասար է ԲԴ կողմեան (Նախ.



ԺԲ.) ։ Արդ, ԱԳ<ԱԴ+ԴԳ. բայց ԱԴ+ԴԳ=ԱԴ+ԴԲ =ԱԲ. ուրեմն ԱԳ<ԱԲ ։

Բ. Եթէ ԱԲ>ԱԳ, ԱԲ կողման դիմացի Գ անկիւնն ալ ԱԳ կողման դիմացի Բ անկիւնէն մեծ է ։

Ինչպէս, եթէ Գ<Բ, վերը ապացուցուածէն կը հետեւի թէ ԱԲ<ԱԳ, որ հակառակ է ենթադրութեան ։ Եթէ Գ=Բ անկեան, ԱԲ ալ հաւասար է ԱԳ կողման (նախ. ԺԲ.), որ ատ ալ հակառակ է ենթադրութեան ։ Ուստի, երբ ԱԲ>ԱԳ, Գ անկիւնը Բ անկիւնէն մեծ ըլլալու է ։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ո՞ղիղ գիծ մը դո՞ւրս ուրէքէ կրնայ ձգուիլ՝ դէպի ներկ գիծ կրնայ հաշո՞ւիլ, որ ո՞ղղահայեաց ըլլայ այն ո՞ղիղ գիծին ։



Ա կէտէն միայն մէկ գիծ կրնայ քաշուիլ որ ԴԵ ուղիղ գծին ուղղահայեաց ըլլայ ։

Ենթադրենք թէ երկու ուղղահայեաց կրնան քաշուիլ, ԱԲ եւ ԱԳ. անոնցմէ մէկը, ԱԲ, երկնցուր մինչեւ Ֆ, ԲՖ հաւասար ընելով ԱԲ ին, եւ ՖԳ գիծը քաշէ ։ ԳԱԲ եւ ԳԲՖ եռանկիւնաց մէջ ԳԲԱ եւ ԳԲՖ անկիւնները ուղիղ են. ԳԲ կողմը հասարակաց է, ԱԲ կողմը հաւասար չինուած է ԲՖ կողման. ուրեմն եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ե. Հետ.) ։ Բայց ԱԳԲ անկիւնը ենթադրութեամբ ուղիղ է, նաեւ ԲԳՖ ուղիղ ըլլալու է ։ Բայց եթէ երկու ա՛ընթերակայ անկիւնները, ԲԳԱ եւ ԲԳՖ, միատեղ հաւասար են երկու ուղիղ անկեանց, ԱԳՖ ուղիղ գիծ ըլլալու է (Նախ. Գ.) · ասկէ կը հետեւի թէ Ա կէտէն Ֆ կէտը երկու ուղիղ գիծ կրնայ քաշուիլ, որ անկարելի է (Առ. 11) · ուրեմն նոյն կէտէն նոյն ուղիղ գծին միայն մէկ ուղղահայեաց միայն կրնայ քաշուիլ ։



Հէպ. ԱԲ գծին վրայ որեւիցէ կէտ մը, Գ, միայն մէկ գիծ կրնայ քաշուիլ որ ԱԲ ին ուղղահայեաց ըլլայ ։ Թանզի, եթէ երկու ուղղահայեաց կրնայ քաշուիլ, ԳԴ եւ ԳԵ, ԲԳԴ եւ ԲԳԵ անկիւնները ուղիղ կ'ըլլան եւ իրարու հաւասար (Առ. 10). եւ ԳԴ գիծը ԳԵ գծին դուգընթաց կ'ըլլայ, ապա թէ ոչ մասը ամբողջին հաւասար պիտի ըլլար, որ անկարելի է (Առ. 8) ։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ընե ո՞ղիղ գիծ մը դո՞ւրս կրնաք մը ո՞ղղահայեաց մը տա՞ւնէն նոյն ո՞ղիղ գիծին, և խոտորնակ գիծեր՝ անոր այլ Լայլ կէտերո՞ւն,

Նախ, Ո՞ղղահայեացը ուրէքէ խոտորնակ գիծէն փո՞ւր պիտի ըլլայ ։

Երկրորդ, Ո՞ղղահայեացին հաւասարապէս հեռու երկու խոտորնակ գիծեր երկրո՞ւ հաւասար պիտի ըլլան ։

Երրորդ, երկու խոտորնակ գիծերո՞ւն՝ ո՞ղղահայեացին հեռու եղողը մեծ պիտի ըլլայ ։



Ա կէտէն ԴԵ գծին ԱԲ ուղղահայեաց, եւ ԱԵ, ԱԴ, ԱԴ խոտորնակ գծերը քաշէ, նաեւ ԱԲ երկնցուր մինչեւ Ֆ կէտը, ԲՖ գիծը հաւասար ընելով ԱԲ ին, ու ՖԴ եւ ՖԴ գիծերը քաշէ ։

Նախ. ԲԴՖ եւ ԲԴԱ եռանկիւնները իրարու հաւասար են. քանզի ԳԲՖ եւ ԳԲԱ, ուղիղ անկիւններ ըլլալով, իրարու հաւասար են, ԳԲ կողմը հասարակաց է, եւ ԲՖ հաւասար է ԲԱ կողման. ուստի ԳՖ եւ ԳԱ երրորդ կողմերն իրարու հաւասար են (Նախ. Ե. Հետ.) ։ Սակայն ԱԲՖ ուղիղ գիծ ըլլալով, փոքր է ԱԴՖ բեկեալ գծէն (Սահմ. 3) · ուստի ԱԲՖ գծին կէսը, ԱԲ, փոքր է ԱԴՖ գծին կէսն եղող ԱԴ գծէն. ուրեմն ուղղահայեացը որեւիցէ խոտորնակ գծէ փոքր է ։

Բ ր ք ր ք ։ Եթէ ԲԳ հաւասար է ԲԵ գծին, ԱԲԳ եռանկիւնը հաւասար է ԱԲԵ եռանկեան. քանզի ԲԳ=ԲԵ, ԱԲ կողմը հասարակաց է, եւ ԳԲԱ=ԱԲԵ անկեան. ուստի ԱԳ եւ ԱԵ իրարու հաւասար են (Նախ. Ե. Հետ.)։ ուրեմն ուղղահայեացէն հաւասարապէս հեռու եղող երկու խոտորնակ գծեր իրարու հաւասար են։


Բ ր ք ր ք ։ ԴՖԱ եռանկեան մէջ, ԱԴ+ԴՖ<ԱԴ+ԴՖ (Նախ. Ը.)։ ուստի ԱԴՖ գծին կէսը, ԱԴ, փոքր է ԱԴՖ գծին կէսն եղող ԱԴ գծէն. ուրեմն երկու խոտորնակ գծերուն՝ ուղղահայեացէն հեռու եղողը մեծ է։

Հ ե տ ։ 1. Ուղղահայեացը կէսի մը ու գծի մը միջեւ եղած ամենափոքր հեռաւորութիւնն է։

Հ ե տ ։ 2. Կէտէ մը ուղիղ գծի մը՝ միայն երկու գիծ կրնայ քաշուիլ իրարու հաւասար. ապա թէ ոչ, ուղղահայեացին մէկ կողմը գոնէ երկու իրարու հաւասար խոտորնակ գիծ պիտի գտնուէր, որ անկարելի է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ «ուղղութիւն» եռանկեան մէջ հակուղիղը և մէկ կողմը միւսին հակուղիղէն և մէկ կողման հաւասար են, եռանկիւնները ալ իրարու հաւասար են։



Եթէ ԱԲԳ եւ ԴԵՖ ուղղանկիւն եռանկեանց մէջ ԱԳ հակուղիղը հաւասար է ԴՖ հակուղիղին, եւ ԱԲ կողմը՝ ԴԵ կողման, եռանկիւնները իրարու հաւասար են։

Եթէ ԲԳ հաւասար է ԵՖ կողման, եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ժ.)։ Ենթադրենք թէ ասոնց երկու կողմերն իրարու հաւասար չեն եւ ԲԳ կողմը միւսէն մեծ է։ Քաշէ ԱԿ, հաւասար ընելով ԲԿ մասը ԵՖ կողման։ ԱԲԿ եւ ԴԵՖ եռանկեանց մէջ Բ եւ Ե անկիւնները ուղիղ ըլլալով իրարու հաւասար են, ԲԱ կիւնները ուղիղ ըլլալով իրարու հաւասար են, ԲԱ ենթադրութեամբ հաւասար է ԵԴ կողման, եւ ԲԿ հաւասար չինուած է ԵՖ կողման. ուստի ԱԿ հաւասար է ԴՖ կողման (Նախ. Ե. Հետ.)։ Սակայն ենթադրութեամբ ԱԳ հաւասար է ԴՖ կողման. ուստի ԱԳ հաւասար է ԱԿ կողման (Ա. 1)։ Բայց ԱԳ խոտորնակ գիծը՝ ուղղահայեացին մօտ եղող ԱԿ խոտորնակ գծէն հաւասար չի կրնար ըլլալ (Նախ. ԺԵ.). ուստի ԲԳ եւ ԵՖ անհաւասար չեն կրնար ըլլալ. ուրեմն եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ժ.)։

ԱԲ գծին ուղղահայեաց ԵՖ քաշէ, ԱԳ եւ ԳԲ իրարու հաւասար ընելով։



Նախ. Որովհետեւ ԱԳ եւ ԳԲ իրարու հաւասար են, ԱԳ եւ ԳԲ խոտորնակ գծերն ալ իրարու հաւասար են (Նախ. ԺԵ.)։ Նոյնպէս են նաեւ ԱԵ եւ ԵԲ, ԱՖ եւ ՖԲ, եւայլն. ուրեմն ուղղահայեացին որեւիցէ կէտը ուղիղ գծին ծայրերէն հաւասարապէս հեռու է։

Բ ր ք ր ք ։ Ուղղահայեացէն դուրս եղող Ի կէտէն ԻԲ եւ ԻԱ գծերը քաշէ. ասոնցմէ մէկը Դ կէտին վրայ ուղղահայեացը պիտի կտրէ. աս կէտէն ԴԲ գիծը քաշէ, եւ ԴԲ հաւասար կ'ըլլայ ԴԱին։ Սակայն ԻԲ<ԻԴ+ԴԲ, եւ ԻԴ+ԴԲ=ԻԴ+ԴԱ=ԻԱ. ուստի ԻԲ<ԻԱ. ուրեմն ուղղահայեացէն դուրս եղող որեւիցէ կէտ՝ ուղիղ գծին ծայրերէն անհաւասարապէս հեռու է։

Հ ե տ ։ Եթէ Ֆ եւ Ե կէտերը հաւասարապէս հեռու են Ա եւ Բ կէտերէն, Ֆե ուղղահայեաց է ԱԲ գծին եւ կը բաժնէ զանիկա երկու հաւասար մասանց։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Երբ «ուղղանկիւն» եռանկեանց ներսն հակուղիղը և մէկ կողմը միւսին հակուղիղէն և մէկ կողման հաւասար են, եռանկիւնները ալ իրարու հաւասար են։

Եթէ ԱԲԳ եւ ԴԵՖ ուղղանկիւն եռանկեանց մէջ ԱԳ հակուղիղը հաւասար է ԴՖ հակուղիղին, եւ ԱԲ կողմը՝ ԴԵ կողման, եռանկիւնները իրարու հաւասար են։

Եթէ ԲԳ հաւասար է ԵՖ կողման, եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ժ.)։ Ենթադրենք թէ ասոնց երկու կողմերն իրարու հաւասար չեն եւ ԲԳ կողմը միւսէն մեծ է։ Քաշէ ԱԿ, հաւասար ընելով ԲԿ մասը ԵՖ կողման։ ԱԲԿ եւ ԴԵՖ եռանկեանց մէջ Բ եւ Ե անկիւնները ուղիղ ըլլալով իրարու հաւասար են, ԲԱ կիւնները ուղիղ ըլլալով իրարու հաւասար են, ԲԱ ենթադրութեամբ հաւասար է ԵԴ կողման, եւ ԲԿ հաւասար չինուած է ԵՖ կողման. ուստի ԱԿ հաւասար է ԴՖ կողման (Նախ. Ե. Հետ.)։ Սակայն ենթադրութեամբ ԱԳ հաւասար է ԴՖ կողման. ուստի ԱԳ հաւասար է ԱԿ կողման (Ա. 1)։ Բայց ԱԳ խոտորնակ գիծը՝ ուղղահայեացին մօտ եղող ԱԿ խոտորնակ գծէն հաւասար չի կրնար ըլլալ (Նախ. ԺԵ.). ուստի ԲԳ եւ ԵՖ անհաւասար չեն կրնար ըլլալ. ուրեմն եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ժ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԸ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու անկիւնք զոյգք երկուց զոյգ մը անհաւասար են, երկուքն ալ սուր են:




Եթէ ԱԳ եւ ԲԴ գիծերը ԱԲ գծին ուղղահայեաց են, իրարու զուգահեռական են:

Քանզի, եթէ կրնայինք մէկզմէկ կարել ԱԲ գծին մէկ կամ միւս կողմն եղող որեւիցէ կէտի մը վրայ, ինչպէս Ո, միեւնոյն կէտէն միեւնոյն գծին վրայ երկու ուղղահայեաց քաշուած պիտի ըլլար, որ անկարելի է (Նախ. ԺԴ.):

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու գծեր երբոր գծի մը հետ կողմն, անոր մէկ կողման վրայ կազմուած ներքին անկիւնաց գումարն երկու ուղիղ անկիւնաց հաւասար ընելով, երկու գծերն իրարու զուգահեռական են:




Եթէ ԵԳ եւ ԲԴ գծերը, ԱԲ գիծը կարելով, ԲԱԳ եւ ԱԲԴ անկեանց գումարն երկու ուղիղ անկեանց հաւասար կ'ընեն, ԵԳ եւ ԲԴ գծերը զուգահեռական են:

Ա՛Բ գծին մէջէն կէտէն, Կ, ԵԳ գծին ուղղահայեաց ԵԿԶ գիծը քաշէ. ԲԴ գծին ալ ուղղահայեաց պիտի ըլլայ: Քանզի, ենթադրութեամբ, ԲԱԳ եւ ԱԲԴ անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց. նաեւ ԲԱԳ եւ ԲԱԵ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է (Նախ. Ա.). ԲԱԳ անկիւնը երկու կողմէն հանուելով, կը մնայ ԱԲԴ=ԲԱԵ անկեան: ԵԿԱ անկիւնն ալ հաւասար է ԲԿԶ անկեան (Նախ. Դ.). ուստի ԵԿԱ եւ ԲԿԶ եռանկիւնները իրարու հաւասար են,

եւ ԿԵԱ=ԿԶԲ անկեան (Նախ. Զ. Հետ.): Բայց ԿԵԱ ուղիղ անկիւն է, ուստի ԿԶԲ ալ ուղիղ անկիւն է. ուրեմն ԵԳ եւ ԲԴ գծերը, նոյն գծին ուղղահայեաց ըլլալով, զուգահեռական են (Նախ. ԺԸ.):

Պոր. Երբ երկու զուգահեռական գծեր երրորդ գծով մը կը կտրուին, կազմուած ութը անկիւնները մասնաւոր անուններ ունին:



Զուգահեռական գծերուն միջի կողմը եղող չորսը՝ ներքին անկիւններ, իսկ միւս չորսը արտաքին անկիւններ կը կոչուին:

Երկու ներքին կամ երկու արտաքին անկիւններ, որոնք այլեւայլ գագաթներ ունին, ու կտրող գծին միեւնոյն կողմը կը կենան, նոյնակողմեան անկիւններ կը կոչուին: Զօրօրինակ, ԱԿՕ եւ ԿՕԴ, նաեւ ԲԿՕ եւ ԿՕԴ՝ ներքին նոյնակողմեան անկիւններ, այլ ԵԿԱ եւ ԳՕՃ, նաեւ ԲԿԵ եւ ԴՕՃ արտաքին նոյնակողմեան անկիւններ են:

Երկու ներքին կամ երկու արտաքին անկիւններ որոնք այլեւայլ գագաթներ ունին եւ կտրող գծին միեւնոյն կողմը չեն, փոխադարձ անկիւններ կը կոչուին: Զօրօրինակ, ԱԿՕ եւ ԴՕԿ, նաեւ ԳՕԿ եւ ԲԿՕ՝ ներքին փոխադարձ անկիւններ, այլ ԵԿԲ եւ ԳՕՃ, նաեւ ԱԿԵ եւ ՃՕԴ արտաքին փոխադարձ անկիւններ են:

Մէկ արտաքին ու մէկ ներքին անկիւններ, որոնք այլեւայլ գագաթներ ունին եւ կտրող գծին միեւնոյն կողմը կը կենան, հակադիր արտաքին ու ներքին անկիւններ կը կոչուին: Զօրօրինակ, ԱԿԵ եւ ԿՕԴ, նաեւ ԵԿԲ եւ ԿՕԴ հակադիր արտաքին ու ներքին անկիւններ են:


Հետ. 1. Երբ ԵՃ գիծը ԱԲ եւ ԳԴ գծերը կարելով, ԱԿՕ եւ ԿՕԴ փոխադարձ անկիւնները իրարու հաւասար կ'ընէ, ԱԲ եւ ԳԴ գծերն իրարու զուգահեռական են: Քանզի ԱԿՕ=ԿՕԴ հաւասարութիւնը, երկու կողմը ՕԿԲ գումարելով, կ'ըլլայ ԱԿՕ+ՕԿԲ=ԿՕԴ +ՕԿԲ. սակայն ԱԿՕ+ՕԿԲ հաւասար է երկու ուղիղ

անկեանց (Նախ. Ա.), ուստի ԿՕԴ+ՕԿԲ հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց. ուրեմն ԳԴ եւ ԱԲ զուգահեռական են։

Հէտ. 2. Երբ ԵՖ գիծը ԱԲ եւ ԳԴ գծերը կտրելով, ԵԿԲ եւ ԿՕԴ հակադիր արտաքին եւ ներքին անկիւնները իրարու հաւասար կ'ընէ, ԱԲ եւ ԳԴ գծերն իրարու զուգահեռական են։ Քանզի, իւրաքանչիւրին հետ ՕԿԲ գումարուելով, ԵԿԲ+ՕԿԲ = ԿՕԴ+ՕԿԲ. սակայն ԵԿԲ+ՕԿԲ հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց. ուրեմն ԿՕԴ+ՕԿԲ ալ հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց, ու ԳԴ եւ ԱԲ զուգահեռական են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ի. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ գիծ մը երկու զուգահեռական գծեր կը կտրէ, ներքին եւ հակադիր արտաքին անկիւնները իրարու հաւասար են։




Եթէ ԵՖ գիծը ԱԲ եւ ԳԴ զուգահեռական գծերը կտրելով, ՕԿԲ եւ ԿՕԴ, նաեւ ՕԿԱ եւ ԿՕԴ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար կ'ընէ։

Քանզի, եթէ ՕԿԲ+ԿՕԴ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար չէ, ինչ գիծը քաշէ, ՕԿՀ+ԿՕԴ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար ընելով. անտանի ԻՀ եւ ԳԴ զուգահեռական կ'ըլլան (Նախ. ԺԹ.), եւ կ'ելլայ վրայէն ԳԴ գծին զուգահեռական երկու գիծ, ԻՀ եւ ԱԲ, քաշուած կ'ըլլայ, որ անկարելի է (Ա. 12). ուրեմն ԿԲ եւ ԿՀ՝ զուգընթաց, ու ԿՕԴ եւ ՕԿԲ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար են։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ՕԿԱ+ԿՕԴ հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց։

Հէտ. 1. Եթէ ՕԿԲ ուղիղ անկիւն է, ԿՕԴ ալ ուղիղ է. ուրեմն երկու զուգահեռական գծերէն մէկուն ուղղահայեաց եղող գիծը, միւսին ալ ուղղահայեաց է։

Հէտ. 2. Երբ գիծ մը երկու զուգահեռական գծեր կը կտրէ, փոխադարձ անկիւնները իրարու հաւասար են։




Եթէ գիծը ԱԲ եւ ԳԴ զուգահեռական գծերը կտրելով, ՕԿԱ անկիւնը ԿՕԴ անկեան հաւասար կ'ընէ։ Քանզի ՕԿԲ+ԿՕԴ հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց. ՕԿԲ+ՕԿԱ ալ հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց (Նախ. Ա.), ուստի ՕԿԲ+ԿՕԴ = ՕԿԲ+ՕԿԱ. եւ, ՕԿԲ հանուելով, կը մնայ ԿՕԴ = ՕԿԱ։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ԿՕԴ = ՕԿԲ։

Հէտ. 3. Երբ գիծ մը երկու զուգահեռական գծեր կը կտրէ, հակադիր արտաքին եւ ներքին անկիւնները իրարու հաւասար են։ Քանզի ՕԿԲ+ԿՕԴ, նաեւ ՕԿԲ+ԵԿԲ երկու ուղիղ անկեանց հաւասար ըլլալով, իրարու հաւասար են, եւ ՕԿԲ հանուելով կը մնայ ԿՕԴ = ԵԿԲ։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ԱԿԵ = ԿՕԴ։

Հէտ. 4. Ակնյայտ է թէ, երբ գիծ մը երկու զուգահեռական գծեր խոտորնակի կը կտրէ, կազմուած ութ անկեանց չորս արտանկիւնները իրարու հաւասար՝ եւ չորս բթանկիւնները իրարու հաւասար են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու գծեր երբեմն գծէ մը կը կտրուին՝ ներքին հակադիր անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկիւններէ փոքր ընելով, այն երկու գծերը, երկար բաւական երկարելին, իրար պիտի կտրեն։



Եթէ ԳԴ եւ ԻՀ երկու գծերը ԵՖ գծէն կտրուին՝ ՕԿՀ եւ ԿՕԴ անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկիւններէ փոքր ընելով, ԻՀ եւ ԳԴ գծերը, եթէ բաւական երկարելին, իրար պիտի կտրեն։

Փանդի, եթէ չկարեն, զուգահեռական են (Սահմ. 12)։ *Բայց եթէ զուգահեռական ըլլային, երկու ուղիղ անկեանց հաւասար պիտի ըլլար* ՕԿՀ *եւ* ԿՕԴ *անկեանց գումարը* (Նախ. Ի.)*, բայց ենթադրութեամբ երկու ուղիղ անկիւններէ փոքր է. ուրեմն* ԻՀ *եւ* ԳԴ *գծերը զուգահեռական չեն եւ, եթէ բաւական երկնցուին, իրար պիտի կարեն։*

Հետ. Յայտնի է թէ ԻՀ *եւ* ԳԴ *գծերը իրար պիտի կարեն եթէ գծին այն կողմը ուր* ՕԿՀ *եւ* ԿՕԴ *անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկիւններէ փոքր է։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու ուղիղ գծերը որ երբորդի մը ընդհանրական են, իրարու ալ ընդհանրական են։




Եթէ ԳԴ եւ ԱԲ գծերը ԵՖ գծին զուգահեռական են, իրարու ալ զուգահեռական են։

ԵՖ գծին ուղղահայեաց ՓՊՐ գիծը քաշէ. ԱԲ եւ ԳԴ գծերն ալ կտրելով։ Որովհետեւ ԱԲ զուգահեռական է ԵՖ գծին, ՓՐ ուղղահայեաց է ԱԲ գծին (Նախ. Ի. Հետ. 1)*. եւ, որովհետեւ ԳԴ զուգահեռական է ԵՖ գծին, ՓՐ ուղղահայեաց է նաեւ ԳԴ գծին։ Ուրեմն ԱԲ եւ ԳԴ միեւնոյն գծին ուղղահայեաց ըլլալով, իրարու զուգահեռական են* (Նախ. ԺԸ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու գծեր որ երբոր ընդհանրական են, ամէն պէտ երբէք չհանդիպիր հետաւորութենէն ոռնին։

Եթէ ԳԴ զուգահեռական է ԱԲ գծին, անոր որեւիցէ երկու կէտերը, Հ եւ Կ, ԱԲ գծէն հաւասար բաշխս հեռու են։




Քաշէ ԳԴ գծին ուղղահայեաց ՖՀ եւ ԵԿ գծերը. ասոնք ԱԲ ին ալ ուղղահայեաց (Նախ. Ի. Հետ. 1)՝ *եւ իրարու զուգահեռական են* (Նախ. ԺԸ.)։ *Հիմա ապացուցուելու է թէ իրարու հաւասար են։*

ԿՖ գիծը քաշէ։ Որովհետեւ այս գիծը ԱԲ եւ ԳԴ զուգահեռական գծերը կը կտրէ, ԿՖԵ եւ ՖԿՀ ներքին փոխադարձ անկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ի. Հետ. 2)։ *Նաեւ, որովհետեւ ԿՖ գիծը ՖՀ եւ ԵԿ զուգահեռական գծերը կը կտրէ, ԵԿՖ եւ ԿՖՀ փոխադարձ անկիւնները իրարու հաւասար են։ Ուստի, որովհետեւ ՖՀԿ եւ ԿՖԵ եռանկեանց ԿՖ կողմը հասարակաց է, եւ մէկուն երկու անկիւնները միւսին երկու անկիւններուն հաւասար են, եռանկիւնները իրարու հաւասար են* (Նախ. Զ.)։ *Ուրեմն ԵԿ եւ ՖՀ իրարու հաւասար են։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու անկեանց կողքերը նոյն ուղղութիւնն ունենալով երբոր ընդհանրական են, անկիւնները երբոր հաւասար են։




Եթէ ԱԲ զուգահեռական է ԵԴ գծին եւ ԱԳ ալ՝ ԵՖ գծին, ԲԱԳ եւ ԴԵՖ անկիւնները իրարու հաւասար են։

Երկնցուր ԴԵ գիծը ԱԳ գիծը կրճատելով Կ կէտին վրայ։ Որովհետեւ ԵՖ գիծը ԿԳ գծին զուգահեռական է, ԴԵՖ հաւասար է ԴԿԳ անկեան (Նախ. Ի. Հետ. 3)*. եւ, որովհետեւ ԴԿ գիծը ԱԲ գծին զուգահեռական է, ԴԿԳ հաւասար է ԲԱԳ անկեան. ուրեմն ԴԵՖ հաւասար է ԲԱԳ անկեան* (Առ. 1)։

Պոր. Պէտք է որ ԵՖ գիծը ԱԳ ին ուղղութիւնն ունենայ, ԱԲ ալ՝ ԵԴ ին. քանզի, եթէ ՖԵ երկնցուի դէպ ի Հ, ԴԵՀ եւ ԲԱԳ անկիւնները իրարու զուգահեռական կողմեր պիտի ունենան, բայց իրարու հաւասար պիտի չըլլան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որևէիցե եռանկեան երեք անկիւնները հաւասար են երկու ուղիղ անկեանց։



ԱԲԳ եռանկեան մէջ Ա, Բ եւ Գ անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց։

ԳԱ կողմը երկնցուր դէպի Դ, եւ Ա կէտէն ԲԳ կողման զուգահեռական ԱԵ գիծը քաշէ. որովհետեւ ԳԱԴ գիծը ԱԵ եւ ԳԲ զուգահեռական գծերը կը կտրէ, ԴԱԵ եւ ԱԳԲ հակադիր արտաքին եւ ներքին անկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Ի. Հետ. 3). եւ, որովհետեւ ԱԲ գիծը յիշեալ զուգահեռականները կը կտրէ, ԱԲԳ եւ ԲԱԵ փոխադարձ անկիւնները իրարու հաւասար են. ուստի ԱԲԳ եռանկեան երեք անկիւններուն գումարը հաւասար է ԳԱԲ, ԲԱԵ եւ ԵԱԴ անկեանց գումարին. ուրեմն երեք անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց (Նախ. Ա.)։

Հետ. 1. Երբ եռանկեան մը երկու անկիւնները կամ անոնց գումարը գիտցուած են, երրորդ անկիւնը կը գտնուի այն գումարը երկու ուղիղ անկեանց գումարէն հանուելով։

Հետ. 2. Երբ երկու եռանկեան մէկմէկուն երկու անկիւնները միւսին երկու անկիւններուն հաւասար են, անոնց երրորդ անկիւնները ալ իրարու հաւասար են, եւ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են։

Հետ. 3. Որևէիցէ եռանկեան մէջ միայն մէկ ուղիղ անկիւն կրնայ ըլլալ. եթէ երկու կրնար ըլլալ, երրորդը ոչինչ պիտի ըլլար։ Առաւել եւս անհնար է որ եռանկիւն մը մէկէն աւելի բթանկիւն ունենայ։

Հետ. 4. Անկիւնագիծ եռանկեան երկու սրանկեանց գումարը մէկ ուղիղ անկեան հաւասար է։


Հետ. 5. Որովհետեւ ամէն հաւասարակողմ եռան-

կիւն հաւասարանկիւն ալ է (Նախ. ԻԱ. Հետ.), անոր ամէն մէկ անկիւնը երկու ուղիղ անկեանց երրորդ մասին հաւասար է. այսինքն, եթէ ուղիղ անկիւնը մէկ համարուի, հաւասարակողմ եռանկեան ամէն մէկ անկիւնը $\frac{2}{3}$-ով պիտի ցուցուի։

Հետ. 6. Որևէիցէ եռանկեան մէջ, ԱԲԳ, արտաքին անկիւնը, ԲԱԴ, հաւասար է ներքին դիմացի երկու անկեանց գումարին, Բ եւ Գ։ Քանզի, որովհետեւ ԱԵ զուգահեռական է ԲԳ ին, ԲԱԵ անկիւնը հաւասար է Բ անկեան, եւ ԴԱԵ հաւասար է Գ անկեան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԶ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն բազմանկեան ներքին անկեանց գումարը, նոյն բազմանկեան կողմանց քանակին կրկնապատիկէն չորս պակաս ուղիղ անկեանց հաւասար է։



Եթէ որևէիցէ բազմանկեան, ԱԲԳԴԵԶԷ, գագաթներուն մէկէն, Ա, տրամանկիւններ քաշուին, ԱԳ, ԱԴ, ԱԵ, ԱԶ, յայտնի է թէ եօթը կողմ ունեցող բազմանկիւնը հինգ եռանկեան պիտի բաժնուի, ուրկէ կողմ ունեցողը՝ վեց եռանկեան, եւ, առ հասարակ, ամէն բազմանկիւն իր կողմանց թիւէն երկու պակաս եռանկեան պիտի բաժնուի. քանզի, որովհետեւ Ա գագաթը բոլոր եռանկեանց հասարակաց է, Ա անկիւնը չհինգ երկու կողմերէն զատ՝ բազմանկեան իւրաքանչիւր կողմն մէկմէկ եռանկեան խարիսխ կ'ըլլայ։ Նաեւ յայտնի է թէ ասոնց եռանկեանց բոլոր անկիւններուն գումարը բազմանկեան անկիւններուն գումարին հաւասար է. ուստի, որովհետեւ բազմանկիւնն իր կողմանց թիւէն երկու պակաս եռանկիւն ունի, անոր բոլոր ներքին անկեանց գումարը անոր կողմանց թուոյն կրկնապատիկէն չորս պակաս ուղիղ անկեանց հաւասար է։

Հե՛տ. 1. Քառանկեան մը անկեանց գումարը հաւասար է $4\times2-4$ կամ 4 ուղիղ անկեան։ Ուրեմն, երբ քառանկիւնը հաւասարանկիւն է, իւրաքանչիւր անկիւնը ուղիղ անկիւն է։


Հե՛տ. 2. Հնգանկեան մը անկեանց գումարը հաւասար է $5\times2-4$ կամ 6 ուղիղ անկեան։ Ուրեմն, երբ հնգանկիւնը հաւասարանկիւն է, իւրաքանչիւր անկիւնը $\frac{6}{5}$ ուղիղ անկեան հաւասար է։

Հե՛տ. 3. Վեցանկեան մը անկեանց գումարը հաւասար է $6\times2-4$ կամ 8 ուղիղ անկեան։ Ուրեմն, երբ վեցանկիւնը հաւասարանկիւն է, իւրաքանչիւր անկիւնը $\frac{4}{3}$ ուղիղ անկեան հաւասար է։

Հե՛տ. 4. *ո* կողմ ունեցող բազմանկեան մը ներքին անկեանց գումարը հաւասար է $2ո-4$ ուղիղ անկեանց։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԷ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ բազմանկեան մը բոլոր կողմերը ինչպէս ուղղութեամբ երկնցուին, ա, բ, գ, դ, ե, զ, եւ է արտաքին անկեանց գումարը չորս ուղիղ անկեանց հաւասար պիտի ըլլայ։




Եթէ ԱԲԴԵԶԷ բազմանկեան կողմերը միեւնոյն ուղղութեամբ երկնցուին, ա, բ, գ, դ, ե, զ, եւ է արտաքին անկեանց գումարը չորս ուղիղ անկեանց հաւասար պիտի ըլլայ։

Քանզի իւրաքանչիւր ներքին անկիւն, իր արտաքին անկեան հետ գումարուելով, կընէ $Ա+ա$, հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց (Նախ. Ա.)։ Բայց բազմանկիւնը քանի ներքին անկիւն որ ունի՝ նոյնքան ալ արտաքին անկիւն ունի, նաեւ իւրաքանչիւրէն իր կողմերուն չափ ունի. ուստի ներքին եւ արտաքին անկեանց ամենուն գումարը, բազմանկեան կողմանց թիւոյն երկու անգամ ուղիղ անկեանց հաւասար է։ Այսինքն, եթէ բազմանկիւն մը

ո կողմ ունի, անոր ներքին եւ արտաքին անկեանց գումարը հաւասար է $2ո$ ուղիղ անկեանց։ Բայց ա նոր ներքին անկեանց գումարը հաւասար է $2ո-4$ ուղիղ անկեանց (Նախ. ԻԶ. Հետ. 4)։ եթէ $2ո-4$ գումարը $2ո$ գումարէն կը հանուի, կը մնայ արտաքին անկեանց գումարը չորս ուղիղ անկեանց հաւասար։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԸ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն զուգահեռագծի ըն ընդդիմակաց կողմերը և ըն անկիւնները իրարու հաւասար են։



ԱԲԴԳ զուգահեռագծին մէջ ԱԲ=ԴԳ կողման եւ ԲԳ=ԱԴ կողման, նաեւ Ա=Գ անկեան եւ ԱԲԳ=ԱԴԳ անկեան։


Բդ տրամանկիւնը քաշէ։ ԱԴԲ եւ ԴԲԳ եռանկեանց մէջ, Բդ կողմը հաւասարակաց է. եւ, որովհետեւ ԱԴ ու ԲԳ զուգահեռական են, ԱԴԲ=ԴԲԳ անկեան (Նախ. Ի. Հետ. 2). եւ, որովհետեւ ԱԲ զուգահեռական է ԳԴ գծին, ԱԲԴ=ԲԴԳ անկեան. ուստի եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Զ.), եւ ԱԲ=ԴԳ ու ԲԳ=ԱԴ կողման. ուրեմն զուգահեռագծի մը ընդդիմակաց կողմերը իրարու հաւասար են։

Նաեւ, որովհետեւ եռանկիւնները իրարու հաւասար են, Ա անկիւնը հաւասար է Գ անկեան, եւ ԲԴԱ+ԲԴԳ կամ ԱԴԳ անկիւնը հաւասար է ԴԲԳ+ԱԲԴ կամ ԱԲԳ անկեան. ուրեմն զուգահեռագծի մը ընդդիմակաց անկիւններն իրարու հաւասար են։

Հե՛տ. Ադ եւ Բգ զուգահեռականաց մէջտեղն ինկող ԱԲ եւ ԴԳ զուգահեռականները իրարու հաւասար են եւ ԴԲ տրամանկիւնը զուգահեռագծին երկու հաւասար եռանկեանց կը բաժնէ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ *զոյգ-զոյգ* **հաւասար են, հաւասար կողմերը զուգահեռական են, և զուգահեռագիծ է։**




Եթէ ԱԲԴԳ *քառանկեան մէջ* ԱԲ *հաւասար է* ԴԳ *կողման,* ԲԳ *ալ* ԱԴ *կողման, այս հաւասար եղող կողմերն իրարու զուգահեռական են, եւ քառանկիւնը զուգահեռագիծ է։*

Քաշէ ԲԴ տրամանկիւնը։ ԱԲԴ ու ԲԴԳ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարակողմ են. ուստի իրարու հաւասար են. եւ, որովհետեւ ԱԴԲ=ԴԲԳ անկեան (Նախ. ԺԴ.), ԱԴ զուգահեռական է ԲԳ կողման. եւ, որովհետեւ ԱԲԴ=ԲԴԳ անկեան, ԱԲ զուգահեռական է ԳԴ կողման (Նախ. ԺԹ. Հետ. 1). ուրեմն ԱԲԴԳ քառանկիւնը զուգահեռագիծ է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Լ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ *զոյգ-զոյգ* **հաւասար են, հակառակ անկեանց երկու զոյգերն ալ հաւասար են, ան քառանկիւնը զուգահեռագիծ է։**




Եթէ ԱԲԴԳ *քառանկեան* ԱԲ *կողմը* ԳԴ *կողման հաւասար ու զուգահեռական է, քառանկիւնը զուգահեռագիծ է։*

Քաշէ ԲԴ տրամանկիւնը, ԱԲԴ քառանկիւնը երկու եռանկեան բաժնելով։ Որովհետեւ ԱԲ եւ ԳԴ զուգահեռական են, ԱԲԴ եւ ԲԴԳ փոխադարձ անկիւններն իրարու հաւասար են (Նախ. Ի. Հետ. 2). նաեւ ԲԴ կողմը հասարակաց է ու ԱԲ հաւասար է ԴԳ կողման։ Ուստի ԱԲԴ եռանկիւնը ԲԴԳ եռան-

կեան հաւասար է (Նախ. Ե.), *եւ* ԱԴ=ԲԳ *կողման, ու* ԱԴԲ=ԴԲԳ *անկեան. ուրեմն* ԱԴ *զուգահեռական է* ԲԳ *կողման, եւ* ԱԲԳԴ *զուգահեռագիծ է։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԼԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Զոյգ-զոյգ հաւասար են քառանկիւններուն երբ երկու հաւասար մասերու կը բաժնեն։



ԱԲԳԴ *զուգահեռագծին մէջ* ԲԴ *եւ* ԱԳ *տրամանկիւնները իրար այնպէս կը կտրեն որ* ԲԵ=ԵԴ, *նաեւ* ԱԵ=ԵԳ։

ԱԴԵ *եւ* ԲԵԳ *եռանկեանց մէջ* ԱԴ=ԳԲ *կողման (Նախ. ԻԸ.), ԱԴԵ=ԳԲԵ անկեան եւ ԴԱԵ=ԵԳԲ անկեան (Նախ. Ի. Հետ. 2). ուստի եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Նախ. Զ.), եւ* ԱԵ=ԵԳ, *նաեւ* ԴԵ=ԵԲ։

Պար. Երբ քառանկիւնը տարանկիւն է, որովհետեւ ԱԲ եւ ԲԳ կողմերն իրարու հաւասար են, ԱԵԲ ու ԲԵԳ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարակողմ՝ ու հետեւապէս իրարու հաւասար են (Նախ. Ժ.). *ուստի* ԱԵԲ=ԲԵԳ *անկեան. ուրեմն տարանկեան մը տրամանկիւններն իրարու ուղղահայեաց են* (Սահմ. 10)։

ԳԻՐՔ Բ·

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹԻՒՆ

Սահմանք։

1· ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՆ է այն քանորդը որ քանակութիւն մը ուրիշ համասեռ քանակութեամբ բաժնելէն կ'ելլէ։ Եթէ Ա. եւ Բ կը ներկայացընեն համասեռ քանակութիւններ, Ա-ի առ Բ ունեցած ընդհանուր համեմատականը կը ցուցուի այսպէս, $\frac{Բ}{Ա}$։

2· Եթէ Ա., Բ, Գ եւ Դ չորս քանակութիւններուն առաջին երկուքին հանդէպ ունին որ $\frac{Բ}{Ա}=\frac{Դ}{Գ}$, անատեն կ'ըսուի թէ Ա. այնպէս կը համեմատի Բ-ի, ինչպէս Գ՝ Դ-ի։ Երբ չորս քանակութիւնք իրարու հետ այս յարաբերութիւնն ունին, հետեւողութեամբ մէջ են կ'ըսուի։

Ա-ի առ Բ ունեցած ընդհանուր համեմատականը Գ-ի առ Դ ունեցած ընդհանուր համեմատականին հաւասար ըլլալը ցուցընելու համար, քանակութիւնները կը դրուին այսպէս, Ա։Բ::Գ։Դ, եւ կը կարդացուին, Ա. այնպէս կը համեմատի Բ-ի, ինչպէս Գ՝ Դ-ի։

Այն քանակութիւնները որ իրարու հետ կը բաղդատուին, եղբ֊ համեմատութեան կը կոչուին։ Առաջին ու վերջին եզրերը եզեր֊ ծայր֊ եւ երկրորդ ու երրորդ եզրերը եզեր֊ միջին֊ կը կոչուին։ Զորօրինակ, Ա. եւ Դ ծայրեր՝ այլ Բ ու Գ միջինք են։

3· Համեմատական չորս քանակութեանց առաջինը եւ երրորդը կը կոչուին նախադաս֊, եւ երկրորդն ու չորրորդը՝ յետադաս֊։

4· Երեք քանակութիւնք իրարու համեմատական են, երբ առաջնոյն առ երկրորդն ունեցած ընդհանուր համեմատականը նոյն է երկրորդին առ երրորդն ունեցած ընդհանուր համեմատականին հետ, եւ անատեն միջին եզրը միւս երկուքին միջեւ միջին համեմատականը կը կոչուի· զորօրինակ, Ա։Բ::Բ։Գ։

5· Չորս համեմատական քանակութիւններ խոտորնակ համեմատութիւն ունին կ'ըսուի, երբ յետադասները նախադաս՝ եւ նախադասները յետադաս կ'ըլլան։

6· Չորս համեմատական քանակութիւններ փոփոխական համեմատութիւն ունին կ'ըսուի, երբ նախադասը նախադասին հետ՝ եւ յետադասը յետադասին հետ կը բաղդատուի։

7· Չորս համեմատական քանակութիւններ բաղխական համեմատութիւն ունին կ'ըսուի, երբ նախադասին ու յետադասին գումարը կը բաղդատուի կամ նախադասին կամ յետադասին հետ։

8· Չորս համեմատական քանակութիւններ բաժանական համեմատութիւն ունին կ'ըսուի, երբ նախադասին ու յետադասին տարբերութիւնը կը բաղդատուի կամ նախադասին կամ յետադասին հետ։

9· Քանակութեանց համաբազմապատիկները այն արտադրեալներն են, որ քանակութիւնները միեւնոյն բազմապատկիչով բազմապատկելէ կ'ելլեն։ Զորօրինակ, $մ×Ա$ եւ $մ×Դ$ Ա-ի ու Դ-ի համաբազմապատիկներն են։

10· Երկու քանակութիւններ փոխադարձաբար համեմատական են, երբ իրարու հետ անանկ յարաբերութիւն ունին որ, եթէ մէկը որեւիցէ թուով բազմապատկուի, միւսը միեւնոյն թուով կը բաժնուի։ Զորօրինակ, եթէ Ա. եւ Բ իրարու անանկ յարաբերութիւն ունին, որ, երբ Ա՝ $ն×Ա$ կ'ըլլայ, Բ կ'ըլլայ $\frac{Բ}{ն}$, Ա. եւ Բ. փոխադարձաբար համեմատական են կ'ըսուի։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Համեմատական ըսբս հանակումեանց երկու ծայրերուն արտադրեալը հաւասար է երկու միջիններուն արտադրեալին :

եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե ,

անսաեն Ա × Ե = Բ × Գ ,

քանզի $\frac{Բ}{Ա} = \frac{Ե}{Գ}$ (Սահմ. 2).

ուրեմն $Բ = Ա \times \frac{Ե}{Գ}$ *կամ* Բ×Գ = Ա×Ե :

Հետ. եթէ երեք քանակութիւնք իրարու համեմատական են (Սահմ. 4), միջին եղբին քառակուսին հաւասար է երկու ծայրերուն արտադրեալին :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ երկու հանակումեանց արտադրեալը հաւասար է միւսին երկու հանակումեանց արտադրեալին, կրնան հանդամանութիւնը հակադարձել, ըսել թէ արտադրեալին արտադրիչները միջին կարգի են, այսինքն ծայրերը ընդմիջին :

եթէ Ա×Ե=Բ×Գ ,

անսաեն Ա : Բ :: Գ : Ե .

քանզի, եթէ Գ այնպէս չի համեմատիր Ե ի ինչպէս Ա՝ Բ ի, ենթադրենք թէ Գ այնպէս կը համեմատի Ե էն կամ մեծ կամ փոքր եղող Ե՛ ին, այսինքն

թէ Ա : Բ :: Գ : Ե՛ .

անսաեն Ա×Ե՛ = Բ×Գ , (Նախ. Ա.),

կամ $Ե' = \frac{Բ \times Գ}{Ա}$. *բայց* $Ե = \frac{Բ \times Գ}{Ա}$.

ուսսի Ե՛ = Ե *եւ չորս քանակութիւններն իրարու համեմատական են, այսինքն,* Ա : Բ :: Գ : Ե :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ ըսբս հանակումեանց էրեսք հաւասարապահ են, փոխադարձաբար առնուելով ալ հաւասարապահ են :

եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե ,

անսաեն Ա : Գ :: Բ : Ե .

քանզի, որովհետեւ Ա : Բ :: Գ : Ե ,

ուսսի Ա×Ե = Բ×Գ (Նախ. Ա.),

բայց Ա *եւ* Ե *կրնան հանդամանութեան ծայրերն՝ ու* Բ *եւ* Գ *միջիններն ըլլալ* (Նախ. Բ.).

ուրեմն Ա : Գ :: Բ : Ե :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ երկու կարգ հանդամանական հանակումեանց մէկուն նախադասը եւ յետադասը հաւասար են միւսին նախադասին ու յետադասին, ինչպէս եղբերը իրարու համեմատական են :

եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե ,

եւ Ա : Զ :: Գ : Թ ,

անսաեն Բ : Ե :: Զ : Թ .

քանզի , Ա : Գ :: Բ : Ե *կամ* $\frac{Գ}{Ա} = \frac{Ե}{Բ}$,

եւ Ա : Գ :: Զ : Թ *կամ* $\frac{Գ}{Ա} = \frac{Թ}{Զ}$, (Նախ. Գ.).

ուրեմն $\frac{Ե}{Բ} = \frac{Թ}{Զ}$ *կամ* Բ : Ե :: Զ : Թ :

Հետ. եթէ երկու կարգ համեմատական քանակութեանց մէկուն նախադասը եւ յետադասը հաւասար է միւսին նախադասին ու յետադասին, մնացած եղբերը իրարու համեմատական են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Չորս համեմատական *տանակութեան* իրարու հակադարձ առնուելով եւս *երբոր* համեմատական են։

Եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե,
անսաւոն Բ : Ա :: Ե : Գ.
Քանզի Ա×Ե = Բ×Գ (Նախ. Ա.).
ուսաի Բ : Ա :: Ե : Գ (Նախ. Բ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Չորս համեմատական *տանակութեան* իրեւ բաղադրեալ եւ իրեւ բաժանեալ առնուելով *երբոր* համեմատական են։

Եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե,
անսաւոն Ա±Բ : Ա :: Գ±Ե : Գ.
Քանզի Բ×Գ = Ա×Ե (Նախ. Ա.).
Եւ եթէ այս հաւասարութեան երկու անդամները դուրս մարուին Ա×Գ *ի հետ կամ անկէ հանուին, հետեւեալ հաւասարութիւնը կ'ելլէ,* Ա×Գ±Բ×Գ = Ա×Գ±Ա×Ե,
կամ (Ա±Բ)×Գ = (Գ±Ե)×Ա.
ուրեմն Ա±Բ : Ա :: Գ±Ե : Գ (Նախ. Բ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու *տանակութեան* հաճախականութիւնները նոյն ընդհանուր համեմատականն ունին քանզի նոյն ինքն *տանակութեան*։

ՏՏ×Ա. : ՏՏ×Բ :: Ա. : Բ,
քանզի ՏՏ×Ա×Բ = ՏՏ×Բ×Ա, *որովհետեւ երկու անդամներուն միջի քանակութիւնները միեւնոյն են,*
ուրեմն ՏՏ×Ա. : ՏՏ×Բ :: Ա. : Բ (Նախ. Բ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ *երբոր* համեմատական *տանակութեան* նախապատանեքը *տանակութեամբ* բազմապատկուին, եւ յետապատանեքը *տանակութեամբ* բազմապատկուին, *երբոր* ծրեալ *տանակութեամբ* բազմապատկուին, *երբոր* համեմատական պիտի ըլլան։

Եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե,
անսաւոն ՏՏ×Ա. : Ն×Բ :: ՏՏ×Գ : Ն×Ե.
Քանզի Ա×Ե = Բ×Գ, *եւ, եթէ երկու անդամները* ՏՏ×Ն *ով բազմապատկուին, հաւասարութիւնը կ'ելլայ* (ՏՏ×Ա) × (Ն×Ե) = (ՏՏ×Գ) × (Ն×Բ).
ուրեմն ՏՏ×Ա. : Ն×Բ :: ՏՏ×Գ : Ն×Ե։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ *երբոր* համեմատական *տանակութեան* յետապատանեքը *աւելցուին* կամ *պակասցուին* *երբոր* *տանակութիւններով* *նախապատանեքուն* *ունեցած* ընդհանուր համեմատական *ունին*, *եւ* *տանակութիւնները* *նախապատանեքն* *երբոր* համեմատական պիտի ըլլան։

Եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե,
եւ Ա : Գ :: Տ : Ն,
անսաւոն Ա : Գ :: Բ±Տ : Ե±Ն.
Քանզի Ա×Ե = Բ×Գ,
եւ Ա×Ն = Գ×Տ (Նախ. Ա.).
ուսաի Ա×Ե±Ա×Ն = Բ×Գ±Գ×Տ,
վամ Ա×(Ե±Ն) = Գ×(Բ±Տ).
ուրեմն Ա. : Գ :: Բ± Տ : Ե±Ն (Նախ. Բ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէկնոյն ընդհանուր համեմատականն ունեցող տրեալ երկու համեմատութեանց տրեալ նախատասը այնպէս կը համեմատի իր յետադասին, ինչպէս նախատասնեղոտն գոտմարը՝ յետադասնեղոտն գոտմարին։

եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե :: Զ : Թ *եւայլն*,

անսահման Ա : Բ :: Ա+Գ+Զ : Բ+Ե+Թ .

քանզի, որովհետեւ Ա : Բ :: Գ : Ե, Ա×Ե=Բ×Գ,

եւ, որովհետեւ Ա : Բ :: Զ : Թ, Ա×Թ=Բ×Զ,

ուստի այս երկու հաւասարութիւններուն հետ Ա×Բ=Ա×Բ *հաւասարութիւնը գումարելով կ'ունենանք*

Ա×Բ+Ա×Ե+Ա×Թ=Ա×Բ+Բ×Գ+Բ×Զ,

կամ Ա×(Բ+Ե+Թ)=Բ×(Ա+Գ+Զ) .

ուրեմն Ա : Բ :: Ա+Գ+Զ : Բ+Ե+Թ ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու *տանակութեանց* մէկն էլ *այնչափ* մասը տասնէն աւելցուի կամ պակսեցուի, միւսն ալ էլ նոյնչափ մասովն աւելցուի կամ պակսեցուի, եւթէ *տանակութեանց* նէրը՝ այն երկու *տանակութեանց* ունեցած ընդհանուր համեմատականը կ'ունենան ։

եթէ Ա *աւելցուի կամ պակսեցուի* $\frac{Ա}{տ}$ *ով*, Ե *ալ* $\frac{Ե}{տ}$ *ով*,

անսահման $Ա : Ե :: Ա \pm \frac{Ա}{տ} : Ե \pm \frac{Ե}{տ}$.

քանզի յայտնի է թէ $Ա \times (Ե \pm \frac{Ե}{տ}) = Ե \times (Ա \pm \frac{Ա}{տ})$, *որովհետեւ իւրաքանչիւր անդամ հաւասար է* $Ա \cdot Ե + \frac{Ե \cdot Ա}{տ}$ ։

ուրեմն չորս քանակութիւններն իրարու համեմատական են (Նախ . Բ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Իրարու համեմատական եղող չորս *տանակութեանց* նման *էրեսներնէրն* ալ իրարու համեմատական են ։

եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե,

անսահման Ա՝ : Բ՝ :: Գ՝ : Ե՝ .

քանզի $\frac{Բ}{Ա} = \frac{Ե}{Գ}$ (Սահ . 2), *եւ երկու անդամները* Ն *կարողութեան հանելով կ'ունենանք*

$\frac{Բ^ն}{Ա^ն} = \frac{Ե^ն}{Գ^ն}$.

ուրեմն Ա՝ : Բ՝ :: Գ՝ : Ե՝ ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու *էրէս* համեմատութեանց մէկուն առաջին եղբը միւսին առաջին եղբովը, երկրորդը երկրորդովը, *եայլն*, բազմապատկուին, արտադրեալներն իրարու համեմատական կ'ըլլան ։

եթէ Ա : Բ :: Գ : Ե,

եւ Զ : Է :: Ը : Թ,

անսահման Ա×Զ : Բ×Է :: Գ×Ը : Ե×Թ .

քանզի, որովհետեւ Ա×Ե=Բ×Գ,

եւ Զ×Թ=Է×Ը,

Ա×Ե×Զ×Թ=Բ×Գ×Է×Ը,


կամ (Ա×Զ)×(Ե×Թ)=(Բ×Է)×(Գ×Ը) .

ուրեմն Ա×Զ : Բ×Է :: Գ×Ը : Ե×Թ ։

ԳԻՐՔ Գ·

ԲՈԼՈՐԱԿ, ԵՒ ԱՆԿԱՆՑ ՉԱՓՈՒԻՆԸ

Սահմանք։



1. Բոլորակը՝ հակարդակ է կոր գիծ մը մէջ առնուած, որուն ամէն մէկ կէտը հաւասարապէս հեռու է գծէն ներս եղող, կէտ մը։ Բոլորակը շրջապատող կոր գիծը շրջանակ կը կոչուի։ Շուրջանակ, Գ՝ բոլորակին կեդրոնը, եւ Ա, Ե, Դ եւայլն կոր գիծը բոլորակին շրջանակն է։

2. Կեդրոնէն մինչեւ շրջանակը քաշուած որեւիցէ ուղիղ գիծ, ԳԱ, ԳԵ, ԳԴ, շառաւիղ կը կոչուի։ Եւ կեդրոնին վրայէն անցնելով երկու կողմէն շրջանակին դպչող գիծը, ԱԲ, տրամագիծ կը կոչուի։


Բոլորակին համար տրուած սահմանէն յայտնի է թէ բոլորակի մը բոլոր շառաւիղները իրարու հաւասար՝ տրամագիծներն ալ իրարու հաւասար են, եւ թէեւ քանի՛մը տրամագիծ շառաւիղին կրկնակն է։

3. Շրջանակին որեւիցէ մասը, ՖՀԿ, աղեղ եւ աղեղին երկու ծայրերն իրար միացընող գիծը, ՖԿ, աղեղին լարը կը կոչուի։

4. Հատուածը բոլորակին այն մասն է որ աղեղի մը եւ անոր լարին մէջտեղը կ'իյնայ։

5. Հատիչ կ'ըսուի բոլորակին այն մասին որ երկու շառաւիղներու, ԳԵ եւ ԳԴ, եւ անոնց մէջ կեցող աղեղան մէջտեղը, ԴԵ, կ'իյնայ։

6. Ուղիղ գիծ մը քովբակէ մը նեբսը կ'ըսուի, երբ անոր ծայրերը շրջանակին մէջն են։



Անկիւն մը, ԲԱԳ, որուն կողմերը լարեր են, գագաթին ալ շրջանակին մէջն է, շրջապատէ անկիւն կը կոչուի։

7. Նեբսը կ'ըսուի եռանկիւնին այն է որուն երեք անկեան գագաթները շրջանակին մէջն են, ինչպէս ԲԱԳ։ Եւ, առհասարակ, որեւիցէ բազմանկիւնն նեբսը կ'ըսուի, երբ անոր բոլոր անկեանց գագաթները շրջանակին մէջն են։ այս պարագային մէջ շրջանակը բազմանկեան պրբսը կ'ըսուի։



8. Հատածող կ'ըսուի այն գծին, ԱԲ, որ շրջանակին երկու կէտը կը կտրէ, եւ որուն մէկ մասը շրջանակին դուրսը՝ ու մէկ մասը ներսը կ'իյնայ։

9. Շօշափող կ'ըսուի այն գծին որ շրջանակին կը դպչի միայն մէկ կէտի վրայ, որչափ որ երկնցուի։ ինչպէս ԳԴ։ Շօշափման կէտ կ'ըսուի այն կէտին՝ ուր շօշափողն ու շրջանակը իրարու կը դպչին։




10. Երկու շրջանակ իրարու կը պղչին կ'ըսուի, երբ միայն մէկ հասարակաց կէտ ունին։

11. Բազմանկիւն մը բոլորակի մը պրբսը կ'ըսուի, երբ անոր բոլոր կողմերը շրջանակին շօշափողներ են։ եւ անաւտն բոլորակը բազմանկեան նեբսը կ'ըսուի։



ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն պրոմաթէնէ՝ բոլորին և անոր շրջանակը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ։




Ունենք բոլորակին ԱԲ տրամագիծը բոլորակն ու անոր շրջանակը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ։

Պահանջի, եթէ ԱԵՒ մասը ԱՖԲ մասին վրայ դրուի, անոնց հասարակաց եղող ԱԲ խարսխին դիրքը չփոխուելով, ԱԵԲ ու ԱՖԲ կոր գծերը զուգընթաց պիտի ըլլան։ Ապա թէ ոչ, մէկուն կամ միւսին վրայ կեդրոնէն անհաւասարապէս հեռու կէտեր կան, որ բոլորակի համար տրուած սահմանին հակառակ է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն լոր պրոմաթէնէն փոքր է։



Ադ լարը ԱԲ տրամագիծէն փոքր է։ Քաշէ ԳԱ և ԳԴ շառաւիղները լարին ծայրերուն։ ԱԴ < ԱԳ+ԳԴ (Գիրք Ա. Նախ. Ի.)։ կամ ԱԴ < ԱԲ։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ո՞ղիղ գիծ մը բոլորակի մը շրջանակէն երկու՝էն աւելի կրնար հատել։

Պահանջի, եթէ կրնար երեք կէտերու դպչիլ, այս երեք կէտերը հաւասարապէս հեռու պիտի ըլլային կեդրոնէն, և ուստի, առ այս կէտերը քաշուած շառաւիղներն իրարու հաւասար երեք ուղիղ գիծ պիտի ըլլային միեւնոյն կէտէն միեւնոյն ուղիղ գծին քաշուած, որ անկարելի է (Գիրք Ա. Նախ. ԺԵ. Հետ. 2)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէկէն աւելի բոլորակ կամ հաւասար բոլորակաց հաւասար աղեղները հաւասար լարեր ունին. և՛, հակադարձաբար, հաւասար լարերը հաւասար աղեղներ ունին։



Եթէ ԱԴ և ԵՕ շառաւիղներն իրարու հաւասար են, նաեւ ԱՄԴ և ԵՆԿ աղեղներն ալ, ԱԴ լարը հաւասար է ԵԿ լարին։


Պահանջի, որովհետեւ ԱԲ և ԵՖ տրամագիծերը իրարու հաւասար են, ԱՄԴԲ կիսաբոլորակը կրնայ ԵՆԿՖ կիսաբոլորակին վրայ դրուիլ, և ԱՄԴԲ ու ԵՆԿՖ կոր գծերն իրարու զուգընթաց պիտի ըլլան։ Բայց ԱՄԴ մասը, ենթադրութեամբ, հաւասար է ԵՆԿ մասին. ուստի Դ կէտը Կ կէտին վրայ պիտի իյնայ. ուրեմն ԱԴ լարը հաւասար է ԵԿ լարին։

Հակադարձաբար, եթէ ԱԴ և ԵՕ շառաւիղներն իրարու հաւասար են, նաեւ ԱԴ լարը՝ ԵԿ լարին, ԱՄԴ և ԵՆԿ աղեղներն իրարու հաւասար են։

Պահանջի, քաշէ ԳԴ և ՕԿ շառաւիղները. ԱԳԴ և ԵՕԿ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարակողմ են, և հետեւապէս իրարու հաւասար. ուստի ԱԳԴ անկիւնը հաւասար է ԵՕԿ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Ժ.)։ Արդ, եթէ ԱԴԲ կիսաբոլորակը դրուի ԵԿՖ կիսաբոլորակին վրայ, որովհետեւ ԱԳԴ և ԵՕԿ անկիւնները իրարու հաւասար են, յայտնի է թէ ԳԴ շառաւիղը ՕԿ շառաւիղին վրայ պիտի իյնայ, Դ կէտն ալ Կ կէտին վրայ. ուրեմն ԱՄԴ աղեղը ԵՆԿ աղեղան հաւասար է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէկնոյն քովրակէ կամ հաւասար քովրակաց ծիգերուն աղեղը ծիգերուն լար ունի, և, հակադարձաբար, ծիգերուն լարը ծիգերուն աղեղ ունի։




Եթէ ԱՀ աղեղը ԱԴ աղեղէն մեծ է, ԱՀ լարը մեծ է ԱԴ լարէն։

ԳԴ եւ ԳՀ չառաւիղները քաշէ. ԱԳՀ եւ ԱԳԴ եռանկեանց մէջ ԱԳ կողմը հաւասարակաց է, ԳԴ եւ ԳՀ, չառաւիղներ ըլլալով, իրարու հաւասար են, եւ ԱԳՀ անկիւնը մեծ է ԱԳԴ անկիւնէն. ուստի երրորդ կողմը, ԱՀ, մեծ է ԱԴ կողմէն (Գիրք Ա. Նախ. Թ.). ուրեմն մեծագոյն աղեղը մեծագոյն լար ունի։ Հակադարձաբար, եթէ ԱՀ լարը ԱԴ լարէն մեծ է, ԱՀ աղեղը մեծ է ԱԴ աղեղէն։ Ջանալի, եթէ ԱԴՀ աղեղը հաւասար ըլլար ԱԴ աղեղան, ԱՀ լարն ալ ԱԴ լարին հաւասար պիտի ըլլար (Նախ. Դ.). եւ, եթէ փոքր ըլլար, ԱՀ լարն ալ ԱԴ լարէն փոքր պիտի ըլլար, որոնց երկուքն ալ ենթադրութեան հակառակ են. ուրեմն, ԱԴՀ աղեղը մեծ է ԱԴ աղեղէն։

Պոր. Ա՛ս տեղը չիշուած աղեղները կիսաշրջանակէն փոքր են. եթէ մեծ ըլլային, հակադարձը ճշմարիտ պիտի ըլլար. քանզի անսահման որչափ որ աղեղները մեծնան, լարերն այնչափ կը պզտիկնան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Լարէ մը ուղղահայեաց տաշուած շառաւիղէ՝ լարը և աղեղը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ։



Եթէ ԿԳ չառաւիղը ուղղահայեաց է ԱԲ լարին, ԱԴ հաւասար է ԲԴ լին, եւ ԱԿ աղեղը՝ ԿԲ աղեղան։

ԳԱ եւ ԳԲ չառաւիղները քաշէ։ ԱԴԳ եւ ԲԴԳ ուղղանկիւն եռանկեանց մէջ ԱԴ եւ ԳԲ կողմերը, չառաւիղներ ըլլալով, իրարու հաւասար են, եւ ԳԴ հաւասարակաց է. ուրեմն ԱԴ հաւասար է ԲԴ լին (Գիրք Ա. Նախ. ԻԷ.)։


Դարձեալ, որովհետեւ ԱԴ եւ ԲԴ իրարու հաւասար են, ԳԴ չառաւիղը ԱԲ լին միջին կէտէն, Դ, քաշուած ուղղահայեաց է. ուստի անոր ամէն մէկ կէտը հաւասարապէս հեռու է Ա եւ Բ ծայրերէն (Գիրք Ա. Նախ. ԻԶ.). ուրեմն ԱԿ հաւասար է ԿԲ լին։ Բայց եթէ ԱԿ լարը հաւասար է ԿԲ լարին, ԱԿ աղեղն ալ հաւասար է ԿԲ աղեղան (Նախ. Դ.). ուրեմն լարի մը ուղղահայեաց քաշուած չառաւիղը լարը եւ անոր աղեղը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ։

Պոր. Գ կեդրոնը, ԱԲ լարին միջին կէտը, Դ, եւ ԱԿԲ աղեղան միջին կէտը, Կ, միեւնոյն ուղիղ գծին վրայ են։ Բայց երկու կէտ բաւական են ուղիղ գծի մը դիրքը որոշելու, ուստի ասոնք երեք կէտերուն որեւէ երկուքէն անցնող ուղիղ գիծը, հարկաւ երրորդէն ալ կ'անցնի եւ ուղղահայեաց կ'ըլլայ լարին։

Նաեւ յայտնի է թէ լարի մը գլխին կէտէն տաշուած ուղղահայեացը երկրագնին եւ աղեղան գլխին կէտէն կ'անցնի։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է· ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէնդան բաներ կայ որ չեղող տրէհ երեւոյթներ կոչուին, եւ որոնք ոչ ունին և չեն կրնար ունենալ ոեւէ իրականութիւն։



Միեւնոյն ուղիղ գծին վրայ չեղող Ա, Բ, Գ, կէտերէն մէկ չրջանակ կրնայ քաշուիլ։

Ա Բ եւ Բ Գ գծերը քաշէ, եւ անոնց միջին կէտերէն, Դ, Ֆ, քաշէ Դե եւ Ֆկ ուղղահայեացները։ Դե եւ Ֆկ իրար պիտի կտրեն կէտի մը վրայ, ինչպէս Ո, եթէ զուգահեռական չեն։ եթէ զուգահեռական ըլլային, Դե գծին ուղղահայեաց եղող Ա Բ գիծը Ֆկ գծին ալ ուղղահայեաց պիտի ըլլար, եւ ք անկիւնը ուղիղ անկիւն պիտի ըլլար (Գիրք Ա· Նախ· Ի· Հետ· 1)։ Բայց Ա Բ գծին չհատնակուելիւնն եղող Բ Գ գիծը նոյն չէ Բ Գ գծին հետ, քանզի Ա, Բ, Գ կէտերը միեւնոյն ուղիղ գծին վրայ չեն· ուստի երկու ուղղահայեաց, Բ Ֆ, Բ Բ, քաշուած պիտի ըլլար միեւնոյն կէտէն, Բ, միեւնոյն ուղիղ գծին, որ անկարելի է (Գիրք Ա· Նախ· ԺԲ·)· ուրեմն Դե եւ Ֆկ իրար պիտի կտրեն կէտի մը վրայ, ինչպէս Ո։

Նաեւ Ո կէտը, որովհետեւ Դե ուղղահայեացին վրայ է, հաւասարապէս հեռու է Ա եւ Բ կէտերէն (Գիրք Ա· Նախ· ԺԶ·)· եւ, որովհետեւ նոյն կէտը, Ո, Ֆկ ուղղահայեացին վրայ է, հաւասարապէս հեռու է Բ եւ Գ կէտերէն· ուստի, ՕԱ, ՕԲ, ՕԳ իրարու հաւասար են, եւ, եթէ Ո կեդրոնէն ՕԲ չառաւիղով չրջանակ մը քաշուի, Ա եւ Գ կէտերուն վրայէն պիտի անցնի· ուրեմն միեւնոյն գծին վրայ չեղող որեւէ երեք կէտերու վրայէն, մէկ չրջանակ կրնայ քաշուիլ։


Յարձեալ, միայն մէկ չրջանակ կրնայ քաշուիլ, քանզի, եթէ ուրիշ մը կրնար քաշուիլ, անոր կեդրոնը Դե գծին վրայ պիտի ըլլար, ապա թէ ոչ հաւասա-

րապէս հեռու պիտի չըլլար Ա եւ Բ կէտերէն (Գիրք Ա· Նախ· ԺԶ·)· նաեւ ան կեդրոնը Ֆկ գծին վրայ ալ պիտի ըլլար նոյն տեսակ պատճառաւ· բայց երկու ուղիղ գիծ միայն մէկ կէտի վրայ կրնան իրար կտրել, ուստի երեք կէտերու վրայէն միայն մէկ չրջանակ կրնայ քաշուիլ։

Պոր· Երկու չրջանակ երկուքէն աւելի կէտերու վրայ իրար չեն կրնար կտրել· քանզի եթէ երեք կէտերու վրայ կարենային կտրել, անտանն միեւնոյն երեք կէտերու վրայէն երկու չրջանակ քաշուած պիտի ըլլար, որ անկարելի է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը· ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէնդան բոլորակէն կամ հաւասար բոլորակաց հաւասար լարերը հաւասարապէս հեռու են կեդրոնէն, և երկու անհաւասար լարերուն փոքրը կեդրոնէն հեռու է։




Նախ· եթէ Ա Բ եւ Դե լարերը իրարու հաւասար են, հաւասարապէս հեռու են Գ կեդրոնէն։ Ա յս լարերուն միջին կէտերուն քաշէ Գկ եւ Գֆ ուղղահայեացները, նաեւ ԳԱ եւ ԳԴ չառաւիղները։ ԳԱֆ եւ ԳԴկ ուղղանկիւն եռանկեանց հակառղիղները, ԳԱ եւ ԳԴ, իրարու հաւասար են, եւ Ա Բ լարին կէսն եղող Ա Ֆ կողմը հաւասար է Դե ին կէսն եղող Դկ կողման· ուստի եռանկիւնիներն իրարու հաւասար են, եւ Գֆ հաւասար է Գկ ին (Գիրք Ա· Նախ· ԺԷ·)· ուրեմն Ա Բ եւ Դե լարերը հաւասարապէս հեռու են կեդրոնէն։

Երկրորդ· եթէ Դե լարը փոքր է Ա Հ լարէն, Դե աւելի հեռու է Գ կեդրոնէն։ Ա Բ Հ աղեղը մեծ է Դ Մե աղեղէն (Նախ· Ե·)· Ա Բ Հ աղեղէն Ա Ն մասը կտրէ Դ Մե աղեղան հաւասար· քաշէ Ա Բ լարը, քաշէ նաեւ

անոր ուղղահայեաց ԳՖ, ու Ա.Է լարին ուղղահայեաց ԳԻ գծերը։ Յայտնի է թէ ԳՖ մեծ է ԳՕ էն, եւ ԳՕ մեծ է ԳԻ էն (Գիրք Ա. Նախ. ժե.)։ ուստի ԳՖ առաւել եւս մեծ է ԳԻ էն։ Բայց ԳՖ հաւասար է ԳԿին, քանզի ԱԲ եւ ԴԵ լարերն իրարու հաւասար են, ուստի ԳԿ>ԳԻ։ ուրեմն երկու անհաւասար լարերուն վրաքրը կեդրոնէն հեռու է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Շառաւիղէ մը ծայրը շառաւիղին ուղղահայեաց տաշտած էյնը, շրջանակին շօշափող է։



Ա.Գ շառաւիղին ծայրը, Ա, շառաւիղին ուղղահայեաց ԲԴ գիծը քաշէ։ շրջանակին ալ շօշափող կ'ըլլայ։

Քանզի, ամէն խոտորնակ գիծ, ԳԵ, մեծ է ուղղահայեացէն, ԳԱ. (Գիրք Ա. Նախ. ժե.)։ ուստի Ե կէտը բոլորակին դուրսն է, եւ ԲԴ գիծն ու շրջանակը միայն մէկ հասարակաց կէտ ունին, Ա. ուրեմն ԲԴ շօշափող է շրջանակին (Սահմ. 9)։


Հետ. 1. Հակադարձաբար, եթէ ԲԴ գիծը շօշափող է շրջանակին, ուղղահայեաց է առ շօշափման կէտը քաշուած շառաւիղին։ Քանզի, որովհետեւ ԲԴ գիծը շօշափող է Ա կէտին վրայ, անոր որեւիցէ ուրիշ կէտը, ինչպէս Ե, շրջանակէն դուրս է, եւ ԳԵ>ԳՕ կամ ԳԱ. ուստի ԳԱ՝ կեդրոնէն առ ԲԴ քաշուած գծերուն ամենամիտքը գիծն է. ուրեմն ԲԴ ուղղահայեաց է ԳԱ շառաւիղին (Գիրք Ա. Նախ. ժե. Հետ. 1)։

Հետ. 2. Շրջանակի մը որեւիցէ կէտէն, Ա, միայն մէկ շօշափող կրնայ քաշուիլ. քանզի, եթէ ուրիշ մը կրնար քաշուիլ, ան ալ ուղղահայեաց պիտի ըլլար ԳԱ շառաւիղին (Հետ. 1). բայց Ա կէտէն ԳԱ շառաւիղին ուղղահայեաց միայն մէկ գիծ կրնայ քաշուիլ (Գիրք


Ա. Նախ. ժԴ. Հետ.)։ ուրեմն Ա կէտէն միայն մէկ շօշափող կրնայ քաշուիլ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Շրջանակի մը երկու քոքահեռականաց ծէլթէղը էղող ալէնիները էրտու հաւասար են։



Նախ. Երբ զուգահեռականք հաւանող են, ԱԲ եւ ԴԵ, մէկուն, ԱԲ, ուղղահայեաց ԳՀ չառաւիղը քաշէ. միւսին ալ ուղղահայեաց կ'ըլլայ (Գիրք Ա. Նախ. Ի. Հետ. 1). ուստի Հ կէտը ՄՀփ եւ ՆՀՊ աղեղներուն միջին կէտն է (Նախ. Զ.). ուստի ՄՀ=Հփ, եւ ՆՀ=ՀՊ. ուրեմն ՄՀ—ՆՀ=Հփ—ՀՊ, կամ ՄՆ աղեղը հաւասար է փՊ աղեղան։




Երկրորդ. Երբ զուգահեռականաց մէկը, ԱԲ, հատանողՙ եւ միւսը, ԴԵ, չօշափող է, քաշէ ԳՀ շառաւիղը չօշափման կէտին, Հ. ԴԵ չօշափողին ուղղահայեաց կ'ըլլայ (Նախ. Բ.), անոր զուգահեռականին ալ, ՄՓ։ Բայց, որովհետեւ ԳՀ ուղղահայեաց է ՄՓ լարին, Հ կէտը ՄՀփ աղեղան միջին կէտն է (Նախ. Զ.). ուրեմն ՄՀ աղեղը հաւասար է Հփ աղեղան։

Երրորդ. Երբ զուգահեռականք, ԴԵ եւ ԻԿ, չօշափող են, մէկը Հ եւ միւսը Ք կէտին վրայ, քաշէ ԱԲ զուգահեռական հատանողը. յայտնի է թէ ՄՀ=Հփ եւ ՄՔ=Քփ. ուստի ՀՄՔ ամբողջ աղեղը հաւասար է ՀփՔ աղեղան։ Նաեւ յայտնի է թէ ասոր աղեղներուն իրարքանչիւրը կիսաշրջանակ է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու շրջանակ երկու կէտերու վրայ իրար կը կտրեն, անոնց կեդրոններուն վրայէն անցնող ընդհանուր ուղիղը ուղղահայեաց է այն երկու կէտերն իրար միացնող լարին, և կրնանք երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ։




Գ և Դ կեդրոններն ունեցող շրջանակները՝ Ա և Բ կէտերուն վրայ իրար կը կտրեն։ Քաշէ ԱԲ դիծը. ասիկա երկու շրջանակներուն հասարակաց լար է։ Եթէ այս լարին միջին կէտէն ուղղահայեաց մը քաշուի, Գ և Դ կեդրոններէն պիտի անցնի (Նախ. Զ. Պար.)։ Բայց որեւիցէ երկու կէտերու վրայէն միայն մէկ ուղիղ գիծ կրնայ քաշուիլ. ուրեմն կեդրոններէն անցնող գիծը լարին ուղղահայեաց է և զանիկա երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու բոլորակաց շրջանակները իրար կը կտրեն, ասոնց կեդրոնաց իրարմէ հեռաւորութիւնը շառաւիղաց գումարէն փոքր՝ և տարբերութենէն մեծ է։

Գ և Դ կեդրոններէն ԳԱ, ԴԱ շառաւիղներով երկու շրջանակ քաշէ. եթէ շրջանակները իրար կը կտրեն, ԳԱԴ եռանկիւնը կրնայ կազմուիլ, և




ԳԴ < ԳԱ + ԴԱ (Գիրք Ա. Նախ. Է.),

նաեւ ԳԴ > ԴԱ — ԳԱ (Գիրք Ա. Նախ. Է. Հետ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու բոլորակաց կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը անոնց շառաւիղներուն գումարէն հաւասար է, շրջանակները դրսէն իրարու կը դպչին։

Եթէ Գ և Դ կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը հաւասար է ԱԴ և ԱԴ չառաւիղաց գումարին, յայտնի է թէ երկու բոլորակները Ա հասարակաց կէտը ունին. և ուրիշ հասարակաց կէտ չեն կրնար ունենալ, քանզի, եթէ երկու ունենային, բոլորակաց կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը չառաւիղներուն գումարէն փոքր պիտի ըլլար։




Հետ. Երբ երկու բոլորակաց կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը անոնց շառաւիղներուն գումարէն մեծ է, մէկ շրջանակը միւսէն բոլորովին դուրս կ'ինայ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու բոլորակաց կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը անոնց շառաւիղներուն տարբերութենէն հաւասար է, շրջանակները ներսէն իրարու կը դպչին։

Եթէ Գ և Դ կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը հաւասար է ԱԴ և ԱԴ չառաւիղաց տարբերութեանը, յայտնի է թէ երկու բոլորակները Ա հասարակաց կէտը ունին. և ուրիշ հասարակաց կէտ չեն կրնար ունենալ, քանզի, եթէ երկու ունենային, բոլորակաց կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորու-



թիւնը չառաւիղներուն տարբերութենէն մեծ պիտի ըլլար (Նախ. ժԲ.). բայց սա հակառակ է ենթադրութեան, ուրեմն բոլորակները նեռսէն իրարու պիտի դպչին։


Հետ. 1. Երբ երկու բոլորակ կամ դուրսէն կամ ներսէն իրարու կը դպչին, անոնց կեդրոններն ու շօշափման կէտը միեւնոյն ուղիղ գծին վրայ կ'իյնան։

Հետ. 2. Երբ երկու բոլորակաց կեդրոններուն իրարմէ հեռաւորութիւնը անոնց չառաւիղներուն տարբերութենէն փոքր է, մէկ չրջանակը միւսին բոլորովին մէջը կ'իյնայ։

Պոր. Այն ամէն բոլորակները որոնց կեդրոնները ԱԴ ուղիղ գծին վրայ կ'իյնան, եւ որք Ա կէտին կ'անցնին, Ա կէտին վրայ իրար կը շօշափեն։ Քանզի միայն Ա հասարակաց կէտն ունին. եւ եթէ Ա կէտէն Ա՛ գիծը քաշուի ԱԴ ին ուղղահայեաց, Ա՛ ամէն բոլորակներուն հասարակաց շօշափող պիտի ըլլայ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէնոյն բոլորակէն կամ հաւասար բոլորակաց մէջ, հաւասար կեդրոնական անկիւններէ շրջանակէն հաւասար աղեղներ կը կորզեն. և, հակադարձաբար, երկէ կորսած աղեղներէ կը կորզեն. և, հակադարձաբար, երկէ կորսած աղեղներէ էրբոր հաւասար են, կեդրոնական անկիւններէ ալ էրբոր հաւասար են։




Նախ. Եթէ Գ եւ Գ կեդրոններն ունեցող հաւասար բոլորակաց մէջ ԱԳ եւ ԲԳ չառաւիղներուն կազմած կեդրոնական անկիւնը, ԱԳԲ, հաւասար է ԴԳԵ կեդրոնական անկեան, Ա՛Բ աղեղն ալ հաւասար է Դ՛Ե աղեղան. քանզի, եթէ մէկ բոլորակը միւսին վրայ այնպէս դրուի որ Ա կէտը Դ կէտին վրայ իյնայ, ու բոլորեւ ԱԳ հաւասար է ԴԳ անկեան, Բ կէտն ալ Ե կէտին վրայ պիտի իյնայ, եւ Ա՛Բ աղեղը զուգընթաց պիտի ըլլայ Դ՛Ե աղեղան. ուրեմն Ա՛Բ հաւասար է Դ՛Ե ին։

Բնէրբէ. Եթէ Ա՛Բ եւ Դ՛Ե աղեղներն իրարու հաւասար են, ԱԳԲ ու ԴԳԵ կեդրոնական անկիւններն ալ իրարու հաւասար են. քանզի, եթէ հաւասար չեն, ենթադրենք թէ ԱԳԲ մեծ է։ Անկէ կորէ ԴԳԵ անկեան հաւասար ԱԳի անկիւնը։ Արդէն ապացուցուածէն կը հետեւի թէ Ա՛Ի = Դ՛Ե աղեղան. բայց, ըստ ենթադրութեան, Ա՛Բ = Դ՛Ե, ուստի Ա՛Ի = Ա՛Բ, այսինքն մասը ամբողջին հաւասար է, որ անկարելի է (Ա. 8). ուրեմն ԱԳԲ անկիւնը հաւասար է ԴԳԵ անկեան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԶ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէնոյն բոլորակէն կամ հաւասար բոլորակաց էրբոր կեդրոնական անկիւններէ էրբոր այնպէս կը հատնին կորսած ինչպէս էրբոր ամբողջ շրջ., անոնց կորած աղեղներէ ալ նոյնպէս էրբոր կը հատնին. կամ մէկ անկիւնը պիտի այնպէս կը հատնի կորսած մէկ աղեղը պիտի։

Եթէ հաւասար բոլորակաց ԱԳԲ կեդրոնական անկիւնը այնպէս կը համեմատի ԴԳԵ կեդրոնական անկեան ինչպէս 7՝ 4 ին, այսինքն, եթէ Մ անկիւնը, չափ ըլլալով, ԱԳԲ անկեան մէջ՝ 7 անգամ, իսկ ԴԳԵ



անկեան մէջ 4 անգամ կը պարունակուի, Ա՛Բ աղեղն ալ Դ՛Ե աղեղան այնպէս կը համեմատի ինչպէս 7՝ 4 ին։ Քանզի, որովհետեւ ԱԳԲ անկեան մէջ պարունակեալ եօթը փոքր անկեանց իւրաքանչիւրը հաւասար է ԴԳԵ


անկեան մէջ եղող չորս փոքր անկեանց որեւէ մէկուն, ԱԲ աղեղան մէջ եղող իւրաքանչիւր փոքր աղեղը՝ ԴԵ աղեղան մէջ եղող որեւէ փոքր աղեղան հաւասար է (Նախ. ԺԵ.)։ ուստի ամբողջ աղեղը, ԱԲ, ամբողջ աղեղան, ԴԵ, այնպէս կը համեմատի ինչպէս 7՝ 4 ին։ Եթէ 7 եւ 4 թիւերուն տեղը ուրիշ որեւիցէ թիւեր դործածուին, նոյն ապացոյցը թիւնը յարմար կ'ըլլայ։ ուրեմն, երբ երկու կեդրոնական անկիւններ իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս երկու ամբողջ թիւ, անոնց աղեղներն ալ նոյնպէս իրարու կը համեմատին։

Հետ. Հակադարձաբար, եթէ ԱԲ եւ ԴԵ աղեղներն իրարու կը համեմատին ինչպէս երկու ամբողջ թիւ, ԱԳԲ եւ ԴԳԵ անկիւններն ալ նոյնպէս իրարու կը համեմատին. կամ ԱԲ : ԴԵ :: ԱԳԲ : ԴԳԵ. քանզի, որովհետեւ Ա՛Ա, Ա՛՚, Դ՛Դ, Դ՛՚՚ եւայլն աղեղներն իրարու հաւասար են, Ա՛Ա՛, Ա՛՚Ա՛՚՚, Դ՛Դ՛, Դ՛՚՚Դ՛՚՚՚ եւայլն անկիւններն ալ իրարու հաւասար են. ուրեմն

ԱԲ : ԴԵ :: ԱԳԲ : ԴԳԵ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԷ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէկնոյն բոլորակին կամ հաւասար բոլորակաց էջերուն անկիւնները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց աղեղները։



Եթէ ԱԳԲ եւ ԱԳԴ երկու հաւասար բոլորակաց կեդրոնական անկիւններն են, ԱԳԲ : ԱԳԴ :: ԱԲ : ԱԴ։

Քանզի, եթէ անկիւնները իրարու հաւասար են, աղեղներն ալ իրարու հաւասար են (Նախ. ԺԵ.)։ Եթէ անհաւասար են, փոքրը մեծին վրայ դիր։ Արդ, եթէ նախադասութիւնը ճշմարիտ չէ, ենթադրենք թէ ԱԳԲ անկիւնը ԱԳԴ անկեան այնպէս կը համեմատի, ինչպէս ԱԲ աղեղը ԱԴ էն մեծ եղող Ա0 աղեղան, այսինքն ԱԳԲ : ԱԳԴ :: ԱԲ : Ա0։

Բաժնէ ԱԲ աղեղը Դ0 էն փոքր քանի մը իրարու հաւասար մասանց. բաժանման կէտերուն դնէ մէկը Դ եւ 0 կէտերուն մէջտեղ պիտի իյնայ, ինչպէս Ի. քաշէ ԳԻ. ԱԲ եւ ԱԻ աղեղներն իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս երկու ամբողջ թիւ (Նախ. ԺԶ.)։ ուստի ԱԳԻ : ԱԳԻ :: ԱԲ : ԱԻ։

Այս երկու կարգ համեմատութեանց նախադասները նոյն են. ուստի յետադասներն իրարու համեմատ են (Գիրք Բ. Նախ. Դ.)։ կամ ԱԳԴ : ԱԳԻ :: Ա0 : ԱԻ։ Ա0՝ ԱԻ էն մեծ է. ուստի, եթէ այս համեմատութիւնը ճշմարիտ է, ԱԳԴ ալ ԱԳԻ էն մեծ է, բայց ընդհակառակն փոքր է. ուրեմն ԱԳԲ այնպէս չի համեմատիր ԱԳԴին ինչպէս ԱԲ՝ ԱԴ էն մեծ եղող որեւէ աղեղան։

Կրնայ նոյն կերպով ապացուցուիլ թէ համեմատութեան չորրորդ եղրը, Ա0, ԱԴ էն փոքր չի կրնար ըլլալ. ուրեմն ԱԳԲ : ԱԳԴ :: ԱԲ : ԱԴ։

Պոր. 1. Որովհետեւ բոլորակի մը կեդրոնական անկիւնը եւ անոր կոզմանց կտրած աղեղը անանկ կապակցութիւն մը ունին որ, երբ մէկը կը պակսի կամ կ'աւելնայ, միւսն ալ նոյն համեմատութեամբ կը պակսի կամ կ'աւելնայ, վասնորոյ այս քանակութեանց մէկը միւսին չափը կրնայ համարուիլ. եւ այսուհետեւ ԱԲ աղեղը ԱԳԲ անկեան չափը պիտի համարուի։ Երբ կեդրոնական անկիւններ իրարու հետ կը բաղդատուին, յայտնի է թէ զանոնք չափելու ծառայող աղեղները հաւասար շառաւիղներով գծուած ըլլալու են։


Պոր. 2. Ուղիղ անկեան չափը՝ շրջանակին քառորդ մասը, այսինքն 90°ի աղեղն է. սրանկեան չափը՝ շրջանակին քառորդ մասէն, այսինքն 90° էն փոքր աղեղն է, եւ բթանկեան չափը՝ շրջանակին քառորդ մասէն, այսինքն 90° էն մեծ աղեղն է։

Պոր. 3. Նախընթաց երեք նախադասութեանց մէջ ինչ որ ապացուցուեցաւ անկեանց՝ աղեղներու հետ բաղդատուելուն նկատմամբ, հաւասարապէս ճշմարիտ է հատիչները աղեղներու հետ բաղդատելու նկատմամբ ալ։ Քանզի հատիչները ոչ միայն հաւասար են երբ իրենց անկիւնները հաւասար են, այլեւ ըստ

ամենայնի իրենց անկեանցը համեմատական են. ուրեմն Ա.ԳԲ Ը Ա.ԳԴ նոյն քոլըրակին կամ հաւասար քոլըրակաց հատուածները իրարու= այնպէս կը համեմատին ինչպէս այս հատուածներուն ԱԲ Ը ԱԴ խորդնեները։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԸ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Շրջապատէ անկեան մը ըսփը իր երկու= կողմերուն միջեն պղնձէ աղեղան կեան է։




ԲԱԴ շրջապատի անկեան չափը ԲԴ աղեղան կէսն է։

Նե. երբ բոլորակին կեդրոնը անկեան ներսը կ'իյնայ, Ա.Ե տրամագիծն ու ԳԲ, ԳԴ շառաւիղները քաշէ։


ԲԳԱ եռանկեան արտաքին անկիւնը, ԲԳԵ, հաւասար է ԳԱԲ եւ ԳԲԱ ներքին անկեանց գումարին (Գիրք Ա. Նախ. իե. Հետ. 6). բայց, ուրեմն եռանկիւնը երկկողմնաղոդ է, ԳԱԲ =ԳԲԱ անկեան. ուստի ԲԳԵ անկիւնը ԲԱԴ անկեան կրկնապատիկն է։ Ուրեմն եռ ԲԳԵ կեդրոնական անկիւն է, անոր չափը՝ ԲԵ աղեղն է (Նախ. ժէ. Պար. 1). ուստի ԲԱԴ անկեան չափը՝ ԲԵ աղեղան կէսն է։ Նմանապէս կրնայ ապացուցուիլ թէ ԳԱԴ անկեան չափը՝ ԳԵ աղեղան կէսն է. ուրեմն ԲԱԳ+ԳԱԴ, կամ ԲԱԴ անկեան չափը՝ ԲԵ+ԵԴ, կամ ԲԴ աղեղան կէսն է։




Եզրակ. Երբ բոլորակին կեդրոնը անկեան դուրսը կ'իյնայ, Ա.Ե տրամագիծը քաշէ։ ԲԱԵ անկեան չափը՝ ԲԵ աղեղան կէսն է. ԴԱԵ անկեան չափը՝ ԴԵ աղեղան կէսն է. ուստի ԲԱԵ—ԴԱԵ, կամ ԲԱԴ անկեան չափը՝ ԲԵ—ԴԵ, կամ ԲԴ աղեղան կէսն է. ուրեմն ամէն շրջապատի անկեան չափը իր երկու կողմերուն միջեւէն աղեղան կէսն է։




Հէպ. 1. ԲԱԳ, ԲԴԳ եւ ԲԵԳ անկիւնները, միեւնոյն հատուածին մէջ գծուած ըլլալով, իրարու հաւասար են. քանզի անոնց ամէն մէկուն չափը՝ ԲՕԳ աղեղան կէսն է։



Հէպ. 2. Կիսաբոլորակի մը մէջ գծուած ամէն անկիւն, ԲԱԴ, ուղիղ անկիւն է. քանզի անոր չափը կիսաշրջանակին կէսը կամ բոլոր շրջանակին մէկ չորրորդն է։



Հէպ. 3. ԲԱԳ անկիւնը, կիսաբոլորակէն մեծ հատուածի մը մէջ գծուած ըլլալով, սրանկիւն է. քանզի անոր չափը կիսաշրջանակէն փոքր եղող ԲՕԳ աղեղան կէսն է (Նախ. ժէ. Պար. 2)։




ԲՕԳ անկիւնը, կիսաբոլորակէն փոքր հատուածի մը մէջ գծուած ըլլալով, բթանկիւն է. քանզի անոր չափը կիսաշրջանակէն մեծ եղող ԲԱԳ աղեղան կէսն է։

Հէպ. 4. ԱԲԴԳ ներսը գծուած քառանկեան Ա ու Գ ընդդիմակաց անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է. քանզի ԲԱԴ անկեան չափը՝ ԲԴԳ աղեղան կէսն է, եւ ԲԴԳ անկեան չափը՝ ԲԱԴ աղեղան կէսն է. այսինքն ԲԱԴ եւ ԲԴԳ անկեանց երկուքին չափը շրջանակին կէսն է. ուրեմն անոնց գումարը երկու ուղիղ անկեանց հաւասար է (Նախ. ժէ. Պար. 2)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու էջով կրկնակ լուծոց անկեան չափը՝ անոնց մէջ տեղ եղած աղեղներուն գումարին կէսն է։




ԱԲ եւ ԳԴ իրար կտրող լարաց ԱԵԴ կամ ԴԵԲ անկեան չափը՝ ԱԴ եւ ԴԲ աղեղներուն գումարին կէսն է։

ԳԴ լարին զուգահեռական ԱՖ լարը քաշէ։ ԴՖ աղեղը հաւասար է ԱԴ աղեղան (Նախ. ԺԸ.)։ եւ ՖԱԲ անկիւնը հաւասար է ԴԵԲ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Ի. Հետ. 3)։ Բայց ՖԱԲ անկեան չափը՝ ՖԴԲ աղեղան կէսն է (Նախ. ԺԸ.)։ ուրեմն ԴԵԲ կամ ԱԵԴ անկեան չափը՝ ԲԴ ու ԴՖ, կամ ԲԴ ու ԱԳ աղեղներուն գումարին կէսն է։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ԱԵԳ անկեան չափը՝ ԱԳ ու ԲԴ աղեղներուն գումարին կէսն է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ի. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու հատանողաց կազմած անկեան չափը՝ անոնց մէջտեղ եղած աղեղներուն տարբերութեան կէսն է։




ԲԱ եւ ԱԳ հատանողաց կազմած ԲԱԳ անկեան չափը՝ ԲԳ ու ԴՖ աղեղներուն տարբերութեան կէսն է։

ԱԳ լին զուգահեռական ԴԵ գիծը քաշէ. ԵԳ աղեղը հաւասար է ԴՖ աղեղան, ԲԵ անկիւնն ալ՝ ԲԱԳ անկեան։ Բայց ԲԵ անկեան չափը՝ ԲԵ աղեղան կէսն է. ուստի ԲԱԳ անկեան չափն ալ՝ ԲԵ աղեղան կէսն է, այսինքն ԲԵԳ եւ ԵԳ կամ ԴՖ աղեղներուն տարբերութեան կէսը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Շօշափողէ և լարէ մը կազմած անկեան չափը՝ անոր կողմերէն մէջտեղէ աղեղան կէսն է։



ԲԵ շօշափողին եւ ԱԴ լարին կազմած ԲԱԴ անկեան չափը՝ ԱՄԴ աղեղան կէսն է։


Շօշափման կէտէն, Ա, քաշէ ԱԴ տրամագիծը. ԲԱԴ ուղիղ անկիւն է (Նախ. Թ.) եւ անոր չափը՝ ԱՄԴ կիսաշրջանակին կէսն է. ԴԱԴ անկեան չափը՝ ԴԴ աղեղան կէսն է. ուստի ԲԱԴ+ԴԱԴ կամ ԲԱԴ անկեան չափը՝ ԱՄԴ+ԴԴ կամ ԱՄԴԴ աղեղան կէսն է։

Նաեւ, եթէ ԴԱԵ եւ ԴԱԴ անկեանց տարբերութիւնը գործածուի, կրնայ ապացուցուիլ թէ ԳԱԵ անկեան չափը՝ ԱԴ աղեղան կէսն է։

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԽՆԴԻՐ Ա.

Ո՞ղիղ գիծ մը երկու հաւասար մասանց բաժնել։



ԱԲ գիծը երկու հաւասար մասանց բաժնելու համար, Ա եւ Բ կեդրոններէն, ԱԲ գծին կէսէն մեծ եղող ԱԴ չառաւիղով, Դ կէտին վրայ իրար կտրող երկու աղեղ քաշէ. Դ կէտը հաւասարապէս հեռու է Ա եւ Բ կէտերէն։ Նոյն կերպով ԱԲ գծին մէկ կամ միւս կողմը Ա եւ Բ կէտերէն հաւասարապէս հեռու ուրիշ կէտ մը, ե, գտիր. Դ եւ ե կէտերուն վրայէն Դե գիծը քաշէ. Դե կը բաժնէ ԱԲ գիծը երկու հաւասար մասանց (Գիրք Ա. Նախ. ԺԶ. Հետ.)։

ԽՆԴԻՐ Բ.

Ո՞ր է՛ր գծի մը մէկ ծանօթ կէտին վրայ ուղղահայեաց մը տանիլ նոյն գծին։




ԲԳ գծին Ա կէտին վրայ ուղղահայեաց մը քաշելու համար, Ա կէտէն հաւասարապէս հեռու Բ եւ Գ կէտերը գտիր. Բ եւ Գ կէտերը կեդրոն ընդունելով ԲԱ էն մեծ չառաւիղով մը Դ կէտին վրայ իրար կրող երկու աղեղ քաշէ. ԱԴ գիծը պահանջուած ուղղահայեացն է. քանզի, որովհետեւ Դ կէտը հաւասարապէս հեռու է Բ եւ Գ կէտերէն, հարկաւ ԲԳ գծին Ա միջին կէտէն քաշուած ուղղահայեացին մէջն է (Գիրք Ա. Նախ. ԺԶ.). ուրեմն ԱԴ պահանջուած ուղղահայեացն է։

Պոր. Նոյն կերպով ԲԳ գծին Ա կէտին վրայ ԲԱԴ ուղիղ անկիւնը կրնայ քաշուիլ։

ԽՆԴԻՐ Գ

Ո՞ր է՛ր գծէ մը դուրս եղող կէտ մը նոյն գծին ուղղահայեաց մը տանիլ։



Ա կէտէն ԲԴ գծին ուղղահայեաց մը քաշելու համար, Ա կեդրոնէն աղեղ մը քաշէ յիշեալ գիծը Բ եւ Դ կէտերուն վրայ կտրելով. նաեւ Բ եւ Դ կէտէրէն հաւասարապէս հեռու եղող կէտ մը գտիր, ինչպէս Է. ԱԷ գիծը պահանջուած ուղղահայեացն է. քանզի, որովհետեւ Ա եւ Է կէտերը հաւասարապէս հեռու են Բ եւ Դ կէտերէն, ԱԷ գիծը ԲԴ գծին միջին կէտէն քաշուած ուղղահայեացն է (Գիրք Ա. Նախ. ԺԶ. Հետ.)։

ԽՆԴԻՐ Դ.

Գծէ մը մէկ կէտին վրայ ծանօթ անկեան մը հաւասար անկիւն մը շինել։



ԱԲ գծին Ա կէտին վրայ ԻԲԼ անկեան հաւասար անկիւն մը շինելու համար, Բ գաղափար կեդրոն ընդունելով որեւէ չառաւիղով, ՔԻ, անկեան մէկ կողմէն մինչեւ միւսը ԻԼ աղեղը քաշէ. նոյն չառաւիղով Ա կեդրոնէն ԲՕ աղեղը քաշէ. Բ կեդրոնէն ԼԻ լարին հաւասար չառաւիղով աղեղ մը քաշէ, ԲՕ աղեղը Դ կէտին վրայ կտրելով. նաեւ ԱԴ գիծը քաշէ. ԴԱԲ անկիւնը պահանջուած անկիւնն է. քանզի, որովհետեւ ԲԴ եւ ԻԼ աղեղները հաւասար չառաւիղ եւ լարեր ունին, իրարու հաւասար են (Նախ. Դ.). ուրեմն ԲԱԴ եւ ԻԲԼ անկիւններն ալ իրարու հաւասար են։

ԽՆԴԻՐ Ե.

Աղեղ մը կամ անկեան մը երկու հաւասար մասանց բաժնել։




Նախ. ԱԵՔ աղեղը երկու հաւասար մասանց բաժնելու համար, Ա եւ Բ կէտերը կեդրոն ընդունելով, հաւասար չառաւիղներով, Դ կէտին վրայ իրար կտրող երկու աղեղ քաշէ. ԴԳ գիծը ԱԲ աղեղը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ. քանզի Գ եւ Դ կէտերը հաւասարապէս հեռու են ԱԲ լարին ծայրերէն, Ա եւ Բ. ուստի ԴԳ ուղղահայեաց է ԱԲ լարին, եւ կը բաժնէ զանիկա երկու հաւասար մասանց (Գիրք Ա. Նախ. ԺԶ. Հետ.). ուրեմն ԱԲ աղեղն ալ երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ (Նախ. Զ.)։

Եբէբ՝բբ · ԱԳԲ անկիւնը երկու հաւասար մասանց բաժնելու համար, Գ գագաթը կեդրոն ընելով ԱԵԲ աղեղը գծէ · այս աղեղը երկու հաւասար մասանց բաժնէ վերոյիշեալ կերպով · յայտնի է թէ ԱԳԵ անկիւնը հաւասար է ԲԳԵ անկեան ։

Պ՝բ · Ան եւ Բե աղեղները նոյն կերպով կրնան բաժնուիլ, եւ այսպէս ծանօթ անկիւն մը երկու, չորս, ութ եւայլն հաւասար մասանց կրնայ բաժնուիլ ։

ԽՆԴԻՐ Զ·


Ծանօթ կէտ մը վրայէն ծանօթ գծի մը ը՝ֆհեռ՝ական մը տ՝աշել ։



Ա կէտին վրայէն ԲԳ գծին զուգահեռական մը քաշելու համար, Ա կէտը կեդրոն ընելով ԵՕ աղեղը քաշէ · նաեւ Ե կէտը կեդրոն ընելով նոյն չաւաւիղով ԱՖ աղեղը քաշէ · ԵՕ-էն ԱՖ աղեղին հաւասար ԵԻ աղեղը կտրէ · ԱԻ գիծը պահանջուած զուգահեռականն է ։ Քանզի, Ան քաշելով, կը տեսնենք թէ ՖԵԱ եւ ԴԱԵ փոխադարձ անկիւնները իրարու հաւասար են · ուրեմն ԱԻ եւ ԲԳ զուգահեռական են (Գիրք Ա· Նախ · ժԹ · Հետ · 1) ։

ԽՆԴԻՐ Է·

Ե՝ռանկեան մը երկու անկիւններուը գիտնալով երրորդը գտնել ։




ԴԵՖ անորոշ գիծը քաշէ · ան գծին որեւէ կէտին վրայ, ե, ԴԵԳ անկիւնը չինէ ծանօթ անկեանց մէկուն հաւասար · նաեւ ԳԵՀ անկիւնը՝ ծանօթ անկեանց միւսին հաւասար ·

Հ՝ԵՖ պահանջուած անկիւնն է · քանզի ան երեք անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց (Գիրք Ա· Նախ · Ա· եւ Իե ·) ։

ԽՆԴԻՐ Ը·


Ե՝ռանկեան մը երկու կողքերը և անոնց կազմած անկիւնը գիտնալով ե՝ռանկեանը գտնել ։



Դֆ անորոշ գիծը քաշէ · ֆդե անկիւնը չինէ Ա ծանօթ անկեան հաւասար · կտրէ ԴԿ կողմը Բ ծանօթ կողման հաւասար, եւ ԴՀ կողմը՝ Գ ծանօթ կողման հաւասար, եւ ԿՀ քաշէ · ԴԿՀ պահանջուած եռանկիւնն է (Գիրք Ա· Նախ· Ե·) ։

ԽՆԴԻՐ Թ·


Ե՝ռանկեան մը մէկ կողմը և երկու անկիւններուը գիտնալով ե՝ռանկեանը գտնել ։



Այս անկեանց կամ երկուքն ալ ծանօթ կողման կից պիտի ըլլան, կամ մէկը անոր կից՝ եւ միւսը ընդդիմակաց · եթէ ծանօթ անկեանց միայն մէկը կից է, երրորդ անկիւնը գտիր (Խնդիր Է ·) · անատեն երկու կից անկիւնները ծանօթ կ՝ըլլան ։ Դե գիծը քաշէ ծանօթ կողման հաւասար · չինէ ԵԴՖ անկիւնը կից անկեանց մէկուն՝ եւ ԴԵԿ անկիւնը միւսին հաւասար · Դֆ եւ ԵԿ իրար պիտի կտրեն Հ կէտին վրայ · ԴԵՀ պահանջուած եռանկիւնն է (Գիրք Ա· Նախ · Զ·) ։

ԽՆԴԻՐ Ժ.

Եռանկեան մը երեք կողերը գիտնալով եռանկեանը գծել։




Դե գիծը քաշէ Ա ծանօթ կողման հաւասար. Է կէտը կեդրոն ընելով Բ ծանօթ կողման հաւասար չառաւիղով աղեղ մը քաշէ. Դ կէտն ալ կեդրոն ընելով Գ ծանօթ կողման հաւասար չառաւիղով ուրիշ աղեղ մը քաշէ, այնպէս որ Ֆ կէտին վրայ միւս աղեղը կարէ. ՖԷ եւ ՖԴ գիծերը քաշէ. ՖԷԴ պահանջուած եռանկիւնն է (Գիրք. Ա. Նախ. ժ.)։

Պոբ. Ցայտնի է որ, եթէ կողմանց որեւէ մէկը միւս երկուքին գումարէն մեծ ըլլար, աղեղներն իրար պիտի չկտրէին. բայց երբ որեւէ երկու կողմանց գումարը երրորդէն մեծ է, լուծելն հնարաւոր է։

ԽՆԴԻՐ ԺԱ.


Եռանկեան մը երկու կողերը և անոնցմէ մէկուն ընդդէմ անկիւնը գիտնալով եռանկեանը գծել։

Նախ. Երբ ծանօթ անկիւնը, Գ, ուղղանկիւն կամ բթանկիւն է, եԹՖ անկիւնը չինէ Գ անկեան հաւասար. Դե մասը կարէ Ա ծանօթ կողման հաւասար. Է կէտը կեդրոն ընելով Բ ծանօթ կողման հաւասար չառաւիղով աղեղ մը քաշէ՝ ԴՖ գիծը Ֆ կէտին վրայ կտրելով. Նաեւ ԵՖ գիծը քաշէ. ԴԵՖ պահանջուած եռանկիւնն է։




Ցայտնի է թէ Գ ծանօթ անկիւնը ուղղանկիւն կամ բթանկիւն ըլլալուն պատճառաւ, անոր ընդդիմակաց Բ կողմը Ա կողմէն մեծ ըլլալու է (Գիրք Ա. Նախ. ժԳ.)։

Երէորդ. Երբ Գ անկիւնը սրանկիւն է, եւ Բ կողմը Ա կողմէն մեծ է, խնդիրը վերոյիշեալ կերպով կրնայ լուծուիլ։



Բայց, եթէ Բ կողմը Ա կողմէն փոքր է, անատեն Է կեդրոնէն Բ կողման հաւասար ԵՖ չառաւիղով քաշուած աղեղը՝ ԴՖ գիծը պիտի կտրէ երկու կէտի վրայ, Ֆ եւ Կ. ուստի երկու եռանկիւններ պիտի գծուին, ԴԵՖ եւ ԴԵԿ, որոնց երկուքն ալ խնդրոյն պայմանները կը լեցընեն։


Պոբ. Երբ Է կեդրոնէն քաշուած աղեղը չօշափող է ԴԿ գծին, եռանկիւնը ուղղանկիւն եռանկիւն կ'ըլլայ, եւ անատեն միայն մէկ լուծում հնարաւոր է։ Երբ Բ կողմը Է կէտէն ԴՖ գծին քաշուած ուղղահայեացէն փոքր է, խնդրոյն լուծումը անկարելի կ'ըլլայ։



ԽՆԴԻՐ ԺԲ.

Զուգահեռագիծ մը գծել՝ անոր երկու կողերը և անոնց կազմած անկիւնը գիտնալով։

Դե գիծը քաշէ Ա ծանօթ կողման հաւասար. ԵԴՖ անկիւնն ալ՝ Գ ծանօթ անկեան հաւասար. ԴՖ գիծը Բ ծանօթ կողման հաւասար ընէ. Ֆ կեդրոնէն Դե կողման հաւասար չառաւիղով՝ եւ Է կեդրո-




նէն ԴՖ կողման հաւասար չառաւիղով երկու աղեղ քաշէ կ՝էնին վրայ իրար կտրելով. նաեւ ՖԿ եւ ԵԿ քաշէ. ԴեկՖ պահանջուած զուգահեռագիծն է: Քանզի ընդդիմակաց կողմերն իրարու հաւասար գծուած են, ուստի ձեւը զուգահեռագիծ է (Գիրք Ա. Նախ. ԻԹ.). նաեւ այս ձեւը ծռանօթ կողմերովն ու անկիւնովը գծուած է:

Հետ. Եթէ ծռանօթ անկիւնը ուղիղ անկիւն է, ձեւը ուղղանկիւն կ՝ըլլայ. եթէ ասոր հետ մէկտեղ կողմերն ալ հաւասար են, ձեւը քառակուսի կ՝ըլլայ:

ԽՆԴԻՐ ԺԴ.


Ծռանօթ բոլորակի կամ աղեղան մը կէտերուն գտնել:

Շրջանակին կամ աղեղան վրայ որեւիցէ երեք կէտ առ, Ա, Բ, Գ, եւ քաշէ ԱԲ եւ ԲԳ գծերը. նաեւ ասոնց գծերուն միջին կէտերէն քաշէ կՖ եւ ԵԴ ուղղահայեացները. ասոնք երկու ուղղահայեացներուն իրար կտրած կէտը, Օ, պահանջուած կեդրոնն է (Նախ. Զ. Պար.):



ԽՆԴԻՐ ԺԴ.

Ծռանօթ կէտէ մը ծռանօթ շրջանակի մը շօշափող մը տանիլ:



Եթէ ծռանօթ կէտը, Ա, շրջանակին վրայ է, քաշէ ԳԱ չառաւիղը եւ անոր ուղղահայեաց ԱԴ գիծը. ԱԴ պահանջուած շօշափողն է (Նախ. Թ.):


Եթէ Ա կէտը շրջանակէն դուրս է, բոլորակին կեդրոնէն, Գ, քաշէ ԳԱ գիծը, եւ այս գծին միջին կէտէն, Օ, շրջանակ մը քաշէ ՕԳ չառաւիղով որ ծռանօթ շրջանակը Բ եւ Դ կէտերուն վրայ կտրէ. նաեւ ԱԲ գիծը քաշէ. ասիկա պահանջուած շօշափողն է: Քանզի, եթէ ԲԳ քաշուի, ԱԲԳ անկիւնը, կիսաբոլորակի մը մէջ գծուած ըլլալով, ուղիղ անկիւն է (Նախ. ԺԲ. Հետ. 2). ուստի ԱԲ գիծը, ԳԲ չառաւիղին ծայրէն քաշուած ուղղահայեաց մ՝ըլլալով, շրջանակին շօշափող է:

Պոր. 1. Երբ Ա կէտը բոլորակէն դուրս է, այս կէտէն երկու շօշափող կրնայ քաշուիլ, ԱԲ եւ ԱԴ. եւ ասոնք շօշափողներն իրարու հաւասար են, քանզի ԳԲԱ եւ ԳԴԱ ուղղանկիւն եռանկիւնները միեւնոյն հակուղիղն ունին, ԳԱ, եւ ԳԲ=ԳԴ, ուստի եռանկիւններն իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. ԺԷ.). ուրեմն ԱԴ հաւասար է ԱԲ ին, նաեւ ԳԱԴ հաւասար է ԳԱԲ անկեան:

Պոր. 2. Որովհետեւ միայն մէկ գիծ կայ որ ԲԱԴ անկիւնը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ, յայտնի է թէ այն գիծը՝որ երկու շօշափողաց կազմած անկիւնը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ, բոլորակին կեդրոնէն կ՝անցնի:

ԽՆԴԻՐ ԺԵ.

Ծանօթ եռանկեան մը ներսը բոլորակ մը գծել։




ԱԲԳ ծանօթ եռանկեան Ա եւ Բ անկիւնները երկերկու հաւասար մասանց բաժնէ Ո կէտին վրայ իրար կըտրող ԱՈ եւ ԲՈ գծերով. Ո կէտէն եռանկեան երեք կողմերուն ուղղահայեաց ՈՖ, ՈԴ, ՈԵ գծերը քաշէ. ասոնք ուղղահայեացները իրարու հաւասար են։ Քանզի, ԴԱՈ անկիւնը ՈԱՖ անկեան հաւասար չ'ընուած է. ԱԴՈ ուղիղ անկիւնը հաւասար է ԱՖՈ անկեան. ուրեմն երրորդ անկիւնը, ԱՈԴ, հաւասար է ԱՈՖ անկեան. նաեւ ԱՈ կողմը երկու եռանկեանց հասարակաց է. ուրեմն եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. Զ.), եւ ԴՈ հաւասար է ՈՖ ին։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ՈԵ հաւասար է ՈԴ ին. ուրեմն ասոնք երեք ուղղահայեացները իրարու հաւասար են։


Արդ, եթէ Ո կեդրոնէն ՈԴ չառաւիղով շրջանակ մը քաշուի, յայտնի է թէ այս շրջանակը ԱԲԳ եռանկեան ներսը գծուած պիտի ըլլայ. քանզի ՈԲ կողմը, ՈԴ չառաւիղին ծայրէն քաշուած ուղղահայեաց ըլլալով, չօչափող է. նոյնպէս են նաեւ ԱԳ եւ ԲԳ կողմերը։

Պոր. Եռանկեան մը երեք անկիւններն երկերկու հաւասար մասանց բաժնող գծերը միեւնոյն կէտին վրայ իրար կը կտրեն։

ԽՆԴԻՐ ԺԶ.

Ծանօթ փձէ մը վրայ բոլորակի հատուած մը գծել որ ծանօթ անկիւն մը պարունակէ. այսինքն, այնպէս հատուած մը որուն ներսը գծուած ամէն անկիւն՝ ծանօթ անկիւն հաւասար ըլլայ։






ԱԲ ծանօթ գիծը երկնցուր դէպ ի Դ, եւ Բ կէտին վրայ ԵԲԴ անկիւնը շինէ՝ Գ ծանօթ անկեան հաւասար. Բե գծին ուղղահայեաց ԲՈ գիծը քաշէ. նաեւ ԱԲ ին միջին կէտէն՝ ԱԲ ին ուղղահայեաց ԿՈ գիծը քաշէ. ԲՈ եւ ԿՈ գծերուն իրար կտրած տեղը, Ո, կեդրոն ընդունելով ՈԲ չառաւիղով շրջանակ մը գծէ. ԱՄԲ պահանջուած հատուածն է։ Քանզի ԲՖ գիծը, որովհետեւ ՈԲ չառաւիղին ծայրէն քաշուած ուղղահայեաց է, չօչափող է, եւ ԱԲՖ անկեան չափը՝ ԱԲԲ աղեղան կէսն է (Նախ. ԻԱ.)։ Նաեւ ԱՄԲ անկեան չափը՝ ԱԲԲ աղեղան կէսն է. ուստի ԱՄԲ=ԱԲՖ=ԵԲԴ=Գ. ուրեմն ԱՄԲ հատուածին ներսը գծուած բոլոր անկիւնները Գ ծանօթ անկեան հաւասար են։

Պոր. Եթէ ծանօթ անկիւնը ուղիղ անկիւն ըլլար, պահանջուած հատուածը կիսաբոլորակ՝ եւ ԱԲ տրամագիծ պիտի ըլլար։

ԽՆԴԻՐ ԺԷ։

Երկու ծանօթ գծերուն ընդհանուր համեմատականը գտնելու համար։

Ա Բ եւ Գ Դ ծանօթ գծերուն ընդհանուր համեմատականը գտնելու համար, Ա Բ մեծագոյն գծէն՝ Գ Դ փոքրագոյն գծին հաւասար մասեր կարէ քանի անգամ որ հնար է. մնացորդ մը թող մնայ Ա Ե։ Գ Դ գծէն՝ Ա Ե մնացորդին հաւասար մասեր կարէ քանի անգամ որ հնար է. մնացորդ մը թող մնայ Գ Զ։ Ա Ե մնացորդէն՝ Գ Զ երկրորդ մնացորդին հաւասար մասեր կարէ քանի անգամ որ հնար է. մնացորդ մը թող մնայ Ե Կ։ Գ Զ մնացորդէն՝ Ե Կ երրորդ մնացորդին հաւասար մասեր կարէ քանի անգամ որ հնար է։



Ա Ե մնացորդը Գ Զ մնացորդին հաւասար է. ուրեմն Գ Զ կը բաժնէ Ա Ե։ Ե Կ մնացորդը Գ Զ մնացորդին հաւասար է. ուրեմն Ե Կ կը բաժնէ Գ Զ։ Ե Կ կը բաժնէ Ա Ե, Գ Զ, եւ

հասարակաց չափն է, ԿԱՕ՝ անկեանց հասարակաց չափը կ'ըլլայ։

Պոր. Անկեան մը բացարձակ արժէքը կը գտնուի, եթէ անոր չափն եղող աղեղը բոլոր շրջանակին հետ քաղդատուի. զորօրինակ, եթէ ԳԴ աղեղը կը համեմատի բոլոր շրջանակին ինչպէս 3 առ 25, Ա անկիւնը չորս ուղիղ անկեանց $\frac{3}{25}$ը կամ մէկ ուղիղ անկեան $\frac{12}{25}$ը կ'ըլլայ։

Կրնայ ըլլալ որ բաղդատուած աղեղները հասարակաց չափ չունենան. անատեն անկեանց մերձաւոր ընդհանուր համեմատական մը պիտի գտնուի, առաւել կամ նուազ ճշդութեամբ, գործողութեան չատ կամ քիչ անգամ յառաջ տարուած ըլլալուն համեմատ։

ԳԻՐՔ Դ.


ՁԵՒՈՑ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԱԿԵՐԵՍԱՑ ՁԱՓՈՒԻԼԸ

Սահմանք։

1. Երկու բազմանկիւններ որ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են (Գիրք Ա. Սահմ. 20), եւ որոնց հաւասար անկեանց կողմերը իրարու համեմատական են, նման բազմանկիւն կը կոչուին։

2. Երկու նման բազմանկեանց որեւէ երկու կողմերը կամ անկիւնները՝ որ նման դիրք ունին, համապատասխան կը կոչուին։

3. Երկու տարբեր բոլորակաց նման աղեղք, հատիչք եւ հատուածք անոնք են որ հաւասար կեդրոնական անկիւններ ունին։ Զորօրինակ եթէ Ա եւ Օ անկիւնները իրարու հաւասար են, անատեն իրարու նման են ԲԳ եւ ԴԵ աղեղները, ԲԱԳ եւ ԴՕԵ հատիչները, նաեւ ԲԳ եւ ԴԵ հատուածները։




4. Բազմանկեան մը խարխլան այն կողմն է, որուն վրայ բազմանկիւնը կեցած է։

5. Եռանկեան մը բաց ը-նէ՝ խարսխին ընդդիմակաց գագաթէն խարսխին կամ անոր չարունակութիւնն եղող գծին ուղղահայեաց քաշուած գիծն է։ Զորօրինակ, ԱԴ ուղղահայեացը՝ ԲԱԳ եռանկեան բարձրութիւնն է։



6. Զուգահեռագծի մը բաց ը-նէ՝ խարսխին ընդդիմակաց կողմին խարսխին ուղղահայեաց քաշուած գիծն է։ Զորօրինակ, ԵՖ գիծը ԱԲԴԳ զուգահեռագծին բարձրութիւնն է։



7. Տրապիզաձեւի մը բաց ը-նէ՝ իրարու զուգահեռական եղող երկու կողմանց մէկէն միւսին ուղղահայեաց քաշուած գիծն է։ Զորօրինակ, ԵՖ գիծը ԲԳ տրապիզաձեւին բարձրութիւնն է։




8. Մակերես եւ մակերեսոյթ՝ իրարու չատ մօտ նշանակութիւն ունեցող բառեր են։ Մակերես կը նշանակէ մանաւանդ ձեւի մը երեսին պարունակութիւնը։ Մակերեսի մը արժէքը թուանշանով ցուցընելու համար, մակերեսը ուրիշ մակերեսի մը հետ կը բաղդատուի, եւ այս երկրորդ մակերեսին առջինին մէջ քանի անգամ պարունակուած ըլլալուն թիւը կը ցուցընէ առաջինի մակերեսին արժէքը։

9· Երկու ձեւեր հաւասար մակերես ունին, երբ միեւնոյն չափը երկուքն ալ նոյնքան անգամ կը պարունակեն։

10· Հաւասար մակերես ունեցող ձեւերը համազօր կը կոչուին։ Հաւասար բառը, ձեւերու համար գործածուած առեն, կը նշանակէ թէ ձեւերն ամէն քանի նկատմամբ իրարու հաւասար են (Առած 13)· Համազօր բառը միայն մէկ քանի, այսինքն ձեւերուն պարունակութեանը նկատմամբ հաւասարութիւն կը ցուցընէ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա· ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Հաւասար խոլեակ և հաւասար քոչյուրիէն ունեցող ը֊փահեւոաքձերը համազօր են։



ԱԲԴ եւ ԱԲԵՖ զուգահեռագծերը, ԱԲ հաւասարակաց խարիսխն ու միեւնոյն բարձրութիւնը ունենալով, համազօր են։


Որովհետեւ զուգահեռագծերը նոյն բարձրութիւնն ունին, յայտնի է թէ ԳԴ եւ ԵՖ կողմերը միեւնոյն ուղիղ գծին վրայ են։ ԱԴ=ԲԳ, եւ ԱՖ=ԲԵ· ԳԴ=ԱԲ եւ ԵՖ=ԱԲ· ուստի ԳԴ=ԵՖ (Ա.ռ 1·)· Եթէ ԵԴ գծէն ԳԴ եւ ԵՖ հանուին, ԳԵ ու ԴՖ կը մնան իրարու հաւասար (Ա.ռ· 3)· ուրեմն ԴԱՖ եւ ԳԲԵ եռանկիւնք փոխադարձաբար հաւասարակողմ են եւ հետեւապէս իրարու հաւասար (Գիրք Ա· Նախ· ժ·)։

Եթէ ԱԲԵԴ քառակողմէն ԱԴՖ եռանկիւնը հանուի, ԱԲԵՖ զուգահեռագիծը կը մնայ· Եթէ նոյն քառակողմէն՝ ԳԲԵ եռանկիւնը հանուի, ԱԲԳԴ զուգահեռագիծը կը մնայ· ուրեմն այս երկու զուգահեռագծերը համազօր են (Ա.ռ· 3)։

Հետ· Որեւիցէ զուգահեռագիծ համազօր է այն ուղղանկեան որ նոյն խարիսխն ու նոյն բարձրութիւնն ունի։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ· ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երէք եռանկիւն մը և զուգահեռագիծ մը հաւասար խոլեակ և հաւասար քոչյուրիէն ունին, եռանկիւնը զուգահեռագծէն կիսոյն համազօր է։



Եթէ ԱԲԴ զուգահեռագիծն ու ԱԲԵ եռանկիւնը միեւնոյն խարիսխն ունին, ԱԲ, ու միեւնոյն բարձրութիւնը, Ֆ եռանկիւնը զուգահեռագծին կիսոյն չափ է։

Քանզի, որովհետեւ եռանկիւնը եւ զուգահեռագիծը նոյն բարձրութիւնն ունին, եռանկեան գագաթը, Ե, խարսխին զուգահեռական եղող ԵԳ գծին վրայ է։ Երկընցուր ԲԱ խարիսխը, եւ Ե կէտէն՝ ԱԴ կողման զուգահեռական ԵՖ քաշէ։ ՖԲԵ եռանկիւնը՝ ՖԳ զուգահեռագծին կէսն է, եւ ՖԱԵ եռանկիւնը՝ ՖԴ զուգահեռագծին կէսն է (Գիրք Ա· Նախ· ԻԲ· Հետ·)։


Արդ, եթէ ՖԳ զուգահեռագծէն ՖԴ զուգահեռագիծը հանուի, ԱԴ զուգահեռագիծը կը մնայ· եթէ ՖԲԵ եռանկիւնէն, որ առաջին զուգահեռագծին կէսն է, ՖԱԵ եռանկիւնը հանուի, որ երկրորդ զուգահեռագծին կէսն է, ԱԲԵ եռանկիւնը կը մնայ՝ ԱԴ զուգահեռագծին կիսոյն համազօր։

Հետ· 1· Ուստի ԱԲԵ եռանկիւնը միեւնոյն խարիսխն, ԱԲ, ու միեւնոյն բարձրութիւնն, ԱՀ, ունեցող ԱԲԿՀ ուղղանկեան կէսն է· քանզի ԱԲԿՀ ուղղանկիւնը համազօր է ԱԲԴԳ զուգահեռագծին (նախ· Ա· Հետ·)։

Հետ· 2· Հաւասար խարիսխ եւ բարձրութիւն ունեցող եռանկիւններ համազօր են, քանզի համազօր զուգահեռագծերուն կէսերն են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եկէք ուղղանկիւնները որ գիտեն քաշքշուքնէն ունին, երբու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարիսխները։




Ա Դ բարձրութիւնն ունեցող ԱԲԳԴ եւ ԱԵՖԴ ուղղանկիւնները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս ԱԲ եւ ԱԵ։

Նախ. Նիթադրենք թէ խարիսխները հասարակաց չափ ունին եւ իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս, օրինակի համար, 7 կը համեմատի 4 ին։ Եթէ ԱԲ 7 հաւասար մասերու բաժնուի, ԱԵ աս մասերուն 4 ը կը պարունակէ. եւ, եթէ աս եօթը բաժանման կէտերէն խարիսխին ուղղահայեաց գծեր քաշուին, եօթը փոքր ուղղանկիւնիներ կը կազմուին, որոնք իրարու հաւասար են. քանզի հաւասար խարիսխ եւ բարձրութիւն ունին։ ԱԲԳԴ ուղղանկիւնը աս փոքր ուղղանկիւնիներէն եօթը հատ կը պարունակէ, եւ ԱԵՖԴ ուղղանկիւնը՝ չորս հատ. ուստի ԱԲԳԴ ուղղանկիւնը այնպէս կը համեմատի ԱԵՖԴ ուղղանկեան, ինչպէս 7 4 ին կամ ԱԲ՝ ԱԵ ին. այսինքն երբ խարիսխները հասարակաց չափ ունին, նոյն բարձրութիւնն ունեցող երկու ուղղանկիւնիներն իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարիսխները։

Եբէբդբ. Թէեւ ԱԲ եւ ԱԵ խարիսխները հասարակաց չափ չունենան, այսու ամենայնիւ

ԱԲԳԴ : ԱԵՖԴ :: ԱԲ : ԱԵ։



Քանզի, եթէ աս համեմատութիւնը չիտակ չէ, նիթադրենք թէ ԱԲԳԴ այնպէս կը համեմատի ԱԵՖԴ ին, ինչպէս ԱԲ՝ ԱԵ էն մեծ եղող ԱՕ ին։

ԱԲ գիծը եօ էն փոքր հաւասար մասերու բաժնէ. յայտնի է թէ բաժանման կէտերէն դրնէ մէկը, ինչպէս Ի, եւ ին եւ Օ ին միջտեղը պիտի իյնայ. ԱԲ ին ուղղահայեաց Իք քաշէ. ԱԲ եւ ԱԻ խարիսխները հասարակաց չափ ունին եւ

ԱԲԳԴ : ԱԻՔԴ :: ԱԲ : ԱԻ։

Բայց նիթադրութեամբ թէ

ԱԲԳԴ : ԱԵՖԴ :: ԱԲ : ԱՕ։

Ա ս երկու համեմատութեանց նախադասները միեւնոյն են, ուստի յետադասներն համեմատական են (Գիրք Բ. Նախ. Դ.). եւ

ԱԻՔԴ : ԱԵՖԴ :: ԱԻ : ԱՕ։


Բայց ԱՕ մեծ է ԱԻ էն. ուստի, եթէ աս համեմատութիւնը չիտակ է, ԱԵՖԴ ուղղանկիւնը ԱԻՔԴ ուղղանկիւնէն մեծ ըլլալու է. սակայն, ընդհակառակն, պզտիկ է. ուստի համեմատութիւնը չիտակ չէ. ուրեմն ԱԲԳԴ չի կրնար այնպէս համեմատիլ ԱԵՖԴ ին ինչպէս ԱԲ՝ ԱԻ էն մեծ եղող որեւէ գծի։

Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ համեմատութեան չորրորդ եղրը չի կրնար ԱԵ էն փոքր ըլլալ. ուստի ԱԵ ին հաւասար է։

Ուրեմն, խարիսխներուն ընդհանուր համեմատականն ինչ որ ըլլայ, նոյն բարձրութիւնն ունեցող երկու ուղղանկիւնիներն իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարիսխները։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եկէք ուղղանկիւնք երբու այնպէս կը հաճեմատին ինչպէս անոնց խարիսխները եւ բարձրութիւնը։



Եթէ ԱԲԳԴ եւ ԱԵԿՖ քառակողմներն ուղղանկիւն են, անոնք ԱԲԳԴ : ԱԵԿՖ :: ԱԲ× ԱԴ : ԱՖ×ԱԵ։

Երկու ուղղանկիւնները այնպէս դիր որ ԴԱԲ եւ ԵԱՖ գծեր մէկ ուղիղ գիծի վրայ իյնան (Գիրք Ա. Նախ. Դ.), եւ ԳԴ

ու կը կողմերը երկնցուր մինչեւ իրար կտրեն Հ կէտին վրայ ։ ԱԲԳԴ եւ ԱԵՀԴ ուղղանկիւնները , նոյն բարձրութիւնն ունենալով , ԱԴ , իրարու այնպէս կը համեմատին , ինչպէս անոնց խարիսխները , ԱԲ եւ ԱԵ ։ Նաեւ ԱԵՀԴ եւ ԱԵԿՖ ուղղանկիւնները , նոյն բարձրութիւնն ունենալով , ԱԵ , իրարու այնպէս կը համեմատին , ինչպէս անոնց խարիսխները , ԱԴ եւ ԱՖ ։ ուրեմն

ԱԲԳԴ : ԱԵՀԴ :: ԱԲ : ԱԵ ,


եւ ԱԵՀԴ : ԱԵԿՖ :: ԱԴ : ԱՖ ։

Ա՛ս երկու կարգ համեմատութեանց մէկուն առաջին եղրը միւսին առաջին եղրովը , երկրորդը՝ երկրորդովը , եւայլն բազմապատկելով (Գիրք Բ ։ Նախ ։ ԺԳ ։) եւ ԱԵՀԴ , թէ նախադասին եւ թէ յետադասին բազմապատկիչ ըլլալուն համար , զանց ընելով կ'ունենանք

ԱԲԳԴ : ԱԵԿՖ :: ԱԲ×ԱԴ : ԱԵ×ԱՖ ։

Գ

Պոր ։ 1 ։ Եթէ որեւէ պիծ , Դ




Բ

Ա

ինչպէս 1 մատ , 1 ոտք , եւայլն , ջո՛ւնէն համարինք , եւ , եթէ այս պիծը՝ ԱԲԳԴ ուղղանկեան ԱԲ խարիսխին մէջ , օրի՛ Ա նակի համար , 10 անգամ՝ ու ԱԴ բարձրութեանը մէջ 3 անգամ կայ , ԱԲ ին արժէքը 10՝ եւ ԱԴ ինը 3 ջծայէն ջո՛ւնէն է (Սահմ ։ 8) ։ Բաժնէ ԱԲ 10 հաւասար մասանց , եւ բաժանման կէտերէն խարիսխին ուղղահայեաց գծեր քաշէ ։ Նաեւ ԱԴ 3 հաւասար մասանց բաժանման կէտերէն խարիսխին զուգահեռական գծեր քաշէ ։ Այսպէս , ուղղանկիւնը քանի մը իրարու հաւասար քառակուսիներու կը բաժնուի , որոնց ամէնն մէկուն կողմը մէկ գծային միութիւն է , եւ ստացուած ջո՛ւնէն ջո՛ւնէն կը կոչուի ։ Նաեւ յայտնի է թէ ԱԲԳԴ ուղղանկեան մէջ եղած մակերեսութեական միութեանց թիւը գտնելու համար , խարիսխին մէջ եղած գծային միութեանց թիւը բազմապատկելու է բարձրութեան մէջի եղած գծային միութեանց թիւով ։ այսինքն , ԱԲԳԴ ուղղանկեան մէջ 3×10 կամ 30 մակերեսաբանական միութիւնք կան ։ ուրեմն ո՛ւղղանկեան մը մակերեսը հաւասար է անոր խարիսխին ու բարձրութեանն արտադրեալին ։


Պոր ։ 2 ։ Երկրաչափութեան մէջ երկո՛ ջծէջ արտաքրեալը եւ երկո՛ ջծէջ ո՛ւղղանկեանը միեւնոյն բան կը նշանակեն ։ այսինքն ուղղանկիւն մը որուն խարիսխը՝ այն գծերէն մէկուն՝ եւ բարձրութիւնը միւսին հաւասար է ։ Թուաբանութեան մէջ ալ նոյն խօսքը կը գործածուի ։ զորօրինակ , երկու տարբեր թուոց արտադրեալը այն թուոց ո՛ւղղանկեանը կը կոչուի , իսկ իրմով բազմապատկեալ թուոց մը արտադրեալը այն թուոյն տո՛ւակո՛ւսին կը կոչուի ։



1, 2, 3 եւայլն թուոց քառակուսիքն են 1, 4, 9 եւայլն ։ Նմանապէս որեւիցէ երկայնութիւն ունեցող գծէ մը կրկին անգամ երկայն եղող գծի վրայ գծուած քառակուսին՝ առջի գծին վրայ գծուածին չորս անգամն է ։ Նոյն առջի գծէն երեք անգամ երկայն եղող գծի վրայ գծուած քառակուսին՝ դարձեալ նոյն առջի վրայ գծուածին ինը անգամն է , եւայլն ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե ։ ՀԱՅԵՑՄՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որեւէ ը՛ջ ջ՛ահեռաջծէ հաւասար է անոր խոբը՛խին ու բարձրութեանը արտադրեալին ։



Բե բարձրութիւնն ունեցող ԱԲԳԴ զուգահեռագծին մակերեսը հաւասար է ԱԲ×ԲԵ արտադրեալին ։

Գդ կողմը երկնցուր եւ ԱԲ խարիսխին ուղղահայեաց ՖԱ գիծը քաշէ ։ ԱԲԳԴ զուգահեռագիծը եւ ԱԲԵՖ ուղղանկիւնը համազօր են (Նախ ։ Ա ։ Հե [illegible] բայց այս ուղղանկեան մակերեսը

հաւասար է ԱԲ×ԲԵ արտադրեալին (նախ. Դ. Պար. 1). ուրեմն ԱԲԳԴ զուգահեռագծին մակերեսը հաւասար է ԱԲ×ԲԵ արտադրեալին։

Պոր. Հաւասար խարիսխներ ունեցող զուգահեռագըծեր իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց բարձրութիւնքը, եւ հաւասար բարձրութիւններ ունեցող զուգահեռագծեր իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարիսխները։

Քանզի, եթէ Բ երկու զուգահեռագծերու հաւասարակաց խարիսխն՝ ու Գ եւ Դ անոնց բարձրութիւնքին ըլլան, անատեն

Բ×Գ : Բ×Դ :: Գ : Դ (Գիրք Բ. նախ. Է.)։


Եւ, եթէ Գ անոնց հաւասարակաց բարձրութիւնը՝ եւ Ա, ու Բ անոնց խարիսխներն ըլլան,

Ա×Գ : Բ×Գ :: Ա : Բ։

Եւ, առ հասարակ, զուգահեռագծեր իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց բարձրութեանց ու խարիսխներուն արտադրեալքը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եռանկեան մը տրուած է անոր երկու կողմերն ու անոնց կազմած անկիւնին մեծութիւնը։




ԱԴ բարձրութիւնն ունեցող ԱԲԳ եռանկեան մակերեսը՝ ԲԳ×ԱԴ արտադրեալին կիսոյն հաւասար է։

ԱԲ ին զուգահեռական ԳԵ՝ եւ ԲԳին զուգահեռական ԱԵ գծերը քաշէ. ԱԲԳԵ եռանկիւնը՝ ԱԲԳԵ զուգահեռագծին կէսն է (նախ. Բ.). բայց զուգահեռագծին մակերեսը՝ ԲԳ×ԱԴ արտադրեալին հաւասար է (նախ. Ե.) ուրեմն եռանկեան մակերեսը հաւասար է $\frac{1}{2}$ ԲԳ×ԱԴ կամ ԲԳ× $\frac{1}{2}$ ԱԴ արտադրեալին։

Հետ. Երկու եռանկիւնք որ հաւասար բարձրութիւն ունին, իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարիսխները. եւ երկու եռանկիւնք, որ հաւասար խարիսխներ ունին, իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնքը։ Եւ, առհասարակ, եռանկիւնք իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութեանց ու խարիսխներուն արտադրեալքը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Տրուպէզայէ մը ամկիւնը հաւասար է անոր երկու ըստգեհառական կողմանց գումարին կէսոյն և անոր բազմապատկեանը արտադրեալին։



Եթէ ԱԲԳԴ տրապիզաձեւը եց բարձրութիւնն ունի, անոր մակերեսը հաւասար է եց × $\frac{1}{2}$(ԱԲ+ԳԴ) արտադրեալին։

ԲԳի մէջտեղ կէտին, Ի, ԱԴ կողման զուգահեռական ԼԲ գիծը քաշէ, եւ Դ կողմը երկնցուր մինչեւ Զ։

Իբր, եւ ԻԳԲ եռանկեանց ԻԲ եւ ԻԳ կողմերը իրարու հաւասար չ'ինուած են. ԼԻԲ=ԳԻԲ անկեան. եւ, ուրիշեւս ԳԲ եւ ԲԼ զուգահեռական են, ԻԲԼ=ԻԳԲ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Ի. Հետ. 2). ուստի եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. Զ.). ուրեմն ԱԲԳԴ տրապիզաձեւը համաչափ է ԱԴԲԼ զուգահեռագծին, եւ անոր մակերեսը հաւասար է եց×ԱԼ արտադրեալին։

Բայց ԱԼ=ԴԲ. եւ, որովհետեւ ԻԲԼ եւ ՓԴԻ եռանկիւնները իրարու հաւասար են, ԲԼ=ԴՓ. ուստի ԱԲ +ԴՓ=ԱԼ+ԴՓ=2 ԱԼ. ուստի ԱԼ՝ ԱԲ եւ ԳԴ կողմերուն գումարին կէսն է. ուրեմն ԱԲԳԴ տրապիզաձեւին մակերեսը հաւասար է ԱԲ եւ ԳԴ զուգահեռական կողմանց գումարին կիսոյն եւ եց բարձրութեան արտադրեալին. այսինքն, ԱԲԳԴ=եց×$\frac{\text{ԱԲ+ԳԴ}}{2}$։


Պոր. Եթէ ԲԳ գծին միջին կէտէն, ի, ԱԲ խորքա-խին զուգահեռական ԻՀ քաշուի, Հ՝ ԱԴ գծին միջին կէտը պիտի ըլլայ։ Քանզի, որովհետեւ ԱՀԻԼ եւ ԴՀԻԲ զուգահեռագիծ են, ԱՀ=ԻԼ, եւ ԴՀ=ԻԲ. բայց, ո-րովհետեւ ԲԻԼ եւ ԳԻԲ եռանկիւնները իրարու հաւա-սար են, ԻԼ=ԻԲ. ուստի ԱՀ=ԴՀ։ Նաեւ ՀԻ=ԱԼ=$\frac{\text{ԱԲ+ԳԴ}}{2}$. ուրեմն ԱԲԳԴ տրապիզաձեւին մակերեսը հաւասար է ԵՖ×ՀԻ արտադրեալին. այսինքն, տրապի-զաձեւին մակերեսը հաւասար է անոր հակառակ կող-մանց միջին կէտերն իրար միացընող գծին եւ անոր բարձրութեանն արտադրեալին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ քէթ մը երկու մասանց բաժնուի, ամբողջ քէթին վրայ քաշուած տառակուսին հաւասար է մասանց վրայ քաշուած տառակուսիներուն գումարին, ասոնց ուղղան-կեան երկնապատիկը։

Եթէ ԱԴ գիծը որեւիցէ կէտի վրայ, Բ, երկու մա-սանց, ԱԲ ու ԲԴ, բաժնուի,

ԱԴ² կամ (ԱԲ+ԲԴ)²=ԱԲ²+ԲԴ²+2ԱԲ×ԲԴ։



ԱԴԵՖ քառակուսին գծէ. Ան էն ԱԲ ին հաւասար ԱՖ մասը կտրէ. եւ ԱԴ ին զուգահեռական ՖԿ՝ ու ԱԵ ին զուգա-հեռական ԲՀ գծերը քաշէ։

ԱԴ քառակուսին չորս մաս ունի, ո-րոնցմէ ԱԲԻՖ՝ ԱԲ գծին վրայ գծուած քառակուսին է, քանզի ԱՖ չհնուած է ԱԲ ին հաւա-սար. որովհետեւ ԱԴ=ԱԵ ու ԱԲ=ԱՖ, ԱԴ—ԱԲ= ԱԵ—ԱՖ, կամ ԲԴ=ԵՖ. բայց ԲԴ=ԻԿ, եւ ԵՖ=ԴԿ. ուս-տի ԻԿԴՀ հաւասար է ԲԴ ին վրայ գծուած քառակու-սւոյն. նաեւ ԲԴԿԻ եւ ԵՖՀԻ ուղղանկեանց իրար-քանչիւրը հաւասար է ԱԲ×ԲԴ արտադրեալին. ուրեմն

ԱԴ² կամ (ԱԲ+ԲԴ)²=ԱԲ²+ԲԴ²+2ԱԲ×ԲԴ։

Հետ. Երբ ԱԲ=ԲԴ, ԲԴԿԻ եւ ԵՖԻՀ քառակուսի կ'ըլլան, այսինքն, ամբողջ գծի մը վրայ գծուած քա-ռակուսին՝ նոյն գծին կիսոյն վրայ գծուած քառա-կուսւոյն քառապատիկն է։


Պոր. Այս նախադասութիւնը ըստ ալճէպրայի կըր-նայ ապացուցուիլ։ Եթէ է՝ ամբողջ գիծը ցուցընէ, եւ ա ու բ՝ անոր մասերը, անասեն է=ա+բ. եւ է²=ա²+բ²+2աբ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու ֆձերուն տարբերութիւնը վրայ ֆձուած տուա-կուսին համարժէք է այն ֆձերուն վրայ ֆձուած տուա-կուսիներուն գումարին, նուազ նոյն ֆձերուն ուղղան-կեան երկնապատիկը։

Թող ԱԲ եւ ԲԳ երկու գիծ ցուցընեն. անասեն ա-նոնց տարբերութիւնը՝ ԱԳ է, եւ

ԱԳ² կամ (ԱԲ—ԲԳ)²=ԱԲ²+ԲԳ²—2ԱԲ×ԲԳ։



ԱԲԻՖ քառակուսին գծէ. ԱՖ-էն ԱԳ ին հաւասար Ան կտրէ. Բի ին զուգահեռական ԳԿ՝ եւ ԱԲ-ին զուգահեռական ՀՖ քաշէ. նաեւ ԵՖԼՖ քառակուսին գծէ։ ԳԲԻԿ եւ ԿԼՖՒ ուղղանկեանց իւ-րաքանչիւրը հաւասար է ԱԲ×ԲԳ արտադրեալին. նաեւ ԱԲԻԼԲԵԱ բազմանկիւնը համա-ղօր է ԱԲ² + ԲԳ² գումարին. եւ, եթէ բազմանկիւ-նէն այն երկու ուղղանկիւնները հանուին, ԱԳԴԵ քա-ռակուսին կը մնայ. ուրեմն


ԱԳ² կամ (ԱԲ—ԲԳ)²=ԱԲ²+ԲԳ²—2ԱԲ×ԲԳ։

Պոր. Նաեւ ըստ ալճէպրայի (ա—բ)²=ա²+բ²—2աբ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու գծերուն գումարին և տարբերութեան ուղղանկիւնը հաւասար է նոյն գծերուն վրայ գծուած քառակուսիներուն տարբերութեան։

Թող ԱԲ եւ ԲԳ երկու գիծ ցուցընեն. անսաեն
$(ԱԲ+ԲԳ)\times(ԱԲ-ԲԳ)=ԱԲ^2-ԲԳ^2$ ։



ԱԲ եւ ԱԳ գծերուն վրայ ԱԲՖ ու ԱԴԵ քառակուսիները գծէ. ԱԲ երկնցուր մինչեւ Բ՛ հաւասար ըլլայ ԲԳ ին, եւ Ա՛Լ ուղղանկիւնը գծէ։

Եւ ուղղանկեան խարիսխը, Ա՛Բ, հաւասար է ԱԲ ու ԲԳ գծերուն գումարին. եւ անոր բարձրութիւնը, ԱԵ, հաւասար է նոյն գծերուն տարբերութեանը. ուստի Ա՛Լ=(ԱԲ+ԲԳ)×(ԱԲ—ԲԳ)։ Դարձեալ այս ուղղանկեան Բ՛Լ՛Բ մասը հաւասար է ԵԴԿՖ ուղղանկեան, քանզի Բ՛Հ=ԴԵ, եւ ԲՔ=ԵՖ. ուստի Ա՛Լ՛Ե=ԱԲՀԵ+ԵԴԿՖ. Նաեւ ԱԲՀԵ+ԵԴԿՖ=ԱԲ²—ԲԳ². ուրեմն Ա՛Լ՛Ե=ԱԲ²—ԲԳ², կամ (ԱԲ+ԲԳ)×(ԱԲ—ԲԳ) =ԱԲ²—ԲԳ²։


Պոր. Նաեւ ըստ ալճէպրայի (ա+բ)×(ա—բ)=ա²—բ²։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որեւէ ուղղանկիւն եռանկեան հակադրեալ վրայ գծուած քառակուսին հաւասար է միւս երկու կողմերուն վրայ գծուած քառակուսեաց գումարին։

Եթէ ԱԲԳ եռանկեան ԲԱԳ անկիւնը ուղիղ է, ԲԳ²=ԱԲ²+ԱԳ²։

Երեք կողմանց վրայ քառակուսիներ գծէ. ԲԳ ին ուղղահայեաց Ա՛Ե գիծը՝ եւ ԱՖ ու ԳՀ զուգահեռականները քաշէ։



ԱԲՀ եւ ԳԲՖ, ուղիղ անկիւն ըլլալով, իրարու հաւասար են. ուստի ԱԲՀ+ԱԲԳ կամ ՀԲԳ անկիւնը հաւասար է ԳԲՖ+ԱԲԳ կամ ԱԲՖ անկեան. Նաեւ ԱԲ եւ ԲՀ, միեւնոյն քառակուսւոյն կողմերն ըլլալով, իրարու հաւասար են, եւ, նոյն պատճառաւ, ԲԳ=ԲՖ. ուրեմն ԱԲՖ եռանկիւնը հաւասար է ՀԲԳ եռանկեան (Գիրք Ա. Նախ. Ե.)։

Արդ ԱԲՖ եռանկիւնը Բե ուղղանկեան կէսն է. քանզի երկուքն ալ միեւնոյն խարիսխը, ԲՖ, ու միեւնոյն բարձրութիւնը, ԲԲ, ունին (Նախ. Բ. Հետ. 1). Նաեւ, որովհետեւ ԲԱԳ ու ԲԱԼ ուղիղ անկիւն են, ԱԳ եւ ԱԼ գծերը՝ ՀԲ ին զուգահեռական մէկ ուղիղ գիծ կը կազմեն (Գիրք Ա. Նախ. Գ.). ուստի ՀԲԳ եռանկիւնը եւ Ա՛Հ քառակուսին միեւնոյն խարիսխը, ԲՀ, ու միեւնոյն բարձրութիւնը, ԱԲ, ունին. ուրեմն եռանկիւնը քառակուսւոյն կէսն է։

Արդէն ապացուցուած է թէ ԱԲՖ եռանկիւնը հաւասար է ՀԲԳ եռանկեան. ուրեմն ԲԴԵՖ ուղղանկիւնը, որ ԱԲՖ եռանկեան կրկնապատիկն է, համազօր է Ա՛Հ քառակուսւոյն, որ ՀԲԳ եռանկեան կրկնապատիկն է։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ԳԴԵԿ ուղղանկիւնը համազօր է Ա՛Ի քառակուսւոյն. արդ ԲԴԵՖ եւ ԳԴԵԿ ուղղանկիւնները ԲԳԿՖ քառակուսին կը կազմեն. ուրեմն ԲԳ²=ԱԲ²+ԱԳ²։

Հետ. 1. Ուրեմն ուղղանկիւն եռանկեան մը կողմանց մէկուն քառակուսին համազօր է հակուղղոյն քառակուսւոյն՝ նուազ միւս կողման քառակուսին. զորօրինակ, ԱԲ²=ԲԳ²—ԱԳ²։

Հետ. 2. Ա*Դ ուղղահայեացը կը բաժնէ հակուղիղը երկու մասանց,* Բ*Դ եւ* Գ*Դ, որոնք հատուածք կը կոչուին։*

Որովհետեւ Բ*Կ քառակուսին եւ* Բ*Ե ուղղանկիւնը միեւնոյն բարձրութիւնն ունին,* Բ*Ֆ, իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարիսխները,* Բ*Դ եւ* Բ*Դ. նաեւ* Բ*Ե ուղղանկիւնը համաչափ է* Ա*Հ քառակուսւոյն. ուրեմն*

Բ*Դ*^{2} : Ա*Բ*^{2} :: Բ*Դ* : Բ*Դ.*

այսինքն, հակադրեալ տարակոյսին՝ մեծ կողմանց որեւէ մէկուն տարբերութիւնը մեծագոյն է, քան հակադրեալ տարակոյսին՝ նոյն կողման կէս եղած հատուածին։


Նմանապէս Բ*Դ*^{2} : Ա*Դ*^{2} :: Բ*Դ* : Դ*Դ։*

Հետ. 3. Բ*Դ*եւ*Ֆ եւ Դ*Գ*Կ ուղղանկիւնները, հաւասար բարձրութիւն ունենալով, իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարիսխները. նաեւ այս ուղղանկիւնները համաչափ են* Ա*Հ եւ* Ա*Ի քառակուսիներուն. ուրեմն*

Ա*Բ*^{2} : Ա*Գ*^{2} :: Բ*Դ* : Դ*Դ.*

այսինքն, տարբեր անկիւնը կազմող կողմանց տարակոյսէը երբոր այնպէս կը հաշխարհին, ինչպէս հակադրեալ այն կողմանց կէս եղող հատուածներըը։

Հետ. 4. Ա*ԲԳԴ քառակուսւոյն տրամանկիւնը* Ա*Գ,* Ա*ԲԳ ուղղանկիւնն եռանկիւնի հակուղիղն է. ուրեմն* Ա*Գ*^{2}=Ա*Բ*^{2} +Բ*Գ*^{2}=2Ա*Բ*^{2}. *այսինքն, տարակոյսին որմանկեան վրայ գծուած տարակոյսին՝ անոր որեւէ կողման վրայ գծուած տարակոյսին կրկնապատիկն է։*



Հետ. 5. Որովհետեւ Ա*Գ*^{2} : Ա*Բ*^{2} :: 2 : 1,

Ա*Գ* : Ա*Բ* : : $\sqrt{2}$: 1 (Գիրք Բ. Նախ. ԺԲ. Հետ.).

այսինքն տարակոյսին որմանկեանը և կողմը հաշխարհ կոյ ընդ ընդ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Ամէն եռանկեան որեւէ արտաքեան ընդդէմակաց կողման տարակուսին՝ հոմաղէպ է ներքինն ու մօտ կողման տարակուսինեըուն գումարին, նոյնպէս այն ուղղանկեան կրկնապատիկը որուն մէկ կողմը ներքինն է, և մօտ կողմը ներքինին հետ անոր շրջանակումնեանը այն տան է, որ ընդդէմակաց անկիւնին տարածած ուղղահայեացին և արտաքեան գագաթին մէջտեղը կ'իջնայ։

Եթէ Ա*Դ ուղղահայեաց է* Բ*Դ խարիսխին,* Ա*Բ*^{2}=Ա*Գ*^{2} +Բ*Դ*^{2}—2Բ*Դ*×*Դ*Գ։



Նախ. Երբ Ա*Դ ուղղահայեացը* Բ *եւ* Գ *ին մէջտեղը կ'իյնայ,* Բ*Դ*=Բ*Գ*—Դ*Գ, եւ, հետեւապէս,* Բ*Դ*^{2}=Բ*Գ*^{2}+Դ*Գ*^{2}—2Բ*Դ*×*Դ*Գ (*Նախ. Թ.*)։ *Այս հաւասարութեան երկու կողմը* Ա*Դ*^{2} *աւելցընելով կ'ունենանք* Ա*Դ*^{2}+Բ*Դ*^{2}=Ա*Դ*^{2}+Դ*Գ*^{2} +Բ*Դ*^{2}—2Բ*Դ*×*Դ*Գ, *կամ* Ա*Բ*^{2}=Ա*Դ*^{2}+Բ*Գ*^{2} —2Բ*Դ*×*Դ*Գ։


Երկրորդ. Երբ Ա*Դ ուղղահայեացը եռանկիւնէն դուրս կ'իյնայ,* Բ*Դ*=Դ*Գ —Բ*Գ, *եւ, հետեւապէս,* Բ*Դ*^{2}=Գ*Դ*^{2} +Բ*Գ*^{2}—2Գ*Դ*×Բ*Գ (*Նախ. Թ.*)։ Ա*Դ*^{2} *աւելցընելով, առաջուան պէս կ'ունենանք* Ա*Բ*^{2}=Բ*Գ*^{2}+Ա*Դ*^{2}—2Բ*Գ*×*Դ*Գ։



ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն բռնանկիւն եռանկիւնի մը , բռնանկիւնի ընդդէմ-կից կողման քառակուսին հաւասար է խոյթքին ու-ղիղ կողման քառակուսիներուն գումարին , այսինքն ուղ-ղանկիւնի կէնտրոպոիկը որուն մէկ կողմը խոյթքին է , և ուղիղ կողմը խոյթքին շարունակութիւնը այն մասն է , որ ընդդէմակաց անկիւնին գագաթէն ու բռնանկիւնի մէջտեղը կ՚իյնայ :

Եթէ ԱԴԲ եռանկիւնի Գ անկիւնը բթանկիւն է , եւ ԱԴ ուղղահայեաց է ԲԳ խարսխին շարունակութեանը , ԳԴ , ԱԲ²=ԱԳ²+ԲԳ²+2ԲԳ×ԳԴ :



ԱԴ ուղղահայեացը՝ Բ եւ Գին մէջ-տեղը չի կրնար իյնալ . քանզի եթէ իյնար , օրինակի համար , Ե կէտին վրայ , ԱԳե եռանկիւնի մէջ ե ան-կիւնը՝ ուղղանկիւնի , եւ Գ անկիւնը բթանկիւնի պիտի ըլլար . բայց ասի-կա անկարելի է (Գիրք Ա. Նախ. իե. Հետ. 3). ուրեմն ուղղահայեացը եռանկիւնէն դուրս կ՚իյնայ , եւ ԲԳ=ԲԳ+ԳԴ . ուստի ԲԳ²=ԲԳ²+ԳԴ²+2ԲԳ×ԳԴ (Նախ. Ը.) : ԱԴ² աւելցընելով եւ վերածելով , ինչպէս նա-խընթաց նախադասութեան մէջ , կ՚ունենանք ԱԲ² =ԲԳ²+ԱԴ²+2ԲԳ×ԳԴ :


Պոր . Միայն ուղղանկիւնի եռանկիւնի երկու կողմանց քառակուսիներուն գումարը հաւասար է միւս կողման քառակուսւոյն . քանզի , երբ երկու կողմանց մէջտե-ղի անկիւնը սուր է , անոնց քառակուսիներուն գու-մարը մեծ է միւս կողման քառակուսիէն , եւ , երբ անկիւնը բութ է , գումարը պզտիկ է միւս կողման քառակուսիէն :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն եռանկիւնի որեւէ երկու կողմանց քառակուսեաց գու-մարը համաչափ է երբեմն կողման հետ քառակուսւոյն ներգ-նապատկին , այսինքն նոյն կողման վրայի հետեւ ընդ-դէմակաց անկիւնը բթութիւն է , եւ հետեւ ընդդէմակաց անկիւնը սուր է :

Եթէ Դ՝ ԱԲԳ եռանկիւնի խարսխին միջին կէտն է ,

ԱԲ²+ԱԳ²=2ԲԴ²+2ԱԴ² :




ԲԳ խարսխին ուղղահայեաց ԱԵ դիծը քաշէ . անատեն ԱԳ²=ԱԴ²+ԴԳ²—2ԴԳ×ԵԴ (Նախ. ԺԲ.) . եւ ԱԲ²=ԱԴ²+ԴԲ²+2ԴԲ×ԵԴ (Նախ . ԺԳ.) :

Այս երկու կարգ հաւասարութիւնները գումարե-լով , եւ դիտելով թէ ԴԲ հաւասար է ԴԳին , կ՚ունենանք

ԱԲ²+ԱԳ²=2ԲԴ²+2ԱԴ² :

Հետ . Ուրեմն ամէն ը-փոհիւ-թէին ըր-ա կողմանց քա-ռակուսեաց գումարը հաւասար է անոր պրամանկիւնիներուն քառակուսեաց գումարին :



Քանզի ԱԴ եւ ԲԴ տրամանկիւնիները իրար երկու հաւասար մասանց կը բաժնեն (Գիրք Ա. Նախ. ԼԱ.) . ուս-տի ԱԲԳ եռանկիւնի մէջ ԱԲ²+ԲԳ²=2ԱԵ²+2ԲԵ² . եւ ԱԴԳ եռանկիւնի մէջ ԱԴ²+ԴԳ²=2ԱԵ²+2ԴԵ² . գումարելով եւ դիտելով թէ ԲԵ հաւասար է ԴԵին , կ՚ունենանք

ԱԲ²+ԱԴ²+ԴԳ²+ԲԳ²=4ԱԵ²+4ԴԵ² :


Բայց 4ԱԵ²՝ 2ԱԵին կամ ԱԳին քառակուսին է , եւ 4ԴԵ²՝ ԲԴին քառակուսին (Նախ . Ը . Հետ .) . Ուրեմն կողմանց քառակուսեաց գումարը համաչափ է տրամ-անկիւններուն քառակուսեաց գումարին :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որևէ եռանկեան խարխլին զուգահեռական ուղիղ՝ ձիւռ երկու կողմերը երբոր համեմատական մասանց կը բաժնէ։

Եթէ ԴԵ *գիծը* ԱԲԳ *եռանկեան* ԲԳ *խարսխին զուգահեռական է,*

ԱԴ:ԴԲ::ԱԵ:ԵԳ։



ԲԵ *եւ* ԴԳ *գծերը քաշէ. ԱԴԵ եւ* ԲԴԵ *եռանկիւնները, ե հաւասարակաց գագաթին ունենալով, միեւնոյն բարձրութիւնն ունին, եւ իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարխլները. կամ*

ԱԴԵ:ԲԴԵ::ԱԴ:ԴԲ.

Նաեւ ԱԴԵ *եւ* ԴԵԳ *եռանկիւնները, Դ հաւասարակաց գագաթին ունենալով, իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց խարխլները. կամ*

ԱԴԵ:ԴԵԳ::ԱԵ:ԵԳ։

Բայց ԲԴԵ *եւ* ԴԵԳ *եռանկիւնները միեւնոյն խարիսխը, Դե, ունին, եւ, որովհետեւ իրենց գագաթները խարսխին զուգահեռական եղող* ԲԳ *գծին վրայ են, միեւնոյն բարձրութիւնն ալ ունին. ուստի իրարու համազօր են (Նախ. Բ. Հետ. 2). ուրեմն (Գիրք Բ. Նախ. Դ. Հետ.)*

ԱԴ:ԴԲ::ԱԵ:ԵԳ։

Հետ. 1. Ուրեմն կ'ունենանք (Գիրք Բ. Նախ. Զ.)


ԱԴ+ԴԲ:ԱԴ::ԱԵ+ԵԳ:ԱԵ,

կամ ԱԲ:ԱԴ::ԱԳ:ԱԵ.

Նաեւ ԱԲ:ԲԴ::ԱԳ:ԳԵ։

Հետ. 2. Եթէ ԱԲ *եւ* ԴԳ *գծերը կարող* ԱԴ, ԵՖ, ԿՀ, *եւայլն գծերը իրարու զուգահեռական են,*

ԱԵ:ԳՖ::ԵԿ:ՖՀ::ԿԲ:ՀԴ։



Երկնցուր ԲԱ *եւ* ԴԳ *գծերը մինչեւ* Օ *կէտին վրայ իրար կարեն։* ՕԵՖ *եռանկեան մէջ* ԱԳ *զուգահեռական է* ԵՖ *խարսխին. ուստի*

ՕԵ:ԱԵ::ՕՖ:ԳՖ,

կամ ՕԵ:ՕՖ::ԱԵ:ԳՖ. *նաեւ* ՕԿՀ *եռանկեան մէջ* ՕԵ:ԵԿ::ՕՖ:ՖՀ,

կամ ՕԵ:ՕՖ::ԵԿ:ՖՀ.

Բայց (ՕԵ:ՕՖ) *ընդհանուր համեմատականը հաւասարակաց է այս երկու կարգ համեմատութեանց. ուրեմն*

ԱԵ:ԳՖ::ԵԿ:ՖՀ։

Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ

ԵԿ:ՖՀ::ԿԲ:ՀԴ, *եւայլն.*

ուրեմն ԱԲ *եւ* ԴԳ *գծերուն այն մասերը որ* ԱԳ, ԵՖ, ԿՀ, *եւայլն, զուգահեռականներէն կտրուած են, իրարու համեմատական են։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԶ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ ուղիղ գիծ մը եռանկեան մը երկու կողմերը երբոր համեմատական մասանց կը բաժնէ, այն գիծը երրորդ կողման զուգահեռական է։

Եթէ ԱԲԳ *եռանկեան մէջ* ԱԴ:ԴԲ::ԱԵ:ԵԳ, ԴԵ *գիծը* ԲԳ *կողման զուգահեռական է։*



Գանգի, եթէ ԴԵ *զուգահեռական չէ,* ԴՕ *գիծը քաշէ* ԲԳ *խարսխին զուգահեռական. անատեն*

ԱԴ:ԴԲ::ԱՕ:ՕԳ (Նախ. ԺԵ.).

բայց ենթադրուեցաւ թէ ԱԴ:ԴԲ::ԱԵ:ԵԳ. *ուրեմն* ԱՕ:ՕԳ::ԱԵ:ԵԳ,

կամ ԱՕ:ԱԵ::ՕԳ:ԵԳ։

Բայց ասկէ վերջին համեմատութիւնը չի՛ տակ չէ, քանզի առաջին նախադասը, ԱՕ, *առաջին*


յեռագասէն , Ա՛Ե , պզտիկ է , իսկ երկրորդ նախադասը , ՕԳ , երկրորդ յեռագասէն , ԵԳ , մեծ է . ուրեմն ԴԵ զուգահեռական է ԲԳ խարսխին :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԷ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ըլլէ եռանկեան քաթեթներէն երկու հաւասար մասանց բաժնող ջիծը՝ կը բաժնէ խոլիսին ալ երկու մասանց , որ ատոնցմէ կողմանց համեմատական են :

Եթէ ԳԱԴ հաւասար է ԲԱԴ անկեան ,

ԲԴ : ԳԴ : : ԱԲ : ԱԳ :



Դ. ին զուգահեռական ԴԵ ջիծը քաշէ , եւ ԲԱ երկրորդ մինչեւ ԴԵ կարէ Ե կէտին վրայ :

Որովհետեւ ԲԳԵ եռանկեան մէջ ԱԴ զուգահեռական է ԳԵ ին ,

ԲԴ : ԴԳ : : ԱԲ : ԱԵ (Նախ . ԺԵ .) :

Բայց , որովհետեւ ԱԴ եւ ԴԵ զուգահեռական են , ԱԳԵ հաւասար է ԴԱԳ անկեան , եւ ԱԵԳ հաւասար է ԲԱԴ անկեան (Գիրք Ա. Նախ . Ի . Հետ . 2, 3) . սակայն ենթադրութեամբ , ԴԱԳ հաւասար է ԲԱԴ անկեան . ուրեմն ԱԳԵ հաւասար է ԱԵԳ անկեան , եւ , հետեւապէս , ԱԵ=ԱԳ (Գիրք Ա. Նախ . ԺԲ .) : Վերի համեմատութեան մէջ գտնուած ԱԵ ին տեղ ԱԳ դնելով կ'ունենանք


ԲԴ : ԴԳ : : ԱԲ : ԱԳ :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԸ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եռանկեանց համանման կողմերը՝ երբոր համեմատական , և եռանկիւնները նման են :

Եթէ ԱԲԳ եւ ԳԴԵ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են , այսինքն ԲԱԳ=ԳԴԵ , ԱԲԳ= ԴԳԵ եւ ԱԳԲ=ԴԵԳ , անատեն

ԲԴ : ԳԵ : : ԱԲ : ԳԴ : : ԱԳ : ԴԵ :



Եռանկիւնները այնպէս դիր որ ԲԳ եւ ԳԵ համանուն կողմերը ուղիղ գիծ մը կազմեն , եւ ԲԱ ու ԵԴ կողմերն երկնցուր մինչեւ իրար կարեն Ֆ կէտին վրայ :

Որովհետեւ ԲԳԵ ուղիղ գիծ է , եւ ԲԳԱ հաւասար է ԳԵԴ անկեան , կը հետեւի թէ ԱԳ ու ԴԵ զուգահեռական են (Գիրք Ա. Նախ . ԺԹ . Հետ . 2) : Նմանապէս , որովհետեւ ԱԲԳ հաւասար է ԴԳԵ անկեան , ԱԲ եւ ԴԳ զուգահեռական են . ուրեմն ԱԳԴՖ զուգահեռագիծ է :

ԲՖԵ եռանկեան մէջ ԱԴ զուգահեռական է ՖԵ իսրսխին . ուրեմն ԲԴ : ԴԵ : : ԲԱ : ԱՖ (Նախ . ԺԵ .) , կամ , եթէ ԱՖ ին տեղ անոր հաւասարը , ԳԴ , դրուի ,

ԲԴ : ԴԵ : : ԲԱ : ԴԳ :

Նոյն ԲՖԵ եռանկեան մէջ , ԳԴ ու ԲՖ զուգահեռական են . ուրեմն ԲԴ : ԴԵ : : ՖԴ : ԴԵ , կամ , եթէ ՖԴ ին տեղ անոր հաւասարը , ԱԳ , դրուի ,

ԲԴ : ԴԵ : : ԱԳ : ԴԵ :

Եւ , որովհետեւ ասոնց երկու կարգ համեմատութեանց առաջին եւ երկրորդ եզրերը , ԲԴ : ԴԵ , նոյն են , կ'ունենանք ԱԳ : ԴԵ : : ԲԱ : ԴԳ (Գիրք Բ. Նախ . Դ. Հետ .) :


Ուստի ԲԱԳ եւ ԴԵԳ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եռանկեանց համանուն կողմերն իրարու համեմատական են : Ուրեմն ասոնց երկու եռանկիւնները նման են (Սահմ . 1) :

Հետ . Եթէ երկու եռանկեանց մէկուն երկու անկիւնքը միւսին երկու անկեանցը հաւասար են , եռանկիւնները իրարու նման են . քանզի անատեն երրորդ անկիւնքն ալ՝ հաւասար , եւ երկու եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են (Գիրք Ա. Նախ . Իե . Հետ . 2) :

Պոր . Կը տեսնենք թէ նման եռանկեանց համանուն կողմերը հաւասար անկեանց դիմացը կ'իյնան . զորօրինակ , ԱԳԲ=ԴԵԳ անկեան , եւ ԱԲ ու ԴԳ կողմերը համանուն են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու եռանկեանց կողմերը երկուքական համեմատական են, եռանկիւնները իրենց համապատասխան անկիւնները հաւասար են։



Եթէ ԱԲԳ եւ ԴԵՖ եռանկեանց մէջ ԲԳ : ԵՖ :: ԱԲ : ԴԵ :: ԱԳ : ԴՖ, անսահման Ա═Դ, Բ═Ե եւ Գ═Ֆ անկեան, եւ եռանկիւնները նման են։

Բ անկեան հաւասար ՖԵԿ անկիւնը՝ եւ Գ անկեան հաւասար ԵՖԿ անկիւնը դէպ. անսահման Կ անկիւնը Ա անկեան հաւասար կ'ըլլայ, եւ երկու եռանկիւնները, ԱԲԳ ու ԵՖԿ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն կ'ըլլան (Գիրք Ա. Նախ. Իե. Հետ. 2). ուրեմն

ԲԳ : ԵՖ :: ԱԲ : ԵԿ (Նախ. ԺԸ.). բայց, հնարադրութեամբ, ԲԳ : ԵՖ :: ԱԲ : ԴԵ. ուստի ԵԿ═ԴԵ։

Նաեւ ԲԳ : ԵՖ :: ԱԳ : ՖԿ (Նախ. ԺԸ.). բայց, հնարադրութեամբ, ԲԳ : ԵՖ :: ԱԳ : ԴՖ. ուստի ՖԿ═ԴՖ։ Ուրեմն ԵԿՖ եւ ԴԵՖ եռանկիւնները հաւասարակողմ ըլլալով իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. Ժ.)։ Բայց ԵԿՖ եւ ԱԲԳ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն չենուած են. ուրեմն ԴԵՖ եւ ԱԲԳ եռանկիւնները ալ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն ու նման են։

Պոր. 1. Ա֊ա եւ նախընթաց նախադասութենէն յայտնի է թէ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եռանկիւնք նման են. եւ, հակադարձաբար, եթէ երկու եռանկեանց կողմերը համեմատական են, եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եւ նման են։


Բայց երեքէն աւելի կողմ ունեցող բազմանկիւններն այնպէս չեն. քանզի, օրինակի համար, քառակողմանց կողմերուն համեմատութիւնը կրնանք փոխել առանց անկիւնները փոխելու. նաեւ անկիւնները կրնանք փոխել առանց կողմանց համեմատութիւնը փոխելու. ուստի քառակողմանց փոխադարձաբար հաւասարանկիւն ըլլալէն չենք կրնար հետեւցընել թէ կողմերը համեմատական են. նաեւ կողմերուն համեմատականութենէն չենք կրնար հետեւցընել թէ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են. զորօրինակ, յայտնի է որ, եթէ եռ գլխը ԲԳ ին զուգահեռական քաշուի, Ա եւ ԱԲԳ քառակողմերուն անկիւնները նոյնը կ'ըլլան, թէեւ կողմերուն համեմատութիւնը տարբեր է. նաեւ առանց ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ եւ ԱԴ կողմերը փոխելու կրնանք անկիւնները փոխել, Բ կէտը Դ ին մօտեցընելով կամ անկէ հեռացընելով։



Պոր. 2. ԺԱ, ԺԲ եւ ԺԹ նախադասութիւնները երկրաչափութեան մէջ ամենէն կարեւորները, եւ գրեթէ ամէն երկրաչափական խնդիր լուծելու բաւական են։ Պատճառը սա է որ ամէն բազմանկիւն՝ եռանկիւններու, ամէն եռանկիւն ալ երկու ուղղանկիւն եռանկեան կրնան բաժնուիլ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ի. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու եռանկեանց մէկուն մէկ անկեանը մեծութիւնը միւսին մէկ անկեան հաւասար է, և հաւասար անկիւնները կազմող կողմերը համեմատական են, եռանկիւնները նման են։




Եթէ ԱԲԳ ու ԴԵՖ եռանկեանց Ա անկիւնը հաւասար է Դ անկեան, եւ ԱԲ : ԴԵ :: ԱԳ : ԴՖ, եռանկիւնները նման են։

ԱԲ էն ԴԵ ին հաւասար ԱԿ կրտրէ, եւ ԲԳ ին զուգահեռական ԿՀ քաշէ. ԱԿՀ հաւասար է ԱԲԳ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Ի. Հետ. 3), եւ ԱԿՀ ու ԱԲԳ

եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են. ուստի Ա Բ : Ա Կ : : Ա Գ : Ա Հ . *բայց, հնթադրութեամբ,* Ա Բ : Դ Ե : : Ա Գ : Դ Ֆ . *նաեւ Ա Կ հաւասար է Դ Ե ին, ուստի Ա Հ հաւասար է Դ Ֆ ին. ուրեմն Ա Կ Հ ու Դ Ե Ֆ եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. Ե.) : Բայց Ա Կ Հ նման է Ա Բ Գ եռանկեան. ուրեմն Դ Ե Ֆ ու Ա Բ Գ եռանկիւններն ալ նման են :*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու եռանկեան մէկուն կողմերը մեսին կողմերուն հետ զուգահեռական կամ ուղղահայեաց են, եռանկիւնները նման են :



Նախ. եթէ Ա Բ ու Դ Ե Ֆ եռանկեանց Ա Բ կողմը զուգահեռական է Դ Ե կողման, Բ Գ ալ Ե Ֆ կողման, Ա Բ Գ հաւասար է Դ Ե Ֆ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Ի Դ.). եւ, եթէ Ա Գ զուգահեռական է Դ Ֆ կողման, Ա Գ Բ հաւասար է Դ Ֆ Ե անկեան. ուստի երրորդ անկիւնները, Բ Ա Գ ու Ե Դ Ֆ, իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. Ի Ե. Հետ. 2). ուրեմն այս եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եւ նման են (Նախ. ԺԸ.) :


Երկրորդ. եթէ Դ Ե ուղղահայեաց է Ա Բ կողման, Դ Ֆ ալ Ա Գ կողման, Ա Ի Դ՝ քառակողման Ի եւ Հ անկիւնները ուղիղ են. եւ, որովհետեւ անոր չորս անկեանց գումարը հաւասար է չորս ուղիղ անկեանց (Գիրք Ա. Նախ. Ի Զ. Հետ. 1), Ի Ա Հ եւ Ի Դ Հ անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց : Բայց Ե Դ Ֆ ու Ի Դ Հ անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց.

ուրեմն Ե Դ Ֆ հաւասար է Ի Ա Հ կամ Բ Ա Գ անկեան : Նմանապէս, եթէ Ե Ֆ ուղղահայեաց է Բ Գ կողման, կրնայ ապացուցուիլ թէ Դ Ե Ֆ հաւասար է Գ անկեան, Դ Ե Ֆ ալ Բ անկեան. ուրեմն Ա Բ Գ եւ Դ Ե Ֆ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եւ նման են :

Պոր. Յայտնի է թէ իրարու զուգահեռական կամ ուղղահայեաց եղող կողմերը համանուն կողմերն են. զորօրինակ, համանուն են Դ Ե եւ Ա Բ, նաեւ Դ Ֆ եւ Ա Գ, ու Ե Ֆ եւ Բ Գ կողմերը :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որեւէ եռանկեան մէջ երկու խոթոխէն զուգահեռական ջնջտը տալէ, անոնցմէ դուրս ինկնող տալոտած քոլոր ջնջերը եռանկեան ու անոր զուգահեռականը հաւոմոտական մասանց կը բաժնեն :



Եթէ Դ Ե զուգահեռական է Բ Գ խարսխին, Դ Ի : Բ Ֆ : : Ի Ե : Ֆ Կ : : Ե Հ : Կ Հ, եւայլն :

Քանզի, որովհետեւ Դ Ի զուգահեռական է Բ Ֆ կողման, Ա Դ Ի եւ Ա Բ Ֆ եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են, եւ

Դ Ի : Բ Ֆ : : Ա Ի : Ա Ֆ .

եւ, որովհետեւ Ի Ե զուգահեռական է Ֆ Կ ին,

Ա Ի : Ա Ֆ : : Ի Ե : Ֆ Կ .

ուրեմն Դ Ի : Բ Ֆ : : Ի Ե : Ֆ Կ (Գիրք Բ. Նախ. Դ. Հետ.) :

Նմանապէս կրնայ ապացուցուիլ թէ

Ի Ե : Ֆ Կ : : Ե Հ : Կ Հ , *եւայլն.*

ուրեմն Դ Ե եւ Բ Գ համեմատական մասանց բաժնուած են :

Հետ. եթէ Բ Գ հաւասար մասանց բաժնուած ըլլար, Դ Ե ալ հաւասար մասանց բաժնուած պիտի ըլլար :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Երբ ուղղանկիւն եռանկիւն մը փոփոխին ուղղահայեաց ըլլալ մը կը դադրի,

Նախ. Կողմնակի երկու եռանկիւններէն մին ամբողջ եռանկիւն նման են։

Երկրորդ. Ուղիղ անկիւնը կողմ կամ ուղիղ հակուղիղին և այն կողման առընթերակաց հատուածին միջին համեմատական է։

Երրորդ. Ուղղահայեացը հակուղիղին երկու հատուածներուն միջին համեմատական է։

Եթէ ԲԱԴ եռանկեան Ա անկիւնը ուղիղ է, եւ ԱԴ ուղղահայեաց է ԲԴ խարսխին,



Նախ. ԲԱԴ եւ ԲԱԴ եռանկեանց մէջ Բ անկիւնը հասարակաց է, եւ ԲԱ ուղիղ անկիւնը հաւասար է ԲԱԴ անկեան. ուստի ԲԱԴ հաւասար է Գ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Իե. Հետ. 2). ուրեմն այս երկու եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եւ նման են։ Նմանապէս կրնայ ապացուցուիլ թէ ԴԱԳ եւ ԲԱԴ եռանկիւնները նման են. ուրեմն բոլոր եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն եւ նման են։


Երկրորդ. Որովհետեւ ԲԱԴ եւ ԲԱԳ եռանկիւնները նման են, ԲԴ:ԲԱ::ԲԱ:ԲԳ. եւ, որովհետեւ ԱԴԳ եւ ԲԱԴ եռանկիւնները նման են, ԴԳ:ԱԴ::ԱԴ:ԲԴ. այսինքն ԱԲ եւ ԱԳ կողմանց իւրաքանչիւրը իր առընթերակաց հատուածին եւ հակուղիղին միջին համեմատական է։

Երրորդ. Որովհետեւ ԱԲԴ եւ ԱԴԳ եռանկիւնները նման են, ԲԴ:ԱԴ::ԱԴ:ԴԳ. այսինքն ԱԴ ուղղահայեացը հակուղիղին ԲԴ եւ ԴԳ հատուածներուն միջին համեմատական է։

Պոր. Որովհետեւ ԲԴ:ԱԲ::ԱԲ:ԲԳ, ԱԲ²=ԲԴ×ԲԳ. եւ, որովհետեւ ԴԳ:ԱԳ::ԱԳ:ԲԳ, ԱԳ²=ԴԳ×ԲԳ (Գիրք Բ. Նախ. Ա. Հետ.). ուրեմն ԱԲ²+ԱԳ²=ԲԴ×ԲԴ+ԴԳ×ԲԳ= (ԲԴ+ԴԳ)×ԲԳ=ԲԳ×ԲԳ=ԲԳ². այսինքն, ԲԳ հակուղիղին վրայ գծուած քառակուսին համազօր է ԱԲ եւ ԱԳ կողմերուն վրայ գծուած քառակուսեաց գումարին։

Ասոնով հակուղիղին քառակուսւոյն յատկութեանը դարձեալ կը հասնինք, եւ անոնկ ճամբով մը որ ԺԱ. նախադասութեան մէջ գործածուածէն տարբեր է. եւ, իրօք, կ'երեւի թէ այս յատկութիւնը ուրիշ մէկ ընդհանուր յատկութեան հետեւութիւնն է, այսինքն թէ ֆոխտպոչյաբ հաստատութիւն եռանկեանց համանման կողքերը համեմատական են։

Հետ. Եթէ ԲԳ տրամագիծ է, ԲԱԳ անկիւնը ուղիղ է (Գիրք Գ. Նախ. ԺԸ. Հետ. 2). եւ



Նախ. ԱԴ ուղղահայեացը՝ ԲԳ տրամագիծին ԲԴ եւ ԴԳ հատուածներուն միջին համեմատական է. այսինքն, ԱԴ²=ԲԴ×ԴԳ։

Երկրորդ. ԱԲ կողը՝ ԲԳ տրամագիծին եւ ԲԴ հատուածին միջին համեմատական է. այսինքն, ԱԲ²=ԲԳ×ԲԴ։ Նաեւ ԱԳ²=ԴԳ×ԲԳ. ուրեմն

ԱԲ²:ԱԳ²::ԲԴ:ԴԳ։

Եթէ ԱԲ² եւ ԱԳ² բազդատեանք ԲԳ² ին հետ, կ'ունենանք ԱԲ²:ԲԳ²::ԲԴ:ԲԳ,
եւ ԱԳ²:ԲԳ²::ԴԳ:ԲԳ։


Վերի երեք համեմատութիւնները կը գտնուին նաեւ Նախադասութիւն ԺԱ. Հետ. 2 եւ 3։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եբէոս եռանկիւնները, որոնց մէկուն մէկ անկիւնը մեսին մէկ անկիւնը հաւասար է, իրարու նմանակից կը համեմատին, քանզի պէս հաւասար անկիւնները կազմող կողմանց արտադրեալները։

Եթէ ԱԲԳ *եւ* ԱԴԵ *եռանկեանց մէկուն* Ա *անկիւնը միւսին* Ա *անկեանը հաւասար է,*

ԱԲԳ : ԱԴԵ :: ԱԲ×ԱԳ : ԱԴ×ԱԵ։



Բե եւ Դ քաշէ · որով-հետեւ ԱԲԵ *եւ* ԱԴԵ *եռանկիւնները նոյն գագաթին ունին, և,*

ԱԲԵ : ԱԴԵ :: ԱԲ : ԱԴ

(*Նախ · Զ · Հետ ·*) ·

Նաեւ ԱԲԳ : ԱԲԵ :: ԱԳ : ԱԵ։

Ա.յս երկու համեմատու-թեանց իրարու համապատասխանող եզրերն իրարու հետ բազմապատկելով ու երկրորդին հասարակաց եզր ԱԲԵ *եզրը ջնջելով, կ'ունենանք*

ԱԲԳ : ԱԴԵ :: ԱԲ×ԱԳ : ԱԴ×ԱԵ ։


Հէս · Ուրեմն երկու եռանկիւնները իրարու համագոր են, երբ ԱԲ×ԱԳ=ԱԴ×ԱԵ, *կամ* ԱԲ : ԱԴ : : ԱԵ : ԱԳ · *այսինքն, երբ Դգ եւ Բե զուգահեռական են ։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Նման եռանկիւնի էրբու այնպէս կը համեմատին իրենց անոնց համանման կողմանց տարրերը։

Եթէ ԱԲԳ *եւ Դեֆ նման եռանկեանց* Ա *անկիւնը հաւասար է* Դ *անկեան, եւ* Բ *անկիւնը* Ե *անկեան, անսաեն*

ԱԲԳ : Դեֆ :: ԱԳ² : Դֆ² ։



Քանզի, որովհետեւ Ա *հաւասար է* Դ *անկեան,*

ԱԲԳ : ԴԵՖ :: ԱԲ×ԱԳ : ԴԵ×ԴՖ (*Նախ · ԻԴ ·*) ·

եւ, որովհետեւ եռանկիւնները նման են,

ԱԲ : ԴԵ : : ԱԳ : ԴՖ ·

ան համեմատութեան ու հետեւեալին իրարու համապատասխանող եզրերը բազմապատկէ,


ԱԳ : ԴՖ : : ԱԳ : ԴՖ, *եւ*

կ'ունենանք ԱԲ×ԱԳ : ԴԵ×ԴՖ : : ԱԳ² : ԴՖ² (Գիրք Բ. *Նախ · ԺԳ ·*) ·

ուրեմն ԱԲԳ : ԴԵՖ : : ԱԳ² : ԴՖ² (Գիրք Բ · *Նախ · Դ · Հետ ·*) ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԶ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եբէոս նման քառանկիւնի էրեան նոյն ինչ եռանկիւնից քաշուելէ, անանկ որ մէկուն եռանկիւնները միւսին եռանկիւնների հետ նման դիրք առնեան, և եբէոսէն եռանկիւնն էրարու նման ըլլան ։



ԱԲԳԴ *եւ* ՖԿՀԻ *նման քառանկիւնաց որուե երկու համանման անկիւններէն, Ա. եւ Ֆ, քաշէ* ԱԳ, ԱԴ *եւ* ՖՀ, ՖԻ *տարամանկիւնները ։*

Որովհետեւ քառանկիւնները նման են, ԱԲԳ *հաւասար է* ՖԿՀ *անկեան, եւ* ԱԲ : ՖԿ : : ԲԳ : ԿՀ (Սահմ. 1) · *ուրեմն* ԱԲԳ *եւ* ՖԿՀ *եռանկիւնները իրարու նման են* (*Նախ · Ի ·*), *եւ* ԲԳԱ *հաւասար է* ԿՀՖ *անկեան ։ Նաեւ* ԲԳԴ=ԿՀԻ *անկեան · ուրեմն* ԱԳԴ=ՖՀԻ *անկեան ։ Բայց, որովհետեւ* ԱԲԳ *եւ* ՖԿՀ *եռանկիւնները նման են,* ԱԳ : ՖՀ : : ԲԳ : ԿՀ · *եւ, որովհետեւ քառանկիւնները նման են,* ԲԳ : ԿՀ : : ԳԴ : ՀԻ · *ուրեմն* ԱԳ : ՖՀ : : ԳԴ : ՀԻ (Գիրք Բ. *Նախ · Դ · Հետ ·*) ։ *Բայց* ԱԳԴ=ՖՀԻ *անկեան · ուրեմն* ԱԳԴ *եւ* ՖՀԻ *եռանկիւնները իրարու նման են* (*Նախ · Ի ·*)։ *Նոյն կերպով կրնայ ապա-*


ցուցուիլ թէ մնացած եռանկիւնները իրարու նման են եւ նման դիրք ունին։

Պոբ. Ա. Նախադասութեան հակադարձն ալ ճշմարիտ է. եթէ երկու բազմանկիւնի կրնան նոյն թիւ եռանկիւնաց բաժնուիլ, անոնք որ ձեւոն եռանկիւնները դու նոյն եռանկիւններուն հետ նման դիրք ունենան, և երկու ձեւն եռանկիւնները իրարու նման ըլլան, բազմանկիւնները ալ իրարու նման են։

Քանզի, որովհետեւ եռանկիւնները իրարու նման են, ԱԲԳ=ՖԿՀ անկեան, ԲԳԱ=ԿՀՑ անկեան, ԱԳԴ=ՑՀԻ անկեան, եւայլն. ուրեմն ԲԳԴ=ԿՀԻ անկեան, ԳԴԵ=ՀԻՔ անկեան, եւայլն։ Նաեւ ԱԲ:ՖԿ::ԲԳ:ԿՀ::ԱԳ:ՖՀ::ԳԴ:ՀԻ, եւայլն. ուստի երկու բազմանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են, եւ անոնց կողմերը համեմատական են. ուրեմն իրարու նման են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԷ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Նման բազմանկիւնոյ շրջագիծերը իրարու այնպէս կը հարմարին ինչպէս անոնց համանուն կողմերը, և մակերեսները՝ ինչպէս անոնց համանուն կողմանց քառակուսիները։



Նախ. Եթէ ԱԲ-ԳԴ եւ ՖԿՀԻ նմանման բազմանկիւնք են,

ԱԲ:ՖԿ::ԲԳ:ԿՀ::ԳԴ::ՀԻ, եւայլն. ուրեմն

ԱԲ+ԲԳ+ԳԴ եւայլն : ՖԿ+ԿՀ+ՀԻ եւայլն :: ԱԲ:ՖԿ (Գիրք Բ. Նախ. Ժ.). այսինքն, առաջնոյն շրջագիծը երկրորդին շրջագծին այնպէս կը համեմատի ինչպէս ԱԲ եւ ՖԿ համանուն կողմերը։

Եզրակ. Որովհետեւ ԱԲԳ եւ ՖԿՀ եռանկիւնները նման են, ԱԲԳ:ՖԿՀ::ԱԳ²:ՖՀ² (Նախ. Իե.). եւ, որովհետեւ ԱԳԴ եւ ՖՀԻ եռանկիւնները նման են, ԱԳԴ:ՖՀԻ::ԱԳ²:ՖՀ². ուրեմն

ԱԲԳ:ՖԿՀ::ԱԳԴ:ՖՀԻ (Գիրք Բ. Նախ. Դ. Հետ.). Նմանապէս կրնայ ապացուցուիլ թէ

ԱԳԴ:ՖՀԻ::ԱԴԵ:ՖԻՔ.

ուրեմն ԱԲԳ+ԱԳԴ+ԱԴԵ:ՖԿՀ+ՖՀԻ+ՖԻՔ::ԱԲԳ:ՖԿՀ, կամ ԱԲԳԴԵ:ՖԿՀԻՔ::ԱԲ²:ՖԿ² (Նախ. Իե.). այսինքն նման բազմանկիւնոց մակերեսները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց համանուն կողմանց քառակուսիքը։

Հետ. Երբ ուղղանկիւն եռանկեան մը երեք կողմերուն վրայ նման ձեւեր կը գծուին, հակուղիղին վրայ գծուածը համազօր է միւս երկուքին գումարին. քանզի այս ձեւերն իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց համանուն կողմանց քառակուսիները, եւ հակուղիղին քառակուսին համազօր է միւս երկու կողմանց քառակուսիներուն գումարին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԸ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ բազմակէտ մը ձեզ երկու լոյս երբ կը կոչեն, անոնց հարուածները երբու ֆոֆոխակի համեմատական են։



Ա.Բ եւ Դ.Գ լարերը Ո կէտին վրայ իրար կտրելով չորս հատուած կ'ընեն, եւ այս հատուածները իրարու փոխոխակի համեմատական են, այսինքն առաջնոյն առաջնին մասը այնպէս կը համեմատի երկրորդին առաջնին մասին, ինչպէս երկրորդին երկրորդ մասը՝ առաջնոյն երկրորդ մասին. կամ Ա.Ո:Դ.Ո::Ո.Գ:Ո.Բ։

Ա.Դ եւ Բ.Գ գծերը քաշէ։ Ա.Դ.Ո եւ Բ.Ո.Գ եռանկեանց մէջ Ա.Ո.Գ եւ Բ.Ո.Դ անկիւնները պարագծանկիւն ըլլալով, իրարու հաւասար են. Ա անկիւնը հաւասար է Դ անկեան (Գիրք Գ. Նախ. ԻԵ. Հետ. 1). եւ, նոյն պատճառաւ, Գ հաւասար է Բ անկեան. ուրեմն եռանկիւնները նման են, եւ Ա.Ո:Դ.Ո::Ո.Գ:Ո.Բ։

Հետ. Ուրեմն ԱՕ×ՕԲ=ԴՕ×ՕԳ. այսինքն մէկ լարին երկու հատուածներուն արտադրեալը կամ ուղղանկիւնը հաւասար է միւսին հատուածներուն արտադրեալին կամ ուղղանկեանը (Նախ. Գ. Պար. 2):

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ քովերնիս մը դուրս եղող կէտ մը ինձմէ փոփոխով աղեղը երկու հատուածներու փոփոխակի համեմատական են:



Օ կէտին ՕԲ եւ ՕԳ հատանողները քաշէ. անսաեն ՕԲ:ՕԳ::ՕԴ:ՕԱ:

ԱԳ եւ ԴԲ գծերը քաշէ: ՕԱԳ եւ ՕԲԳ եռանկիւնները Օ հասարակաց անկիւնն ունին. նաեւ Բ=Գ անկեան (Գիրք Գ. Նախ. ԾԸ. Հետ. 1). ուրեմն այս եռանկիւնները նման են, եւ


ՕԲ:ՕԴ::ՕԴ:ՕԱ:

Հետ. Ուրեմն ՕԱ×ՕԲ ուղղանկիւնը հաւասար է ՕԳ×ՕԴ ուղղանկեան:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Լ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ քովերնիս մը դուրս ուրեք կէտ մը շրջափող մը եւ հատանող մը կը հաշուին, շրջափողը ամբողջ հատանողին եւ անոր արտաքին մասին մէջն հասկցականն է:

Օ կէտին ՕԱ չօշափողը եւ ՕԳ հատանողը քաշէ. անսաեն ՕԳ:ՕԱ::ՕԱ:ՕԴ, կամ ՕԱ²=ՕԳ×ՕԴ:




ԱԳ եւ ԱԴ քաշէ: ՕԱԴ եւ ՕԱԳ եռանկեանց մէջ Օ անկիւնը հասարակաց է. ՕԱԴ անկեան չափը ԱԴ աղեղան կէսն է (Գիրք Գ. Նախ. ԻԱ.), եւ Գ անկիւնը նոյն չափին ունի. ուստի այս երկու անկիւնները իրարու հաւասար են, եւ երկու եռանկիւնները նման են.

ուրեմն ՕԳ:ՕԱ::ՕԱ:ՕԴ, կամ ՕԱ²=ՕԳ×ՕԴ:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԼԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ եռանկեան մը ուրեք մէկ անկիւնէն կէտ մը կը տարուի ինձմէ անկեան ընդդիմակաց կողմը, անկիւնը երկու հաւասար մասանց բաժնելով, այդ անկիւնը կողմը կողմանց ուղղանկիւնը հաւասար է բաժնող կէտին տարածութեան, որոնցմէ երբեմն կողման երկու մասանց ուղղանկիւնը:



Եթէ ԱԲԳ եռանկեան մէջ ԲԱԴ հաւասար է ԴԱԳ անկեան, անսաեն

ԱԲ×ԱԳ=ԱԴ²+ԲԴ×ԴԳ:

Բ, Ա եւ Գ կէտերուն վրայ շրջանակ մը գծէ, երկնցուր ԱԴ գիծը մինչեւ Է կէտը, եւ ԳԷ քաշէ:

ԲԱԴ նման է ԵԱԳ եռանկեան. քանզի, ենթադրութեամբ, ԲԱԴ անկիւնը հաւասար է ԵԱԳ անկեան, եւ Բ ու Է անկիւնները նոյն չափը, ԱԳ աղեղան կէսը, ունենալով իրարու հաւասար են. ուստի ԱԲ:ԱԵ::ԱԴ:ԱԳ, կամ ԱԲ×ԱԳ=ԱԵ×ԱԴ. բայց ԱԵ=ԱԴ+ԴԵ, եւ այս հաւասարութեան անդամները ԱԴ-ով բազմապատկելով կ'ունենանք ԱԵ×ԱԴ=ԱԴ²+ԱԴ×ԴԵ. արդ ԱԴ×ԴԵ =ԲԴ×ԴԳ (Նախ. ԻԸ.). ուրեմն ԱԲ×ԱԳ=ԱԴ²+ԲԴ ×ԴԳ:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԼԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն եռանկեան արտաքին կողմանց առընչանկիւնը հաւասար է այն առընչանկեան, որուն հակակողմը եռանկեան պարագիծը քոլորակին տրամագիծն է, և հետևաբար՝ երկու կողմանց կալմած անկեան գագաթնէն դնուած երբորդ կողմը տաղտուկ առընչահայեացը։




Եթէ ԱԲԳ *եռանկեան մէջ* ԱԴ *ուղղահայեաց է* ԲԳ *գծին, եւ եթէ՝ դուրս գծուած քոլորակին տրամագիծն է, անտատեն* ԱԲ×ԱԴ=ԱԴ×ԳԵ։

Գտնէ ԱԵ գիծը։ ԱԳԵ եւ ԱԲԴ եռանկեանց մէջ ԲԴԱ եւ ԳԱԵ անկիւնները ուղիղ են, նաեւ Ե անկիւնը հաւասար է Բ անկեան. ուստի եռանկիւնները նմանման են, եւ ԱԲ:ԳԵ::ԱԴ:ԱԳ. ուրեմն ԱԲ×ԱԳ=ԱԴ×ԳԵ։

Հետ. *Եթէ այս հաւասարութեան երկու անդամները* ԲԳ *ով բազմապատկուին, կ'ունենանք* ԱԲ×ԱԳ×ԲԳ=ԳԵ×ԱԴ×ԲԳ։

Որովհետև ԱԴ×ԲԳ *եռանկեան մակերեսին կրկնապատիկն է (նախ. Զ.). ուրեմն եռանկեան մը երեք կողմանց արտադրեալը հաւասար է անոր մակերեսին, բազմապատկեալ գրուած գծուած քոլորակին տրամագծին կրկնապատիկովը։*

Պար. Նաեւ կրնայ ապացուցուիլ թէ եռանկեան մը մակերեսը հաւասար է անոր շրջագծին՝ բազմապատկեալ ներսը գծուած քոլորակին շառաւիղին կէսովը։



Քանզի ԱՕԲ, ԱՕԳ եւ ԲՕԳ եռանկիւնները նոյն բարձրութիւնն ունին, այսինքն ներսը գծուած քոլորակին շառաւիղը. ուրեմն անոնց գումարը կամ ԱԲԳ եռանկեան մակերեսը հաւասար է ԱԲ, ԱԳ եւ ԲԳ խարիսխներուն գումարին, բազմապատկեալ ԴՕ շառաւիղին կէսովը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԼԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն ներքը գծուած քառանկեան արտադրեալը անկիւնագծաց հաւասար է ընդդիմակաց կողմանց եռանկեանց գումարին։

ԱԲԳԴ ներքը գծուած քառանկեան մէջ
ԱԳ×ԲԴ=ԱԲ×ԳԴ+ԱԴ×ԲԳ։

Գդ աղեղէն ԳՕ կտրէ հաւասար ԱԴ աղեղան, եւ ԲՕ գիծը քաշէ։



Որովհետեւ ԱԴ=ԳՕ աղեղան, ԱԲԴ=ԳԲԻ անկեան. նաեւ ԱԴԲ եւ ԲԳԻ անկիւնները նոյն հատուածին մէջ գծուած ըլլալով իրար հաւասար են. ուստի ԱԲԴ եւ ԻԲԳ եռանկիւնները նման են, եւ ԱԴ:ԳԻ::ԲԴ:ԲԳ. ուրեմն ԱԴ×ԲԳ =ԳԻ×ԲԴ։

Դարձեալ, որովհետեւ ԱԴ=ՕԳ աղեղան, ապա ԱԴ+ԴՕ կամ ԱՕ=ՕԳ+ՕԴ կամ ԴԳ աղեղան. ուստի ԱԲԻ=ԴԲԳ անկեան. նաեւ ԲԱԻ եւ ԲԴԳ անկիւնները նոյն հատուածին մէջ գծուած ըլլալով իրար հաւասար են. ուստի ԱԲԻ եւ ԴԲԳ եռանկիւնները նման են, եւ ԱԲ:ԲԴ::ԱԻ:ԴԳ. ուրեմն ԱԻ×ԴԳ= ԱԻ×ԲԴ։ Այս երկու հաւասարութիւնները գումարելով եւ դիտելով թէ ԱԻ×ԲԴ+ԳԻ×ԲԴ=(ԱԻ+ԳԻ)×ԲԴ =ԱԳ×ԲԴ, կ'ունենանք ԱԴ×ԲԳ+ԱԲ×ԳԴ=ԱԳ×ԲԴ։

ԽՆԴԻՐՆԵՐ


ԽՆԴԻՐ Ա.

Ծանօթ ըլլալ մը դանել մը հաւասար մասանց բաժնելու, կամ այնպէսի մասանց որ ուզուշ ծանօթ ընդարձակութեան։



Նախ. ԱԲ գիծը հինգ հաւասար մասանց բաժնելու համար, Ա կէտէն ԱԿ անորոշ գիծը քաշէ, այս գծէն իրարու հաւասար հինգ մաս կարէ, ԱԳ, ԳԴ, ԴԵ, եւայլն, նաեւ ԿԲ գիծը, եւ անոր զուգահեռական ԳԻ գիծը քաշէ. ԱԻ՝ ԱԲ գծին հինգերորդ մասն է, եւ, եթէ անոր չափը հինգ անգամ ԱԲ գծէն կտրուի, ԱԲ՝ հինգ հաւասար մասանց բաժնուած կ՚ըլլայ։

Քանզի, որովհետեւ ԳԻ զուգահեռական է ԿԲ գծին, ԱԳ եւ ԳԿ համեմատական են ԱԻ եւ ԻԲ գծերուն (Նախ. ԺԵ.). բայց ԱԳ՝ ԱԿին հինգերորդ մասն է. ուրեմն ԱԻ՝ ԱԲին հինգերորդ մասն է։




Երէսպէս. եթէ պահանջուի թէ ԱԲ գիծը այնպէս բաժնուի որ նոր մասերը՝ Փ, Պ եւ Ր գծերուն համեմատական ըլլան, Ա կէտէն ԱԿ անորոշ գիծը քաշէ. այս գծէն Փ, Պ եւ Ր գծերուն հաւասար ԱԳ, ԳԴ եւ ԴԵ կարէ. ԵԲ եւ անոր զուգահեռական ԴՖ եւ ԳԻ գծերը քաշէ. ԱԻ, ԻՖ եւ ՖԲ՝ պահանջուած մասերն են։

Քանզի, որովհետեւ ԳԻ եւ ԴՖ զուգահեռական են

ԲԵ գծին, ԱԻ, ԻՖ եւ ՖԲ համեմատական են ԱԳ, ԳԴ եւ ԴԵ գծերուն. բայց առնք հաւասար են Փ, Պ եւ Ր գծերուն. ուրեմն ԱԻ, ԻՖ եւ ՖԲ՝ պահանջուած մասերն են։

ԽՆԴԻՐ Բ.

Եբէ ծանօթ ընդարձակութեամբ հատուածականեր տրուին։




Ա, Բ եւ Գ գծերուն չորրորդ համեմատականը գտնելու համար, կէտ մը, ինչպէս Դ, Դե եւ ԴՖ անորոշ գծերը քաշէ. Դե էն ԴԱ եւ ԴՐ կտրէ ԱԵ եւ Բ գծերուն հաւասար. ԴՖ էն ԴԳ կտրէ Գ գծին հաւասար. ԱԳ եւ անոր զուգահեռական ԲՏ գծերը քաշէ. ԴՏ պահանջուած հատուածականն է. քանզի, որովհետեւ ԲՏ զուգահեռական է ԱԳ գծին, ԴԱ:ԴԲ::ԴԳ:ԴՏ. բայց այս հատուածութեան առաջին երեք եղերքը՝ Ա, Բ եւ Գ գծերուն հաւասար են. ուրեմն ԴՏ պահանջուած հատուածականն է։

Հետ. Նոյն կերպով Ա եւ Բ ծանօթ գծերուն երրորդ համեմատականը կրնայ գտնուիլ, քանզի պահանջուած համեմատականը՝ Ա, Բ եւ Բ երեք ծանօթ գծերուն չորրորդ համեմատականն է։

ԽՆԴԻՐ Գ.

Եբէ ծանօթ ընդարձակութեամբ ինչքան հատուածականեր տրուին։




Ա եւ Բ գծերուն միջին համեմատականը գտնելու համար, ԴՖ անորոշ գծէն ԴԵ՝ Ա գծին հաւասար, եւ ԵՖ՝ Բ գծին հաւասար կտրէ, ԴՖ կիսաբոլորակը գծէ, եւ ԴՖ տրամագծին ուղղահայեաց ԵԿ քաշէ. ԵԿ՝ պահանջուած հատուածականն է։

Քանզի եկ ուղղահայեացը Դե ու ԵՖ գծերուն միջին համեմատականն է (Նախ. ԻԴ. Հետ.). եւ այս հատուածները հաւասար են Ա եւ Բ գծերուն։

ԽՆԴԻՐ Դ.

Ծռանօղ գծի մը երկու այնպիսի մասանց քաշքշել, որ մէնքը՝ ամբողջ գծին և իւրաքանչիւր մասին միջին համեմատականն ըլլայ։



ԱԲ ծռանօղ գծին Բ ծայրէն, ԱԲ ին կիսոյն հաւասար, ԲԳ ուղղահայեացը քաշէ. Գ՝ կեդրոն ընդուով, ԲԳ չառաւիղով կիսաբոլորակ մը գծէ, եւ ԱԳԵ ուղիղ գիծը քաշէ. նաեւ ԱԲ գծէն ԱԴ ին հաւասար ԱՖ գիծը կտրէ. ԱՖ եւ ՖԲ երկու պահանջուած հատուածներն են. այսինքն ԱԲ:ԱՖ::ԱՖ:ՖԲ։

Քանզի ԱԲ՝ ԳԲ չառաւիղին ուղղահայեաց ըլլալով չօչափող է. ուստի ԱԵ:ԱԲ::ԱԲ:ԱԴ (Նախ. Լ.). ուրեմն ԱԵ—ԱԲ:ԱԲ::ԱԲ—ԱԴ:ԱԴ (Գիրք Բ. Նախ. Զ.)։ Բայց, որովհետեւ ԲԳ չառաւիղը ԱԲ ին կէսն է, Դե տրամագիծը ԱԲ ին հաւասար է. ուստի ԱԵ—ԴԵ=ԱԴ =ԱՖ. նաեւ, որովհետեւ ԱՖ=ԱԴ, ԱԲ—ԱԴ=ՖԲ. ուրեմն ԱՖ:ԱԲ::ՖԲ:ԱԴ կամ ԱՖ. կամ չրջմամբ


ԱԲ:ԱՖ::ԱՖ:ՖԲ։

Պոր. ԱԲ գծին վերոյիշեալ կերպով բաժանումը՝ ծայրական ու միջին եղբերու բաժնում կը կոչուի։ Ան հատանողը այսպէս բաժնուած է. քանզի, որովհետեւ ԱԲ հաւասար է Դե ի,

ԱԵ:ԴԵ::ԴԵ:ԱԴ։

ԽՆԴԻՐ Ե.

Ծռանօղ անկեան մը ծռանօղ մէկ կէտէն վերայէն գիծ մը քաշել, որ անկեան երկու կողմերը այնպէս որ կէտէն ու կողմերուն մէջտեղի մասերն իրարու հաւասար ըլլան։




ԲԴԴ անկեան մէջ Ա կէտէն քաշէ ԱԵ գիծը ԴԳ ին զուգահեռական. Գե ին հաւասար եւ կտրէ, եւ ԲԱԴ քաշէ. ասիկա պահանջուած գիծն է։

Քանզի, որովհետեւ ԱԵ զուգահեռական է ԳԴ գծին, ԲԵ:ԵԳ::ԲԱ: ԱԴ. բայց ԲԵ=ԵԳ. ուրեմն ԲԱ= ԱԴ։

ԽՆԴԻՐ Զ.


Քառակուսի մը գծել որ ծռանօղ ըսոքհեռագիծ մը կամ ծռանօղ եռանկեան մը համաչափ ըլլայ։



Նախ. ԱԲ խարիսխն ու Դե բարձրութիւնն ունեցող ԱԲԳԴ զուգահեռագծին համաչափ քառակուսի մը գծելու համար, ԱԲ եւ Դե գծերուն միջին համեմատականը, ՏՎ, գտիր (Խնդիր Գ.). ՏՎ պահանջուած քառակուսւոյն կողմն է։

Քանզի, որովհետեւ ԱԲ:ՏՎ::ՏՎ:Դե, ՏՎ²=ԱԲ× Դե. բայց ԱԲ×Դե՝ զուգահեռագծին մակերեսն է, ու ՏՎ²՝ քառակուսիին մակերեսը. ուրեմն իրարու համաչափ են։

Եբէ՛ըդ. ԲԳ խարիսխը եւ ԱԴ բարձրութիւնն ունեցող ԱԲԳ եռանկեան համազօր քառակուսի մը գծելու համար, ԱԴ գծին կիսոյն ու ԲԳին միջին համեմատականը, ՈՏ, գտիր. ՈՏ գծին վրայ գծուած քառակուսին՝ ԱԲԳ եռանկեան համազօր պիտի ըլլայ։




Քանզի, որովհետեւ ԲԳ:ՏՈ::ՏՈ:½ԱԴ, ՏՈ²=ԲԳ×½ԱԴ. ուրեմն ՏՈ գծին վրայ գծուած քառակուսին համազօր է ԱԲԳ եռանկեան։

ԽՆԴԻՐ Լ.

Ծանօթ գծի մը վրայ ուղղանկիւն մը գծել որ ծանօթ ուղղանկեան մը համազօր ըլլայ։

ԱԴ գծին վրայ ԱԲՖԳ ուղղանկեան համազօր ուղղանկիւն մը գծելու համար, ԱԴ ԱԲ, ԱԳ գծերուն չորրորդ համեմատականը, ԱՏ, գտիր (Խնդ. Բ.). ԱԴ խարիսխն ու ԱՏ բարձրութիւնն ունեցող ուղղանկիւնը՝ համազօր է ԱԲՖԳ ուղղանկեան։




Քանզի, որովհետեւ ԱԴ:ԱԲ::ԱԳ:ԱՏ, ԱԴ×ԱՏ=ԱԲ×ԱԳ. ուրեմն երկու ուղղանկիւնները իրարու համազօր են։

ԽՆԴԻՐ Ը.

Եբէ՛ ծէն ծռանել որոնց ընդհանուր հաճախականը նոյն ըլլայ, ինչ որ է ծանօթ ծէնէրով կազմուած եբէ՛ ուրանկեանց ընդհանուր հաճախականը։

Ա, Բ, Գ եւ Դ գծերով կազմուած Ա×Բ եւ Գ×Դ ուղղանկեանց ընդհանուր համեմատականն ունեցող երկու գիծ գտնելու համար, Բ, Գ, Դ գծերուն չորրորդ համեմատականը, Տ, գտիր. Ա եւ Տ պահանջուած երկու գծերն են. քանզի, որովհետեւ Բ:Գ::Դ:Տ, Գ×Դ=Բ×Տ. ուրեմն Ա×Բ:Գ×Դ::Ա×Բ:Բ×Տ::Ա:Տ։




Հէ՛ն. Ա, Բ եւ Գ գծերուն վրայ գծուած քառակուսիներուն ընդհանուր համեմատականը գտնելու համար, Ա եւ Գ գծերուն երրորդ համեմատականը, Տ, գտիր. անտառն Ա:Գ::Գ:Տ, կամ Ա×Տ=Գ², կամ Ա²×Տ=Ա×Գ². ուրեմն Ա²:Գ²::Ա:Տ։

ԽՆԴԻՐ Թ.

Ծանօթ բազմանկեան մը համազօր եռանկեան մը գծել։

ԱԲԳԴԵ բազմանկեան համազօր եռանկիւն մը գտնելու համար, ԳԵ տրամանկիւնը քաշէ. ԳԵ ին զուգահեռական ԳՖ գիծը քաշէ մինչեւ Ա գծին շարունակութիւնը. քաշէ նաեւ ԳՖ. ԱԲԳԴԵ բազմանկիւնը համազօր է ԱԲԳՖ բազմանկեան որ առջի բազմանկիւնէն մէկ պակաս կողմ ունի։



Քանզի ԳԴ եւ ԳՖ եռանկիւնները նոյն խարիսխը, ԳԵ, ունին, եւ, որովհետեւ անոնց գագաթները ԳԵ խարսխին զուգահեռական եղող ԴՖ գծին վրայ են,

նոյն բարձրութիւնն ունին. ուրեմն իրարու համազօր են: Անոնց իւրաքանչիւրին վրայ՝ ԱԲԳԵ զուգահեռագիծը գումարելով, կը տեսնենք թէ ԱԲԳԴԵ բազմանկիւնը համազօր է ԱԲԳՖ բազմանկեան:

Նոյն կերպով ԱԲԳ եռանկեան տեղ ԱԿԳ եռանկիւնը դնելով, ԱԲԳԴԵ բազմանկեան համազօր եղող պահանջուած ԿԳՖ եռանկիւնը կ'ունենանք:


Որեւէ բազմանկեան կողմերը այսպէս մէկիկ մէկիկ դուրս ձգելով, անոր համազօր եռանկիւն մը կրնանք գտնել:

Պոբ. Արդէն ցուցուած է թէ ամէն եռանկիւն իրեն համազօր քառակուսւոյ կրնայ փոխուիլ (Խնդիր Զ.). այսպէս ծանօթ բազմանկեան մը համազօր քառակուսին միշտ կրնայ գտնուիլ, եւ ասոր գործողութիւնը կը կոչուի բազմանկիւնը *քառակուսել*:

Բոլորակը *քառակուսելը* խնդիրը՝ ծանօթ տրամագիծով բոլորակի մը համազօր եղող քառակուսին գըտնելն է:

ԽՆԴԻՐ Ժ.

Երկու ծանօթ քառակուսիներուն մէկ ջոմարքին և մէկ պարբերութեանը համազօր եղող քառակուսին գըտնել:



Նախ. Ա եւ Բ կողմերն ունեցող երկու քառակուսիներուն գումարին համազօր եղող քառակուսիին կողմը գտնելու համար, իրարու ուղղահայեաց ԵԴ եւ ԵՖ անորոշ գծերը քաշէ. ԵԴ կարէ Ա կողման հաւասար, ԵԿ ալ՝ Բ կողման հաւասար. նաեւ ԿԴ գիծը քաշէ. այս գիծը պահանջուած քառակուսւոյ կողմն է:


Քանզի, որովհետեւ ԿԵԴ ուղղանկիւն եռանկիւն է, ԿԴ կողման վրայ գծուած քառակուսին համազօր է միւս երկու կողմանց վրայ գծուած քառակուսիներուն գումարին:

Եզրակ. Ա եւ Բ կողմերն ունեցող երկու քառակուսիներուն տարբերութեանը համազօր քառակուսիին կողմը գտնելու համար, ՖԵՀ ուղիղ անկիւնը գծէ. կարէ ԵԿ՝ երկու ծանօթ կողմանց փոքրին հաւասար. Կ կէտը կեդրոն ընելով՝ միւս ծանօթ կողման հաւասար ԿՀ շառաւիղով աղեղ մը քաշէ, այնպէս որ ԵՀ գիծը կարէ Հ կէտին վրայ. Հե՝ պահանջուած քառակուսւոյ կողմն է:

Քանզի, որովհետեւ ԿԵՀ ուղղանկիւն եռանկիւն է, ԵՀ կողմն ունեցող քառակուսին համազօր է միւս երկու կողմանց վրայ գծուած քառակուսիներուն տարբերութեանը:

ԽՆԴԻՐ ԺԱ.

*Քառակուսի մը գտնել որ ծանօթ *քառակուսւոյ* մը այնպէս համեմատի, ինչպէս երկու ծանօթ գծեր՝ իրարու:*




Քառակուսի մը գտնելու համար որ այնպէս համեմատի ԱԳ քառակուսւոյն, ինչպէս Մ եւ Ն գըծերն՝ իրարու, կ՝ անորոշ գծէն Մ գծին հաւասար՝ ԵՖ, եւ Ն գծին հաւասար՝ ՖԿ կարէ, կն տրամագծին վրայ կՀե կիսաբոլորակը գծէ, եւ ՀՖ ուղղահայեացը քաշէ. Հկ լարը քաշէ եւ երկնցուր՝ մինչեւ Հ՚ հաւասար ըլլայ ծանօթ քառակուսւոյն ԱԲ կողմին. Հե լարն ալ քաշէ եւ անորոշ կերպով երկնցուր. Ֆ կէտէն ՖԻ քաշէ կե լին ղուգահեռական. Հի պահանջուած քառակուսւոյ կողմն է:

Քանզի, որովհետեւ ՖԻ ղուգահեռական է կե լին, ՀԻ : Հ՚Ֆ : : Հե : Հկ. ուստի ՀԻ² : Հ՚Ֆ² : : Հե² : Հկ². բայց Հե² այնպէս կը համեմատի Հկ² լին, ինչպէս ԵՖ՝ ՖԿ լին (Նախ. ԺԱ. Հետ. 3), կամ ինչպէս Մ՝ Ն լին. ուստի ՀԻ² : Հ՚Ֆ² : : Մ : Ն: Բայց Հ՚Ֆ = ԱԲ. ուրեմն Հի կողմն ունեցող քառակուսին այնպէս կը համեմատի ԱԲ քառակուսւոյն, ինչպէս Մ՝ Ն լին:

ԽՆԴԻՐ ԺԲ.

Ծանօթ ֆծէ մը վրայ ծանօթ քազմանկեան մը նման քազմանկիւն մը ֆծել։




Ֆկ ֆծէն վրայ ԱԲԳԴԵ քազմանկեան նման քազմանկիւն մը ֆծելու համար, նախ, ԱԳ եւ ԱԴ արամանկիւնները քաշէ. յետոյ ֆծէ կֆՀ՝ ԲԱԳ անկեան հաւասար, եւ ֆկՀ՝ ԱԲԳ անկեան հաւասար. ֆկՀ եռանկիւնը նման է ԱԲԳ եռանկեան։ Նոյն կերպով ՖՀ ին վրայ ՖՀԻ եռանկիւնը ֆծէ ԱԳԴ եռանկեան նման, եւ ՖԻ ին վրայ ՖԻՒ եռանկիւնը ֆծէ ԱԴԵ եռանկեան նման։ ՖկՀԻՒ քազմանկիւնը նման է ԱԲԳԴԵ քազմանկեան։

Քանի, այս երկու քազմանկեանց մէջի եռանկիւնները թոյլ նոյն եւ իրարու նման են, եւ նման դիրք ունին (Նախ. ԻԶ. Պար.)։

ԽՆԴԻՐ ԺԳ.

Քազմանկեան մը ֆծել որ երկու ծանօթ նման քազմանկեանց ընդ ջոյնքին եւ ընդ տարբերութեանը համաչափ նման ըլլայ։



Ա եւ Բ համանուն կողմերն ունեցող քազմանկեանց թէ գումարին եւ թէ տարբերութեանը համաչափ՝ ու քազմանկիւններուն նման քազմանկիւն մը ֆծելու համար, Ա եւ Բ կողմերն ունեցող քառակուսիները կը գտնենք (Գիրք Դ. Խնդիր Ժ.), եւ Տ կողմն ունեցող քառակուսին ալ կը գտնենք։ Ասոնց կողմերուն գումարին եւ տարբերութեանը համաչափ Տ կողմն ունեցող քառակուսին գտնենք։ Պահանջուած քազմանկիւնը՝ Տ ֆծէն վրայ նախընթաց խնդրոյն կանոնովը կրնայ ֆծուիլ։

Քանի նման քազմանկիւններ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն կողմանց քառակուսիները։ Արդ՝ Տ կողմն ունեցող քառակուսին համաչափ է Ա եւ Բ կողմերն ունեցող քառակուսեաց կամ գումարին եւ կամ տարբերութեանը. ուրեմն Տ ֆծէն վրայ ֆծուած քազմանկիւնը համաչափ է Ա եւ Բ ֆծերուն վրայ ֆծուած նման քազմանկեանց կամ գումարին եւ կամ տարբերութեանը։

ԽՆԴԻՐ ԺԴ.


Քազմանկեան մը ֆծել որ նման ըլլայ ծանօթ քազմանկեան մը, եւ անոր այնպէս համեմատի, ինչպէս Մ՝ Ն ին։



Ենթադրենք թէ Տ՝ պահանջուած քազմանկեան այն կողմն է որ ծանօթ քազմանկեան Ա կողման համանուն է։ Պէտք է որ Տ² ռդիոպէս համեմատի Ա²ին, ինչպէս Մ՝ Ն ին. ուստի ԺԱ. խնդրոյն կանոնովը Տ կրնանք գտնել, եւ Տ գիտնալով կրնանք քազմանկիւնը ֆծել ԺԲ. խնդրոյն կանոնովը։

ԽՆԴԻՐ ԺԵ.

Փ քազմանկեան նման եւ Պ քազմանկեան համաչափ քազմանկիւն մը ֆծել։




Փ քազմանկեան համաչափ քառակուսւոյ Մ կողմը, եւ Պ քազմանկեան համաչափ քառակուսւոյ Ն կողմը գտէր՝ Մ, Ն եւ Ա Բ ֆծերուն չորրորդ հա-

մեմատականը, տ, գտիր եւ անոր վրայ, իբրեւ ԱԲ կողման համանուն, փ բազմանկեան նման բազմանկիւն մը գծէ. ասոր բազմանկիւնը համաղօր պիտի ըլլայ պ բազմանկեան։

Քանզի ասոր բազմանկիւնը վ անուանելով, կ'ունենանք փ:վ::ԱԲ²:Տ². բայց ԱԲ:Տ::Մ.Ն, կամ ԱԲ²:Տ²::Մ²:Ն². ուրեմն փ:վ::Մ²:Ն²։ բայց Մ²=փ, եւ Ն²=պ. ուրեմն փ:վ::փ:պ. ուստի վ=պ. ուրեմն վ բազմանկիւնը փ բազմանկեան նման՝ ու պ֊ին համաղօր է։

ԽՆԴԻՐ ԺԶ.

Ծանօթ հաւասարաչափ մը համաչափ ուղղանկիւն մը գծել, որոն առընչակից կողմանց գումարը ծանօթ գծի մը հաւասար ըլլայ։




ԱԲ ծանօթ գծին վրայ ԱԵԲ կիսաբոլորակը գծէ. ԱԲ տրամագծին զուգահեռական եւ Գ ծանօթ քառակուսւոյն կողման չափ հեռաւորութեամբ Դե գիծը քաշէ. քաշէ նաեւ ԵՖ ուղղահայացը. ԱՖ եւ ՖԲ պահանջուած ուղղանկեան կողմերն են։

Քանզի անոնց գումարը հաւասար է ԱԲ գծին, եւ անոնց ուղղանկիւնը, ԱՖ×ՖԲ, համաղօր է ԵՖ քառակուսւոյն. ուրեմն համաղօր է Գ ծանօթ քառակուսւոյն։

Պոր. Երբ ծանօթ քառակուսւոյն կողմը ծանօթ գծին կէսէն մեծ է, խնդիրը չի կրնար լուծուիլ։

ԽՆԴԻՐ ԺԷ.

Ծանօթ հաւասարաչափ մը համաչափ ուղղանկիւն մը գծել, որոն առընչակից կողմանց տարբերութիւնը ծանօթ գծի մը հաւասար ըլլայ։




ԱԲ ծանօթ գծին վրայ կիսաբոլորակ մը գծէ, եւ Գ ծանօթ քառակուսւոյն կողման հաւասար ԱԴ չօչափողը քաշէ. քաշէ նաեւ ԴՖ հատանողը Դ կէտէն եւ Օ կեդրոնին վրայէն. Դե եւ ԴՖ պահանջուած ուղղանկեան կողմերն են։

Քանզի անոնց տարբերութիւնը հաւասար է ԵՖ կամ ԱԲ֊ին. եւ անոնց ուղղանկիւնը, Դե×ԵՖ, համաղօր է ԱԴ²֊ին (Նախ. Լ.). այսինքն համաղօր է Գ ծանօթ քառակուսւոյն։

ԽՆԴԻՐ ԺԸ.

Գոտակոսաձոյ մը կողմն ու անոր տրամանկեան հաւասարակաց չափը գտնել։



ԱԲԳԿ քառակուսւոյն ԳԲ կողմանն եւ ԱԳ տրամանկեան հաւասարակաց չափը գտնելու համար, նախ՝ պէտք է գտնել թէ ԱԲ քանի անգամ կայ ԱԴ֊ին մէջ։ Գ կեդրոն ընդունելով՝ ԳԲ չառաւիղով Դ֊ին կիսաշրջանակը գծէ. յայտնի է թէ ԳԲ մէկ անգամ կայ ԱԳ տրամանկեան մէջ, եւ կ'աւելնայ ԱԴ, որ բաղդատուելու է ԳԲի, կամ անոր հաւասարին հղող ԱԲի հետ։ Ասոր գործողութիւնը յառաջ տանելով մնա֊

ցորդներն այնչափ կը պզտիկնան որ անհնար կ'ըլլայ ալ եւս զանոնք բաղդատել, եւ այսպէս չենք կրնար դիտնալ թէ սա երկու գծերը հաւասարակաց չափ մը ունին թէ չէ։

Բայց աւելի պարզ կերպ մը կայ սա խնդիրը լուծելու։ Որովհետեւ ԱԲԳ ուղիղ անկիւն է, ԱԲ չօչափող է, Ան ալ հատանող է նոյն Ա կէտէն քաշուած, եւ ԱԴ։ԱԲ։։ԱԲ։ԱԵ (նախ. Լ.)։ Ուստի երկրորդ դործողութեան մէջ, երբ ԱԴ միացորդը ԱԲ ին հետ կը բաղդատենք, ԱԴ եւ ԱԲ ին ընդհանուր համեմատականին տեղ կրնանք ԱԲ եւ ԱԵ ին ընդհանուր համեմատականը գործածել. բայց ԱԲ, կամ անոր հաւասարը ԳԴ, երկու անգամ կայ ԱԵ ին մէջ, եւ ԱԴ կ'աւելնայ, որ ԱԲ ին հետ բաղդատուելու է։

Այսպէս երրորդ գործողութիւնը՝ գտնել ԱԴ ԱԲ ին հետ բաղդատել է, եւ կրնանք նոյն կերպով անոր տեղը ԱԲ ին հաւասար եղող ԳԴ բաղդատել ԱԵ ի հետ, եւ կը տեսնենք որ ԳԴ ԱԵ ին մէջ երկու անգամ կայ, եւ ԱԴ կ'աւելնայ։

Ուստի յայտնի է թէ գործողութիւնը երբեք վախճան մը պիտի չունենայ. այսինքն, սա երկու գծերը հաւասարակաց չափ չունին։ Ա՛ս ճշմարտութիւնը տեսանք նաեւ նախ. ԺԱ. հետ. 5 ի մէջ։



ԳԻՐՔ Ե.


ԿԱՆՈՆԱԻՈՐ ԲԱԶՄԱՆԿԻՒՆՔ, ԵՒ ԲՈԼՈՐԱԿԻ ՁԱՓՈՒԻԼԸ

Սահման։

Կանոնաւոր բազմանկիւն կը կոչուի այն բազմանկիւնը որ թէ հաւասարակողմ եւ թէ հաւասարանկիւն է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Նոյն ընտրուած կողմեր ունեցող կանոնաւոր բազմանկիւնք իրարու նման են։



Օրինակի համար, եթէ ԱԲԳԴԵՖ եւ աբգդեֆ կանոնաւոր վեցանկիւններ են, իրարու նման են։ Բոլոր անկեանց գումարը երկուքին մէջ ալ նոյն է, այսինքն ութ ուղիղ անկիւն (Գիրք Ա. նախ. ԻԶ. հետ. 3)։ Ա անկիւնն սա գումարին մէկ վեցերորդն է, նոյնպէս է նաեւ ա անկիւնը. ուրեմն իրարու հաւասար են։ Միեւնոյն պատճառաւ Բ=բ անկեան, Գ=գ, եւայլն։


Դարձեալ, որովհետեւ բազմանկիւնները կանոնաւոր են, ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ, եւայլն, կողմերն իրարու հաւասար են, նոյնպէս իրարու հաւասար են աբ, բգ, գդ, եւայլն, կողմերը. ուստի ԱԲ։աբ։։ԲԳ։բգ։։ԳԴ։գդ, եւայլն. այսինքն, երկու բազմանկեանց անկիւններն իրարու հաւասար են, եւ անոնց համանուն կողմերն՝ իրարու

համեմատական. ուրեմն բազմանկիւնները իրարու նման են (Գիրք Դ. Սահմ. 1)։

Հետ. Նոյն թուով կողմեր ունեցող երկու կանոնաւոր բազմանկեանց շրջագծերը իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն կողմերը. եւ անոնց մակերեսները՝ ինչպէս անոնց համանուն կողմանց քառակուսիները (Գիրք Դ. Նախ. ԻԷ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որքա՞ն կանոնաւոր բազմանկեան մը կրնայ քաղցրակէ մը նէրսը կամ քաղցրակէ մը դուրսը գծուիլ։



ԱԲԴ եւայլն կանոնաւոր բազմանկեան Ա, Բ, Գ կէտերէն շրջանակ մը գծէ, եւ շրջանակին Ո կեդրոնէն ՕՓ ուղղահայացը քաշէ մինչեւ ԲԳ ին միջին կէտը. նաեւ ՕԱ, ՕԲ, ՕԳ, ՕԴ քաշէ։ Եթէ ՕՓԴ բազմանկիւնը ՕՓԲԱ բազմանկեան վրայ դրուի, դուզընթաց պիտի ըլլան. քանզի ՕՓ կողմը հաւասարակաց է. ՕՓԴ եւ ՕՓԲ ուղիղ անկիւնները ըլլալով՝ իրարու հաւասար են. ուստի ՓԳ կողմը ՓԲ կողմին վրայ պիտի իյնայ, Գ կէտն ալ Բ ին վրայ. նաեւ, որովհետեւ ՓԳԴ=ՓԲԱ անկեան, եւ ԳԴ=ԲԱ կողման, Դ կէտը Ա ին վրայ պիտի իյնայ. ուրեմն ՕԴ=ԱՕ, եւ ան շրջանակը որ Ա, Բ, Գ կէտերէն կ'անցնի, Դ կէտէն ալ պիտի անցնի։ Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ այն շրջանակը որ Բ, Գ, Դ կէտերէն կ'անցնի, Է, Ֆ, Կ, եւայլն, կէտերէն ալ պիտի անցնի. այսինքն բազմանկիւնը շրջանակին ներսը գծուած կ'ըլլայ։

Դարձեալ, ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ, եւայլն, ասոնք շրջանակին հաւասար լարեր են. ուստի հաւասարապէս հեռու են Ո կեդրոնէն (Գիրք Գ. Նախ. Ը.). ուրեմն, եթէ Ո

կեդրոնէն ՕՓ չառաւիղով շրջանակ մը գծուի, բազմանկեան իւրաքանչիւր կողման մէջտեղէն պիտի դպչի. այսինքն բազմանկիւնը շրջանակին դուրսը գծուած պիտի ըլլայ։

Պոր. Բազմանկեան թէ ներսը եւ թէ դուրսը գծուած շրջանակներուն Ո կեդրոնը բազմանկեան կեդրոն կ'ըսուի ալ կը կոչուի. եւ ԱԲ մէկ կողման ծայրերէն քաշուած ԱՈ եւ ԲՈ գծերուն կազմած ԱՈԲ անկիւնը՝ բազմանկեան կեդրոնական անկիւնը կը կոչուի։


Հետ. 1. Որովհետեւ ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ, եւայլն, լարերն իրարու հաւասար են, բոլոր կեդրոնական անկիւններն ալ իրարու հաւասար են. ուստի իւրաքանչիւրին արժէքը գտնելու համար չորս ուղիղ անկիւնը բազմանկեան կողմանց թիւովը բաժնել։



Հետ. 2. Ծանօթ բոլորակի մը ներսը կանոնաւոր բազմանկիւն մը գծելու համար, շրջանակը բազմանկեան կողմանց թիւոյն չափ հաւասար մասանց բաժնէ. քանզի, որովհետեւ աղեղներն իրարու հաւասար են, ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ, եւայլն, լարերն ալ հաւասար են. նաեւ ԱՈԲ, ԲՈԳ, ԳՈԴ, եւայլն, եռանկիւնները իրարու հաւասար են, քանզի փոխադարձաբար հաւասարակողմ են. ուստի ԱԲԳ, ԲԳԴ, ԳԴԵ, եւայլն, անկիւնները իրարու հաւասար են. ուրեմն ԱԲԳԴԵՀ՝ կանոնաւոր բազմանկիւն է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ԽՆԴԻՐ

Ծանօթ բոլորակի մը ներսը ոտանաւոր մը գծել




Իրարու ուղղահայեաց երկու տրամագիծ, ԱԳ եւ ԲԴ, քաշէ. քաշէ նաեւ ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ եւ ԴԱ գծերը. ԱԲԳԴ՝ պահանջուած քառակուսին է. քանզի, որովհետեւ ԱՕԲ, ԲՕԳ, եւայլն, անկիւնները իրարու հաւասար են, ԱԲ, ԲԳ, եւայլն, լարերն ալ իրարու հաւասար են. նաեւ ԱԲԳ ԲԳԴ, եւայլն, անկիւնները, կիսաբոլորակներու ներսը գծուած ըլլալով, ուղիղ են։

Պոր. Որովհետեւ ԲԳՕ եռանկիւնը ուղղանկիւն ու երկկողմնաղղիգ է, ԲԳ:ԲՕ::√2:1 (Գիրք Դ. Նախ. ԺԱ. Հետ. 5). այսինքն ներսը գծուած տառակուսւոյն կողմը այնպես կը հարմարի շառաւիղին, ինչպես 2 ին տառակուսի արմատը՝ 1 ին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ԽՆԴԻՐ

Ծանօթ բոլորակի մը ներսը կանոնաւոր վեցանկիւն մը եւ հաւասարակողմ եռանկիւն մը գծել։



Ենթադրենք թէ խնդիրը լուծուած է, եւ ԱԲ՝ վեցանկեան մէկ կողմն է։ ԱՕ եւ ԲՕ շառաւիղները քաշէ. ԱՕԲ եռանկիւնը հաւասարակողմ է. քանզի ԱՕԲ անկիւնը չորս ուղիղ անկեան մէկ վեցերորդ մասն է. ուստի, եթէ մէկ ուղիղ անկիւնը միւթիւն համարինք, ԱՕԲ հաւասար կ'ըլլայ $\frac{4}{6}$ ի կամ $\frac{2}{3}$ ի. եռանկեան միւս երկու անկիւններն ալ, ԱԲՕ,

ԲԱՕ՝ $2-\frac{2}{3}$ ի կամ $\frac{4}{3}$ ի. նաեւ, որովհետեւ ասոնք երկու անկիւններն իրարու հաւասար են, իւրաքանչիւրը հաւասար է $\frac{2}{3}$ ի. ուստի ԱԲՕ եռանկիւնը հաւասարակողմ է, ուրեմն ներսը գծուած կանոնաւոր վեցանկեան կողմը շառաւիղին հաւասար է։


Հետեւապէս ծանօթ բոլորակի մը ներսը կանոնաւոր վեցանկիւն մը գծելու համար, չորքանակին մէկ կէտէն սկսելով շառաւիղին հաւասար վեց լար քաշելու է։

Հաւասարակողմ եռանկիւն մը գծելու համար, վեցանկեան առաջին, երրորդ եւ հինգերորդ գագաթները իրար միացնելու է։

Պոր. Որովհետեւ ԱԲ=ԲԳ=ԳՕ=ԱՕ, ԱԲԳՕ զուգահեռագիծ է. ուստի ԱԳ²+ԲՕ²= 4 ԱԲ² կամ 4 ԲՕ² (Գիրք Դ. Նախ. ԺԴ. Հետ.). եթէ երկու անդամ ներքին ԲՕ² հանենք, կը մնայ ԱԳ²=3 ԲՕ². ուստի ԱԳ²:ԲՕ²::3:1, կամ ԱԳ:ԲՕ::√3:1. այսինքն ներսը գծուած հաւասարակողմ եռանկեան մէկ կողմն այնպես կը հարմարի շառաւիղին, ինչպես երեքին տառակուսի արմատը՝ մէկին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ԽՆԴԻՐ

Ծանօթ բոլորակի մը ներսը կանոնաւոր տասանկիւն մը, հնգանկիւն մը և տասնհինգ կողմ ունեցող բազմանկիւն մը գծել։



Նախ. ԱՕ շառաւիղը Մ կէտին վրայ ծայրական ու միջին եզրերու բաժնէ (Գիրք Դ. Խնդ. Դ. Պար.). ՄՕ մեծ հատուածին հաւասար ԱԲ լարը քաշէ. ԱԲ՝ պահանջուած տասնանկեան կողմն է։ Քանզի, ՄԲ գիծը քաշելով կ'ունենանք ԱՕ:ՕՄ::ՕՄ:ԱՄ, կամ, որովհետեւ ԱԲ= ՕՄ, ԱՕ:ԱԲ::ԱԲ:ԱՄ.

որովհետեւ ԱԲՕ եւ ԱՄԲ եռանկիւնները Ա հասարակաց անկիւնն ունին, եւ այս անկիւնը կազմող կողմերն իրարու համեմատական են, եռանկիւնները իրարու նման են (Գիրք Դ. Նախ. Ի.)։ Բայց ՕԱԲ եռանկիւնը երկկողմնաղոյզ է. ուրեմն ԱՄԲ ալ երկկողմնաղոյզ է, եւ ԱԲ=ԲՄ. բայց, որովհետեւ ԱԲ=ՕՄ, ՄԲ=ՕՄ. ուրեմն ԲՄՕ եռանկիւնն ալ երկկողմնաղոյզ է։

Դարձեալ, ԱՄԲ անկիւնը Օ անկեան կրկնապատիկն է (Գիրք Ա. Նախ. Իե. Հետ. 6). բայց ԱՄԲ հաւասար է ՄԱԲ անկեան. ուստի ՕԱԲ եւ ՕԲԱ անկեանց իւրաքանչիւրը Օ անկեան կրկնապատիկն է, այսինքն եռանկեան երեք անկեանց գումարը Օ անկեան հինգ անգամին հաւասար է. ուրեմն Օ անկիւնը երկու ուղիղ անկեանց մէկ հինգերորդ, կամ չորս ուղիղ անկեանց մէկ տասներորդն է, այսինքն ԱԲ աղեղը՝ շրջանակին մէկ տասներորդն է, եւ ԱԲ լարը պահանջուած կանոնաւոր տասանկեան կողմն է։

Եզրակ. Եթէ կանոնաւոր տասանկեան առաջին, երրորդ, հինգերորդ, եւայլն անկիւններն իրարու միացընենք, Աիկեզ կանոնաւոր հնգանկիւնը պիտի գծուի։


Եզրակ. Տասնուհինգ կողմ ունեցող կանոնաւոր բազմանկիւնը գծելու համար, ԱՕ չառաւիղին հաւասար ԱԼ լարը քաշէ. ԲԼ լարը պահանջուած բազմանկեան մէկ կողմն է. քանզի, ԱԼ աղեղը շրջանակին մէկ վեցերորդն է (Նախ. Դ.). ԱԲ ալ՝ մէկ տասնեւհինգերորդը. ուրեմն ԲԼ, անոնց տարբերութիւնը, շրջանակին մէկ տասնուհինգերորդն է, կամ ԲԼ լարը պահանջուած բազմանկեան մէկ կողմն է։

Հետ. 1. Եթէ ներսը գծուած որեւէ կանոնաւոր բազմանկեան կողմերուն աղեղները երկերկու հաւասար մասանց բաժնենք, այս բաժանեալ աղեղաց լարերովը կրկնապատիկ կողմ ունեցող կանոնաւոր բազմանկիւն մը պիտի գծուի։ Զորօրինակ, ներսը գծուած քառակուսի մը ունենալով, 8, 16, 32, եւայլն, կողմ ունեցող բազմանկիւններ կրնանք գծել։

Հետ. 2. Նաեւ յայտնի է թէ որեւէ ներսը գծուած կանոնաւոր բազմանկիւն՝ իրեն կողմանց թուոյն կրկնապատկին չափ կողմ ունեցող բազմանկիւնէն պակաս է, քանզի մասն ամբողջէն փոքր է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ԽՆԴԻՐ

Շրջանակի մը պարբեր բազմանկեան մը գծել որ նոյն շրջանակին ներսը գծուած նմանօրէն կանոնաւոր բազմանկեան նման ըլլայ։



ԱԲԳԴԵԶ ներսը գծուած բազմանկեան նման բազմանկիւն մը նոյն շրջանակին դուրսը գծելու համար, ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ, եւայլն, աղեղներուն միջին կէտերէն չօչափողներ քաշէ. սոյնք իրար կորելով պահանջուած բազմանկիւնը պիտի գծեն։

Որովհետեւ Թ՝ ԲԹԱ աղեղան միջին կէտն է, Ն ալ՝ ԲՆԳ աղեղան միջին կէտը, ԲԹ=ԲՆ. այսինքն ներսը գծուած բազմանկեան Բ գագաթը՝ ՆԲԹ աղեղան միջին կէտն է։ Քաշէ ՕՀ. սա գիծը Բ կէտէն պիտի անցնի։

Քանզի, որովհետեւ ՕԹՀ եւ ՕՀՆ ուղղանկիւն եռանկիւններուն ՕՀ հասարակաց հակուղիղն ունին, եւ ՕԹ հաւասար է ՕՆ կողման, եռանկիւններն իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. ԺԷ.), եւ ԹՕՀ հաւասար է ՀՕՆ անկեան. ուրեմն ՕՀ՝ ԹՆ աղեղան Բ միջին կէտէն կ'անցնի։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ՕԻ՝ Գ կէտէն կ'անցնի, ՕՔ՝ Դ էն, եւայլն։

Բայց , որովհետեւ ԿՀ զուգահեռական է ԱԲ ին , ՀԻ ալ՝ ԲԳ ին (Գիրք Գ . Նախ . ժ .) , ԿՀԻ հաւասար է ԱԲԳ անկեան (Գիրք Ա . Նախ . ԻԲ .) . նաեւ ՀԻՔ=ԲԳԴ անկեան , ԻՔԼ=ԳԴԵ , եւայլն . այսինքն դուրսը գծուած բազմանկեան անկիւնները հաւասար են ներսը գծուածին անկիւններուն նաեւ ԿՀ : ԱԲ : : ՕՀ : ՕԲ , եւ ՀԻ : ԲԳ : : ՕՀ : ՕԲ . ուստի ԿՀ : ԱԲ : : ՀԻ : ԲԳ ։ Բայց ԱԲ=ԲԳ . ուստի ԿՀ=ՀԻ ։ Նոյն պատճառաւ ՀԻ=ԻՔ , եւայլն . ուստի դուրսը գծուած բազմանկեան կողմերն իրարու հաւասար են . ուրեմն այս բազմանկիւնը կանոնաւոր է , եւ ներսը գծուածին նման ։


ՀԵՊ . 1 . Հակադարձաբար , ԻՀԿՄԼՔ դուրսը գծուած կանոնաւոր բազմանկեան նման բազմանկիւն մը ներսը գծելու համար , շրջանակին Ո կեդրոնէն ՕԻ , ՕՀ , ՕԿ , եւայլն գծերը քաշէ՝ շրջանակը կտրելով Գ , Բ , Ա , եւայլն կէտերուն վրայ . ԳԲ , ԲԱ , եւայլն լարերը պահանջուած բազմանկեան կողմերն են ։ Ա֊ խնդիրը աւելի դիւրին կերպով լուծելու համար , ՆԹ , ԹՍ , ՍՐ , եւայլն լարերը քաշէ . ասոնք ներսը գծուած կանոնաւոր բազմանկիւն մը պիտի կազմեն՝ դուրսը գծուածին նման ։

ՀԵՊ . 2 . Ուրեմն որեւէ դուրսը գծուած կանոնաւոր բազմանկեան նման բազմանկիւն մը կրնանք ներսը գծել , եւ , հակադարձաբար , ներսը գծուած բազմանկեան նման բազմանկիւն մը դուրսը գծել ։

ՀԵՊ . 3 . Յայտնի է թէ ՆՀ+ՀԹ=ՀԹ+ԹԿ=ՀԿ որ կանոնաւոր բազմանկեան մէկ կողմն է ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է . ԽՆԴԻՐ

Շրջանակի մը դուրսը գծել կանոնաւոր բազմանկիւն մը, որուն կողքերուն ընդ֊նոյն շրջանակին դուրսը գծուած նմանօրինակ կանոնաւոր բազմանկեան մը կողքերուն քանակին հաւասարէն ըլլայ ։



Եթէ Գ Դ եկ քառակուսին դուրսը գծուած բազմանկիւնն է , նոյն շրջանակին դուրսը ուրիշ մը գծելու համար , ԱՀ , ՀԲ , ԲՖ եւ ՖԱ աղեղներն երկերկու հաւասար մասանց բաժնէ , եւ անոնց է , ը , ա , բ միջին կէտերէն շօշափողներ քաշէ մինչեւ քառակուսւոյն կողմերը . Ա֊ՓՀՔ եւայլն պահանջուած կանոնաւոր ութանկիւնն է ։

Փը եւ Փա քաշէ . Փը կ հաւասար է Փ֊Ֆ քառանկեան . քանզի , եթէ այս երկուքն այնպէս իրարու վրայ դրուին որ մկուն Փ կողմը միւսին Փ կողման վրայ իյնայ , որովհետեւ ը Փ հաւասար է Բ Փ֊ անկեան , ը Փ պիտի իյնայ Փ֊ ին վրայ . եւ , որովհետեւ Փ֊Ֆ ու Փ ը ուղիղ անկիւններ են , ը է պիտի իյնայ ֊Ֆ ին վրայ . նաեւ , որովհետեւ Փ Բ կ եւ Փ Բ Ֆ ուղիղ անկիւններ են , Բ կ պիտի իյնայ Բ Ֆ ին վրայ . ուստի կ կէտը Ֆ կէտին վրայ պիտի իյնայ . ուրեմն Բ կ=Բ Ֆ , ը կ=֊Ֆ , եւ ը կ Բ=Բ Ֆ֊ անկեան ։ Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ ֊Ֆ=֊Հ , Ֆ Բ=Ֆ Հ , եւ Բ Ֆ֊=֊Հ Ֆ անկեան ։ Բայց , որովհետեւ Ֆ֊ եւ Ֆ Բ չօշափողներն իրարու հաւասար են (Գիրք Գ . Նախ . ԻԲ . Պար . 1) , կը հետեւի թէ Ֆ֊ ին կրկնապատիկն եղող Ֆ Հ հաւասար է Ֆ Բ ի կրկնապատիկն եղող Ֆ կ ին ։


Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ ութանկեան ուրիշ որեւէ երկու կողմերը կամ անկիւններն իրարու հաւասար են . ուրեմն ութանկիւնը կանոնաւոր է ։

Ծանօթ բազմանկեան կողմերուն թիւն ինչ որ ըլլայ , խնդիրն ասոնցմով կրնայ լուծուիլ ։

ՀԵՊ . Յայտնի է թէ դուրսը գծուած քառակուսին դուրսը գծուած ութանկիւնէն մեծ է . եւ , առհասարակ , որեւէ դուրսը գծուած կանոնաւոր բազմանկիւն իրեն կողմանց թուոյն կրկնապատկին չափ կողմ ունեցող բազմանկիւնէն մեծ է ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Շրջանակի մը ըն պռոյքը և ըն ներքը երկու նման կանոնաւոր բազմանկիւններ կրնան գծուիլ, որոնց մակերեսներուն տարբերութիւնը ծայրագոյն չափ մը կրնայ ունենալ։



Եթէ պ ծանօթ մակերեսէն փոքր քառակուսւոյ մը կողմը կը ցուցընէ, շրջանակը 2, 4, 8, 16, եւայլն, հաւասար աղեղնոց բաժնել միշտ կրնանք մէկուն լարը, ԱԲ, պ էն փոքր ըլլայ։ Բաժանման կէտերէն Ա, Բ, Գ, Դ, եւայլն, լարեր քաշէ. որովհետեւ ասոնք լարերն իրարու հաւասար են, ԱԲԳԴԵ եւայլն ներսը գծուած բազմանկիւնը կանոնաւոր է։ Յետոյ շրջանակին դուրսը անոր նման աբգդե եւայլն բազմանկիւնը գծէ. այս երկու բազմանկեանց տարբերութիւնը պ կողմն ունեցող քառակուսիէն փոքր է։

ա եւ բ կէտերէն միշտ 0 կեդրոնը ա 0 եւ բ 0 քաշէ. ասոնք գծերը Ա եւ Բ կէտերէն պիտի անցնին (Նախ. Զ.)։ Ք չօշափման կէտէն Ք0 քաշէ. այս գիծը ԱԲ լարին ուղղահայեաց է եւ զանիկա երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ ի կէտին վրայ (Գիրք Գ. Նախ. Զ. Պար.)։ Նաեւ Ա0 գիծը միշտէ ե երկնցուր, եւ Բե քաշէ։

Եթէ փ՝ դուրսը գծուած բազմանկեան մակերեսը ցուցընէ, եւ ֆ՝ ներսը գծուածինը, որովհետեւ ա0Բ եւ Ա0Բ եռանկիւնները փ եւ ֆ ին նման մասերն են, կ'ունենանք ա0Բ : Ա0Բ :: փ : ֆ (Գիրք Բ. Նախ. ԺԱ.)։ բայց, որովհետեւ եռանկիւններն իրարու նման են,

ա0Բ : Ա0Բ :: 0ա² : 0Ա², կամ 0Բ².
ուրեմն փ : ֆ :: 0ա² : 0Բ²։

Դարձեալ, որովհետեւ 0ա եւ ԵԱ եռանկեանց կողմերն իրարու զուգահեռական են, եռանկիւններն իրարու նման են, եւ

0ա² : 0Բ² :: Աե² : ԵԲ²,
ուստի փ : ֆ :: Աե² : ԵԲ²,
կամ փ : փ—ֆ :: Աե² : Աե²—ԵԲ², կամ Ա Բ²։

Բայց փ՝ Ա ե տրամագծին վրայ գծուած քառակուսիէն փոքր է (Նախ. է. Հետ.). ուստի փ—ֆ՝ Ա Բ ին վրայ գծուած քառակուսիէն փոքր է, եւ առաւել եւս փոքր է պ կողմն ունեցող ծանօթ քառակուսիէն. ուրեմն շրջանակի մը թէ դուրսը եւ թէ ներսը երկու նման կանոնաւոր բազմանկիւններ կրնան գծուիլ, որոնց մակերեսներուն տարբերութիւնը որեւէ ծանօթ մակերեսէ փոքր ըլլայ։

Հետ. 1. Որեւէ դուրսը գծուած կանոնաւոր բազմանկիւն՝ բոլորակէն մեծ է, եւ որեւէ ներսը գծուածը՝ բոլորակէն փոքր։ Բայց դուրսը գծուածին կողմերուն թիւն աւելնալով բազմանկիւնը կը պզտիկնայ եւ բոլորակին հաւասար ըլլալու կը մօտենայ (Նախ. է. Հետ.). Նաեւ ներսը գծուածը, իր կողմանց թիւոյն աւելնալովը, կը մեծնայ եւ բոլորակին հաւասար ըլլալու կը մօտենայ։ Եթէ բազմանկեանց կողքերուն ընդ առնելը շարունակ յառաջ գանինք, երբոտանկիւնէր կողմ պիտի պզտիկնայ, և վերջապէս, երկու բազմանկիւններն էրթալով և բոլորակին հաւասար պիտի ըլլան։


Հետ. 2. Որովհետեւ դուրսը գծուած բազմանկիւնը ներսը գծուածին չափ կողմ ունի, եւ երկուքն ալ կանոնաւոր են, իրարու նման են (Նախ. Ա.). ուստի, երբ իրարու հաւասար կ'ըլլան, նոյն շրջագիծը պիտի ունենան։ Բայց, որովհետեւ ոչ դուրսը գծուած բազմանկեան շրջագիծը կրնայ ներս իյնալ, եւ ոչ ներսինին շրջագիծը՝ դուրս իյնալ, կը հետեւի թէ բազմանկեանց շրջագծերը բոլորակին շրջանակին վրայ պիտի իյնան և անոր հաւասար ըլլան։

Հետ. 3. Երբ ներսը գծուած բազմանկեան շրջա-

գիծը բոլորակին չրջանակին զուգընթաց կ'ըլլայ, Օի ուղղահայեացը՝ չառաւիղ կ'ըլլայ, եւ բազմանկեան ԱԲԳՕ մասը՝ բոլորակին ՕԱԲԳ հատւածը կ'ըլլայ. եւ չրջագծին ԱԲ+ԲԳ մասը՝ ԱԲԳ աղեղը կ'ըլլայ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Որե՛ւ կանոնաւոր բազմանկեան մակերեսը հաւասար է անոր չրջագծին, բազմապատկեալ ներսը գծուած բոլորակին շառաւիղին կէսովը։



Եթէ ՕՆ եւ ՕԹ գծերը կՀԻԲ կանոնաւոր բազմանկեան ներսը գծուած բոլորակին չառաւիղներ են, բազմանկեան մակերեսը հաւասար է անոր չրջագծին, բազմապատկեալ ՕԹ շառաւիղին կիսովը։ Քանզի ՕԿՀ եռանկեան մակերեսը հաւասար է ՀԿ կողմին, բազմապատկեալ ՕԹ ին կիսովը. եւ ՕՀԻ եռանկեան մակերեսը հաւասար է ԻՀ կողմին, բազմապատկեալ ՕՆ ին կիսովը (Գիրք Դ. Նախ. Զ.)։ Բայց ՕՆ=ՕԹ. ուստի այս երկու եռանկեանց մակերեսներուն գումարը հաւասար է (ԿՀ+ՀԻ)×½ՕԹ արտադրելոյն։ Ուրեմն յայտնի է թէ բազմանկեան բոլոր եռանկեանց մակերեսներուն գումարը, կամ բազմանկեան մակերեսը հաւասար է անոր բոլոր կողմերուն գումարին, այսինքն անոր չրջագծին, բազմապատկեալ ՕԹ շառաւիղին կիսովը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որե՛ւ երկու նման, կանոնաւոր բազմանկեանց չրջագծերը երբոր այնպէս կը հանդիպին, ինչպէս ըլլալ երկուքին ալ ներսը գծուած բոլորակներուն շառաւիղները. եւ անոնց մակերեսները երբոր այնպէս կը հանդիպին, ինչպէս այն շառաւիղներուն քառակուսիները։




Եթէ ԱԲ եւ ԱԲ երկու նման բազմանկիւններուն կողմեր են, նախ. երկու բազմանկեանց չրջագծերը իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս գծուած բոլորակներուն ԱՕ եւ ա՛ օ չառաւիղները, նաեւ ինչպէս ներսը գծուած բոլորակներուն ԴՕ եւ դ՛ օ՛ չառաւիղները։ Քանզի այս չրջագծերը իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԱԲ եւ ա՛ բ՛ կողմերը (Գիրք Դ. Նախ. Ի.). բայց Ա հաւասար է ա՛ անկեան, որովհետեւ իւրաքանչիւրը բազմանկեան մէկ անկեան կէսն է. նաեւ Բ հաւասար է բ՛ անկեան. ուրեմն ԱՕԲ նման է ա՛բ՛ եռանկեան, եւ ԱՕԴ՝ ա՛օ՛դ՛ ուղղանկիւն եռանկեան. ուստի ԱԲ:ա՛բ՛::ԱՕ:ա՛օ՛::ԴՕ:դ՛օ՛. ուրեմն բազմանկեանց չրջագծերը իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԱՕ եւ ա՛օ՛, կամ ԴՕ եւ դ՛օ՛։

Երկրորդ. երկու բազմանկեանց մակերեսները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԱՕ² եւ ա՛օ՛², կամ ինչպէս ԴՕ² եւ դ՛օ՛²։ Քանզի այս մակերեսները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԱԲ² եւ ա՛բ՛² (Գիրք Դ. Նախ. Իե.). ուրեմն իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԱՕ² եւ ա՛օ՛², կամ ինչպէս ԴՕ² եւ դ՛օ՛²։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ոչ-ե երկու քուլբակներու շրջանակներն իրարու այնպես կը հպին ինչպես անոնց շառաւիղները, և անոնց մակերեսները՝ ինչպես այն շառաւիղներուն քառակուսիները։



Եթէ շրջ. ԳԱ, շրջ. ՕՔ եւ մակ. ԳԱ, մակ. ՕՔ ցուցնեն ԳԱ եւ ՕՔ չառաւիղ ունեցող քուլբակներուն շրջանակներն ու մակերեսները, ապացուցուելու է թէ շրջ. ԳԱ : շրջ. ՕՔ :: ԳԱ : ՕՔ,
եւ թէ մակ. ԳԱ : մակ. ՕՔ :: ԳԱ² : ՕՔ² ։


Քուլբակներուն ներսը երկու իրարու նման կանոնաւոր բազմանկիւն դնէ. անոնց չրջագծերը իրարու այնպէս պիտի համեմատին ինչպէս ԳԱ եւ ՕՔ չառաւիղները (Նախ. ժ.)։ Եթէ բազմանկեանց կողմերուն աղեղները երկերկու հաւասար մասանց բաժնուելով, բազմանկեանց կողմերուն թիւն աւելցնելը չարունակ յառաջ տարուի, վերջապէս բազմանկեանց չրջագծերն եւ քուլբակներուն շրջանակները պիտի միանան (Նախ. Ը. Հետ. 1), եւ

շրջ. ԳԱ : շրջ. ՕՔ :: ԳԱ : ՕՔ ։

Դարձեալ, ներսը գծուած բազմանկեանց մակերեսները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԳԱ² եւ ՕՔ² (Նախ. ժ.)։ Եթէ բազմանկեանց կողմերուն

թիւը վերոյիշեալ կերպով կ'աւելցնենք մինչեւ որ անոնց չրջագծերը քուլբակներուն շրջանակներուն հետ կը միանան, անոնց իւրաքանչիւրին մակերեսը իր քուլբակին մակերեսին հաւասար կ'ըլլայ, եւ

մակ. ԳԱ : մակ. ՕՔ :: ԳԱ² : ՕՔ² ։




Հէպ. ԱԲ եւ ԴԵ իրարու նման աղեղները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց չառաւիղները, ԱԳ եւ ԴՈ. եւ ԱԳԲ ու ԴՈԵ իրարու նման հատիչները՝ ինչպէս այն չառաւիղներուն քառակուսիները։ Քանզի Գ անկիւնը հաւասար է Ո անկեան (Գիրք Դ. Սահ. 3). բայց Գ անկիւնը չորս ուղիղ անկեանց այնպէս կը համեմատի ինչպէս ԱԲ աղեղը՝ ԱԳ չառաւիղ ունեցող չրջանակին. եւ Ո անկիւնը չորս ուղիղ անկեանց այնպէս կը համեմատի ինչպէս ԴԵ աղեղը՝ ԴՈ չառաւիղ ունեցող չրջանակին (Գիրք Դ. Նախ. ժԷ.). ուստի ԱԲ եւ ԴԵ աղեղներն իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս այն չրջանակները. բայց այն չրջանակները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց չառաւիղները, ԱԳ եւ ԴՈ. ուրեմն

ԱԲ աղեղը : ԴԵ աղեղը :: ԱԳ : ԴՈ ։

Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ԱԳԲ եւ ԴՈԵ հատիչները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԳԱ եւ ԴՈ չառաւիղներն ունեցող քուլբակները. ուրեմն ԱԳԲ հատիչը : ԴՈԵ հատիչը :: ԱԳ² : ԴՈ² ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Բոլորակի մը մակերեսը հաւասար է անոր շրջանակին, բազմապատկեալ անոր շառաւիղին կէսովը։



ԱՕ շառաւիղ ունեցող ԱԳԴԵ բոլորակին մակերեսը հաւասար է $\frac{1}{2}$ ՕԱ×շրջ. ՕԱ արտադրելոյն։

Բոլորակին ներքը գծէ որեւէ կանոնաւոր բազմանկիւն, եւ անոր կողմանց մէկուն ուղղահայեաց ՕՑ քաշէ։ Բազմանկեան մակերեսը հաւասար է անոր շրջագծին, բազմապատկեալ $\frac{1}{2}$ ՕՑ ով (Նախ. Թ.)։ Եթէ բազմանկեան կողմերուն ազեղները երկերկու հաւասար մասանց բաժնուելով, անոր կողմանց թիւը շարունակ աւելցուի, վերջապէս անոր շրջագիծը հաւասար պիտի ըլլայ շրջանակին, անոր մակերեսը՝ բոլորակին մակերեսին, եւ ՕՑ ուղղահայեացը՝ ՕԱ շառաւիղին (Նախ. Ը. Հետ. 1 եւ 3)։ ուրեմն

հակ. ՕԱ=$\frac{1}{2}$ՕԱ×շրջ. ՕԱ։

Հետ. 1. Հաւասի մը մակերեսը հաւասար է անոր աղեղին, բազմապատկեալ անոր շառաւիղին կիսովը։

Ջանազի ԱԳԲ հատուածը ամբողջ բոլորակին այնպէս կը համեմատի ինչպէս ԱՄԲ ազեղը՝ ամբողջ շրջանակին (Գիրք Գ. Նախ. ԺԵ. Պար. 3), կամ, ինչպէս ԱՄԲ×$\frac{1}{2}$ԱԳ՝ ԱԲԳ×$\frac{1}{2}$ԱԳ արտադրելոյն։ Բայց բոլորակը հաւասար է ԱԲԴ×$\frac{1}{2}$ԱԳ ին. ուրեմն հատիկին մակերեսը հաւասար է ԱՄԲ×$\frac{1}{2}$ԱԳ արտադրելոյն։



Հետ. 2. Եթէ π ցուցնէ այն շրջանակը որուն տրամագիծը միութիւն է, որովհետեւ շրջանակներ իրա-

բու այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց տրամագծերը, կ'ունենանք 1:π::2ԳԱ:շրջ. ԳԱ. *ուստի* շրջ. ԳԱ=π×2ԳԱ։ *Բազմապատկելով երկու անդամները* $\frac{1}{2}$ԳԱ *ով կ'ունենանք* $\frac{1}{2}$ԳԱ×շրջ. ԳԱ=π×ԳԱ², *կամ հակ.* ԳԱ=π×ԳԱ². *այսինքն բոլորակի մը մակերեսը հաւասար է անոր շառաւիղին քառակուսւոյն, բազմապատկեալ շրջանակի մը և անոր շառաւիղին ընդհանուր հանդիպակառվը։*


ՕՐ *շառաւիղն ունեցող բոլորակին մակերեսը հաւասար է* π×ՕՐ² *արտադրելոյն. բայց* π×ՕՐ²:π×ԳԱ²::ՕՐ²:ԳԱ². *ուրեմն բոլորներուն մակերեսներն իրարու պէս կը հանդիպին ինչպէս անոնց շառաւիղներուն քառակուսիները, ինչպէս նախընթաց նախադասութեան մէջ ապացուցած է։*

Պար. Բոլորակը քառակուսելու խնդիրը՝ ծանօթ տրամագիծ մը ունեցող բոլորակին հաւասար քառակուսին գտնելն է (Գիրք Գ. Խնդ. Թ. Պար.)։ Արդէն ապացուցուեցաւ թէ բոլորակի մը մակերեսը հաւասար է անոր շրջանակին, բազմապատկեալ անոր շառաւիղին կիսովը. Նաեւ այս արտադրելոյն կամ ուղղանկեան համարժէք եղող քառակուսւոյն մէկ կողմը հաւասար է ուղղանկեան երկայնութեան ու լայնութեան միջին համեմատականին (Գիրք Գ. Խնդ. Գ. եւ Թ. Պար.). ուրեմն բոլորակը քառակուսելու խնդիրը ծանօթ տրամագիծ մը ունեցող բոլորակին շրջանակը գտնելն է. այսինքն բոլորակին շառաւիղը տրամագիծը ունեցած ընդհանուր համեմատականը։ Մինչեւ հիմա այս համեմատականը միայն մերձաւորապէս որոշուած է։ Արքիմիդէս ցուցուց թէ այս համեմատականը $3\frac{10}{70}$ եւ $3\frac{10}{71}$ թիւերուն մէջտեղն է. Մետիոս ցուցուց թէ $\frac{355}{113}$ ին մօտ է, բայց ուրիշներ ապացուցած են թէ անոր արժէքն է 3,14159265358991932+ եւայլն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ԽՆԴԻՐ

Բոլորակի մը ըն ներքը և ըն դուրքը ջնուած էբարո նման կանոնաւոր բազմանկեանց մակերեսները ջիմնալով, այն բազմանկեանց կրկնապատկին վրայ կողմ ունեցող ըն ներքը և ըն դուրքը ջնուած կանոնաւոր բազմանկեանց մակերեսները ջիմնել։

Թող Ա.Բ ցուցընէ ներքը գծուած ծանօթ բազմանկեան մէկ կողմը, եւ անոր զուգահեռական եղող ՆՖ՝ դուրքը գծուածինն մէկ կողմը։ ԱՄ լարը եւ Ա.փ ու ԲՊ չօշափողները քաշէ. Ա.Մ՝ ներքը գծուած, եւ Ա.փ+փՄ, կամ փՊ՝ դուրքը գծուած ծանօթ բազմանկեանց կրկնապատկին չափ կողմ ունեցող բազմանկեանց կողմերն են։ Թող Ա ցուցընէ ներքը գծուած ծանօթ բազմանկեան մակերեսը, եւ Բ՝ դուրքը գծուածինը. նաեւ թող Ա՛ եւ Բ՛ ցուցընեն ծանօթ բազմանկեանց կրկնապատկին չափ կողմ ունեցող թէ ներքը եւ թէ դուրքը գծուածներուն մակերեսները։ Ա եւ Բ դիտնալով, Ա՛ եւ Բ՛ գտնելու ենք։



Նախ. եթէ Գ՝ բոլորակին կեդրոնն է, յայտնի է թէ Ա եւ Ա՛ մակերեսները իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս ԳԱԴ եւ ԳԱՄ եռանկիւնները. այսինքն՝ Ա:Ա՛ :: ԳԴ:ԳՄ։. դարձեալ, Ա՛ եւ Բ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս ԳԱՄ եւ ԳԵՄ եռանկիւնները։ այսինքն Ա՛:Բ::ԳԱ:ԳԵ։ Բայց, որովհետեւ ԱԴ եւ ԵՄ զուգահեռական են, ԳԴ:ԳՄ::ԳԱ:ԳԵ. ուստի Ա:Ա՛ :: Ա՛:Բ. ուրեմն $Ա'^2 = Ա \times Բ$, կամ $Ա' = \sqrt{Ա \times Բ}$։

Երկրորդ. Որովհետեւ ԳՓՄ եւ ԳՓԵ եռանկիւնները նոյն բարձրութիւնն ունին, ԳՄ, ԳՓՄ:ԳՓԵ::ՓՄ:ՓԵ. բայց, որովհետեւ ԳՓ գիծը ԵԳՄ անկիւնը երկու հա-

ւասար մասանց կը բաժնէ, ՓՄ:ՓԵ::ԳՄ:ԳԵ (Գիրք Դ. Նախ. ԺԵ)::ԳԴ:ԳԱ::Ա:Ա՛. ուստի ԳՓՄ:ԳՓՄ+ԳՓԵ կամ ԳՄԵ:Ա:Ա+Ա՛։ Բայց ԳՄՓԱ կամ 2ԳՄՓ:ԳՄԵ::Բ՛:Բ. ուստի Բ՛:Բ::2Ա:Ա+Ա՛, եւ $Բ' = \frac{2Ա \times Բ}{Ա+Ա'}$։

Ա՛ ին արժէքը արդէն գտած ենք, ուրեմն Ա եւ Բ գիտնալով դիւրին է Ա՛ եւ Բ՛ մակերեսները գտնել։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ԽՆԴԻՐ

Ա՛ն բոլորակին մակերեսը գտնել, որուն շառաւիղը 1 է։

Եթէ բոլորակին շառաւիղը 1 է, ներքը գծուած քառակուսւոյն մէկ կողմը $\sqrt{2}$ (Նախ. Գ. Պար.), եւ դուրքը գծուածինը՝ 2 կ'ըլլայ. ուստի ներքը գծուածին մակերեսը՝ 2, եւ դուրքը գծուածինը՝ 4 կ'ըլլայ։ Եթէ նախընթաց նախադասութեան մէջ Ա ին արժէքը՝ 2, եւ Բ ին արժէքը 4 համարինք, կրնանք Ա՛ ին եւ Բ՛ ին, այսինքն թէ ներքը եւ թէ դուրքը գծուած ութանկեանց մակերեսները գտնել, եւ յետոյ 16,32,64 եւայլն, կողմ ունեցող բազմանկեանց մակերեսները։ Վարի ցուցակը կը պարունակէ այս արժէքները։

Թիւ կողմանց	Ներքի բազմանկեան մակերեսը։	Դուրքի բազմանկեան մակերեսը։
4	2,0000000	4,0000000
8	2,8284271	3,3137085
16	3,0614674	3,1825979
32	3,1214451	3,1517249
64	3,1365485	3,1441184
128	3,1403311	3,1422236
256	3,1412772	3,1417504
512	3,1415138	3,1416321
1024	3,1415729	3,1416025
2048	3,1415877	3,1415951
4096	3,1415914	3,1415933

8192 . . .	3,1415923 . . .	3,1415928
16384 . . .	3,1415925 . . .	3,1415927
32768 . . .	3,1415926 . . .	3,1415926

Որովհետեւ բոլորակին մակերեսը թէ՛ ներսը եւ թէ՛ դուրսը գծուած բազմանկեանց մակերեսներուն միջեւերն է, կը հետեւցընենք թէ անոր արժէքը հաւասար է 3,1415926+ *ին։*

Հետ. Որովհետեւ բոլորակի մը մակերեսը հաւասար է անոր չրջանակին կիսոյն, բազմապատկեալ անոր շառաւիղովը, յայտնի է թէ երբ շառաւիղը 1 *է, չրջանակին կէսն է* 3,1415926+. *եւ երբ տրամագիծը* 1 *է, ամբողջ չրջանակն է* 3,1415926+. *ուրեմն ֆ ին արժէքն (նախ. ժբ. հետ. 2) է* 3,1415926+, *կամ գրեթէ* 3,1416։

ԳԻՐՔ Զ.

ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ ԵՒ ՄԱՐՄՆՈՑ ԱՆԿԻՒՆՆԵՐ


Սահմանք։

1. *Գիծ մը մակերեսի մը ուղղահայեաց է, երբ ուղղահայեաց է մակարդակին ամէն մէկ գծին որ անոր ոտքէն կ'անցնի։ Հակադարձաբար, մակարդակը այն գծին ուղղահայեաց է։ Ուղղահայեացին ոտքը այն կէտն է ուր ուղղահայեացը մակարդակին կը դպչի։*

2. *Գիծ մը մակերեսի մը զուգահեռական է, երբ մակարդակին չի հանդիպիր, որչափ որ երկարի մէկ կամ միւս կողմը։ Հակադարձաբար, մակարդակը այն գծին զուգահեռական է։*

3. *Երկու մակերեսք իրարու զուգահեռական են, երբ իրարու չեն հանդիպիր, որչափ որ երկարին։*

4. *Երբ երկու մակարդակ իրար կը կտրեն, անոնց հատումը կամ բացուածքը մակարդակներուն անկեանը կը կոչուին։ Մակարդակները՝ անկեան եզեռները, եւ անոնց հատման հատարակաց գիծը անկեան ծայրը կը կոչուի։ Այս անկիւնը չափելու համար, անկեան ծայրին որեւէ մէկ կէտէն, երկու երեսներուն վրայ՝ ծայրին ուղղահայեաց մէյմէկ գիծ քաշէ. այս երկու գծերուն անկիւնը մակարդակներուն անկեան չափն է, եւ կրնայ սուր, ուղիղ կամ բութ ըլլալ։ Երբ երկու մակարդակներուն անկիւնը ուղիղ է, անոնք իրարու ուղղահայեաց են։*



5. *Երբ քանի մը մակարդակ հատատակաց կէտի մը վրայ իրար կը կըտրեն, անոնց միջեւեղած անկիւնատուր միջոցը մարմնոյ անկեան կը կոչուի։ Զորօրինակ, Ս մարմնոյ անկիւնը՝ ԱՍԲ, ԲՍԳ, ԳՍԴ եւ ԴՍԱ մակարդակներուն իրար կտրելովը կազմուած է։ Ս կէտը մարմնոյ անկեան գագաթն է։*

Գոնէ երեք մակարդակ պէտք է մարմնոյ անկիւն մը կազմելու։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Գէթ մը չէ կրնար ըսո՞ւ մարդ մակրդակէ մը վրայ՝ և ըսո՞ւ մարդ անկէ դո՞ւրս ըլլալ։

Քանզի, երբ գիծ մը ըստ մասին մակարդակի մը վրայ է, գիծը եւ մակարդակը գոնէ երկու հասարակայ կէտ ունին. ուրեմն ամբողջ գիծը մակարդակին վրայ է (Դիրք Ա. Սահ. 6)։

Պոբ. Երբ կ'ուզենք գիտնալ թէ մակերեւոյթ մը մակարդակ է թէ ոչ, անոր երեսին վրայ ուղիղ գիծ մը դնելու ենք այլեւայլ ուղղութեամբ. եթէ գիծը ծայրէ ծայր երեսը կը չօշափէ, մակերեւոյթը մակարդակ է։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու՝ էջեր կորոշ ծռելը մակրդակի մը դէրքը կ'որոշէ։



Եթէ ԱԲ եւ ԱԳ գծերը Ա կէտին վրայ իրար կը կտրեն, մակարդակի մը դիրքը կ'որոշեն։ Քանզի կրնանք մակարդակ մը ըմբռնել որուն վրայ ԱԲ գիծը գծուած է. եթէ այն մակարդակը ԱԲ ի վրայ, իբրեւ առանցքի վրայ, դարձընենք մինչեւ որ Գ կէտը անոր վրայ գանուի, ԱԳ ամբողջ գիծը այն մակարդակին վրայ պիտի ըլլայ (Դիրք Ա. Սահ. 6). նաեւ, եթէ մակարդակը որեւէ ուրիշ դիրքի մէջ ըլլայ, ԱԲ եւ ԱԳ գծերը անոր վրայ չեն կրնար իյնալ. ուրեմն այս երկու գծերը մակարդակին դիրքը կ'որոշեն։


Հետ. 1. Եռանկիւն մը, կամ միեւնոյն գծի վրայ չեղող երեք կէտեր մակարդակի մը դիրքը կ'որոշեն։



Հետ. 2. Երկու զուգահեռական գծեր, ինչպէս ԱԲ եւ ԳԴ, մակարդակի մը դիրքը կ'որոշեն։ Քանզի, եթէ եՑ գիծը քաշուի, յայտնի է թէ ԱԲ եւ եՑ գծերուն մակարդակը՝ ԱԲ եւ ԳԴ գծերուն մակարդակն է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Երբ երկու՝ մակարդակ իրար կը կտրեն, անոնց հատման կէտերը ուղիղ գիծ մը կը կազմեն։



Եթէ ԱԲ եւ ԳԴ մակարդակները Ե եւ Ց կէտերուն վրայ իրար կը կտրեն, անոնց հատման գիծն ալ անոնց վրայ է (Դիրք Ա. Սահ. 6), եւ անոնց հատման գիծն է. նաեւ, որովհետեւ ուղիղ գիծ մը եւ անկէ դուրս եղող կէտ մը չեն կրնար երկու իրարմէ տարբեր մակարդակաց վրայ իյնալ, յայտնի է թէ ԱԲ եւ ԳԴ մակարդակները եՑ ուղիղ գծէն դուրս հատարակաց կէտ չունին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ էջէ մը երկու ուղիղ էջերու ուղղահայեաց է՝ անոնց իրար կորած տեղը, ուղիղէն էջէ մը երկու էջերուն մակարդակին ալ ուղղահայեաց է։



Եթէ Ա*փ ուղղահայեաց է* Մ*Ն մակարդակին վրայ եղող* Բ*Բ*, Գ*Գ* *գծերուն, ուղղահայեաց է* փ *կէտէն անցնող որեւէ գծի մը որ մակարդակին վրայ է։ այսինքն, մակարդակին ուղղահայեաց է* (Սահ. 1)։

Մ*Ն մակարդակին վրայ* փ *կէտէն որեւէ գիծ մը քաշէ, ինչպէս* փ*Պ, եւ այս գծին որեւէ մէկ կէտէն, ինչպէս* Պ*, Բ*Պ*Գ գիծը այնպէս քաշէ որ* Բ*Պ հաւասար ըլլայ* Պ*Գ ին* (Գիրք Դ. Խնդ. ե.)։ Նաեւ Ա*Բ*, Ա*Պ* *եւ* Ա*Գ քաշէ։*

Որովհետեւ փ*Բ*Գ *եռանկեան մէջ* Բ*Պ*=*Պ*Գ*,*

փ*Գ*²+փ*Բ*²=2փ*Պ*²+2*Պ*Գ*²։

նաեւ Ա*Գ*²+Ա*Բ*²=2Ա*Պ*²+2*Պ*Գ*² (Գիրք Դ. Նախ. ԺԴ.)։

Առաջին հաւասարութիւնը երկրորդէն հանելով, եւ դիտելով թէ, որովհետեւ Ա*փ*Գ *եւ* Ա*փ*Բ *ուղղանկիւն եռանկիւններ են,* Ա*Գ*²—փ*Գ*²=Ա*փ*², *եւ* Ա*Բ*²—փ*Բ*²=Ա*փ*²,

կ'ունենանք Ա*փ*²+Ա*փ*²=2Ա*Պ*²—2փ*Պ*²,

կամ Ա*փ*²=Ա*Պ*²—փ*Պ*², *կամ* Ա*Պ*²=Ա*փ*²+փ*Պ*²։

ուրեմն Ա*փ*Պ *անկիւնը ուղիղ է, եւ* Ա*փ գիծը ուղղահայեաց է* փ*Պ գծին։*

Պոր. *Յայտնի է թէ առաջին սահմանը* (երես 147) *ուղիղ է, քանզի, երբ գիծ մը ուղղահայեաց է մակարդակի մը, ուղղահայեաց է նաեւ իր ոտքէն անցնող բոլոր գծերուն որ մակարդակին վրայ են։*

Հեր. 1. Ա*փ ուղղահայեացը կարճ է որեւէ խոտորնակ գիծէ մը, ինչպէս* Ա*Պ։*

Հեր. 2. *Մակարդակի մը որեւէ մէկ կէտէն մակարդակին ուղղահայեաց միայն մէկ գիծ կրնայ քաշուիլ. քանզի եթէ երկու հնար ըլլային, անոնց մակարդակը միւս մակարդակը պիտի կտրէր ուղիղ գծի մը վրայ, ինչպէս* փ*Պ. եւ անտեն այս երկու ուղղահայեաց գծերը* փ*Պ ին ուղղահայեաց պիտի ըլլային միեւնոյն կէտին վրայ. բայց ասիկա անկարելի է* (Գիրք Ա. Նախ. ԺԴ. Պար.)։ *ուրեմն միայն մէկ ուղղահայեաց կրնայ քաշուիլ։*


Հեր. 3. Նաեւ *մակարդակէ մը դուրս եղող որեւէ կէտէ մը մակարդակին ուղղահայեաց միայն մէկ գիծ կրնայ քաշուիլ. քանզի եթէ երկու հնար ըլլային, ինչպէս* Ա*փ եւ* Ա*Պ, Ա*փ*Պ *եռանկեան մէջ երկու անկիւն Ա*փ*Պ եւ Ա*Պ*փ ուղիղ պիտի ըլլային։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկ հակադրակէ մը դուրս եղող կէտէ մը հակադրակէն ուղղահայեաց գիծ մը տալով, և խոտորնակ գիծեր հակադրակէն այլեւայլ կէտերուն,

Նախ, այն խոտորնակ գիծերը, որոնք ուղղահայեացին ոտքէն հաւասարապէս հեռու եղող կէտերու վրայ հակադրակէն կը դպչին, իրարու հաւասար են։

Երկրորդ, երկու խոտորնակ գիծերուն՝ այն ոտքէն հեռու եղող կէտին վրայ դպչողը երկայն է։



Մ*Ն մակարդակին ուղղահայեաց* Ա*փ գիծը քաշէ. եւ անոր* փ *ոտքէն հաւասարապէս հեռու եղող* Բ, Գ *եւ* Դ *կէտերուն՝* Ա*Բ*, Ա*Գ եւ* Ա*Դ խոտորնակ գծերը. նաեւ* Բ *կէտին հեռաւորութենէն աւելի հեռու եղող* Ե *կէտին՝* Ա*Ե գիծը քաշէ։*

Նախ. Ա*Բ*, Ա*Գ եւ* Ա*Դ իրարու հաւասար են, քանզի, որովհետեւ* Ա*փ*Բ, Ա*փ*Գ *եւ* Ա*փ*Դ *անկիւնները ուղիղ են, եւ* փ*Բ*, փ*Գ եւ* փ*Դ՝ իրարու հաւասար, այս երեք եռանկիւններն իրարու հաւասար են. ուրեմն* Ա*Բ*, Ա*Գ եւ* Ա*Դ իրարու հաւասար են։*


Երկրորդ. Ա*Ե*>Ա*Բ, քանզի, որովհետեւ* փ*Ե*>փ*Բ*, Ա*Ե խոտորնակ գիծը մեծ է* Ա*Բ խոտորնակ գծէն* (Գիրք Ա. Նախ. ԺԵ.)։

Հէպ. Մն *մակարդակէն դուրս եղող կէտէ մը լինչպէս* Ա, *մակարդակին ուղղահայեաց գիծ մը քաշելու համար, մակարդակին վրայ* Ա *կէտէն հաւասարապէս հեռու եղող երեք կէտեր գտիր, լինչպէս* Բ, Գ *եւ* Դ, *եւ այն կէտերուն վրայէն չրջանակ մը քաշէ. այս չրջանակին կեդրոնը,* Փ, *քաշուելու ուղղահայեացին ոտքն է։*

Պռ. Աբփ *անկիւնը* Աբ *խոտորնակ գծին դէպի Մն մակարդակը ունեցած հակումը կը կոչուի։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եթէ մակարդակի մը ուղղահայեաց եղող գիծ մը ոչէն գիծ մը հատնի մակարդակին ոչեւ ներկայ գիծին ուղղահայեաց, և ոչիչ գիծ մը՝ հատման կէտէն դնելէ ուղղահայեացին ոչեւ ներկայ գիծին, այս վերջին գիծն ալ ուղղահայեաց պիտի ըլլայ մակարդակին գիծին։




Եթէ Ափ *ուղղահայեաց է Մն մակարդակին, և փ՝ Բգ գծին, Ա՛ ալ ուղղահայեաց է Բգ գծին։*

Բգ կարէ Դգ ին հաւասար, եւ փբ, փգ, Աբ եւ Ա՛գ քաշէ։ Որովհետեւ Բդ=Դգ, փբ=փգ. եւ որովհետեւ փբ=փգ, Աբ=Ա՛գ (Նախ. ե.). ուստի Ա՛դ գծին երկու կէտերը, Ա՛ եւ Դ, հաւասարապէս հեռու են Բ եւ Գ կէտերէն. ուրեմն Ա՛դ գիծը ուղղահայեաց է Բգ գծին (Գիրք Ա. Նախ. ԺԶ. Հետ.)։

Հէպ. Որովհետեւ *Բգ ուղղահայեաց է Ա՛դ եւ փդ գծերուն, յայտնի է թէ ուղղահայեաց է Ափդ մակարդակին (Նախ. Դ.)։*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու ընթհեռական գծերուն մէկը մակարդակի մը ուղղահայեաց է, ջեռն ալ ուղղահայեաց է նոյն մակարդակին։



Եթէ Ափ ուղղահայեաց է Մն մակարդակին, Ափ ին հետ զուգահեռական եղող եր ալ ուղղահայեաց է նոյն մակարդակին։

Ափ եւ եր զուգահեռական գծերը մակարդակ մը կ'որոչեն որ կը կտրէ Մն մակարդակը փր գծին վրայ։ Քաշէ Ադ գիծը, նաեւ Մն մակարդակին վրայ՝ Բգ գիծը փր ին ուղղահայեաց։ Որովհետեւ Բդ ուղղահայեաց է Ափր ին մակարդակին (Նախ. Զ. Հետ.), Բդ ին անկիւնը ուղիղ է. եւ որովհետեւ Ափ ուղղահայեաց է փր գծին, Ափ ին հետ զուգահեռական եղող եր ալ ուղղահայեաց է նոյն գծին (Գիրք Ա. Նախ. Ի. Հետ. 1). ուստի եր գիծը ուղղահայեաց է փդ եւ Բդ գծերուն. ուրեմն ուղղահայեաց է անոնց մակարդակին, Մն (Նախ. Դ.)։


Հէպ. 1. Հակադարձաբար, եթէ Ափ եւ եր գծերը Մն մակարդակին ուղղահայեաց են, իրարու զուգահեռական են։ Բանդի, եթէ զուգահեռական չեն, Դ կէտէն գիծ մը քաշէ Ափ գծին զուգահեռական. այս գիծը ուղղահայեաց է Մն մակարդակին. բայց ենթադրութեամբ եր ուղղահայեաց է նոյն մակարդակին. ուրեմն՝ որովհետեւ երկու չեն կրնար ըլլալ (Նախ. Դ. Հետ. 2), յայտնի է թէ եր գիծը Ափ գծին զուգահեռական է։

Հէպ. 2. Եթէ նոյն մակարդակին վրայ եղող երկու գծեր ուրիշ մակարդակի մը վրայ եղող գծի մը զուգահեռական են, այն երկու գծերը իրարու զուգա-

հեռական են : Քանզի , եթէ մակարդակ մը գծուի այս երրորդ գծին ուղղահայեաց , ուղղահայեաց պիտի ըլլայ նաեւ միւս երկու գծերուն . ուրեմն անոնք իրարու զուգահեռական են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երեք մը մակարդակէ մը ձեւ երեքն ալ ուղիղ են , ուղիղ է նաեւ մակարդակին :




Եթէ ԱԲ գիծը զուգահեռական է ՄՆ մակարդակին վրայ եղող ԳԴ գծին , զուգահեռական է այն մակարդակին : Քանզի ԱԲ գիծը ԱԲԳԴ մակարդակին վրայ է , նաեւ այն եւ ՄՆ մակարդակները իրար կը կտրեն ԳԴ գծին վրայ : Ուստի ԱԲ գիծը , եթէ կրնար ՄՆ մակարդակին դպչիլ , կամ ԳԴ գծին , կամ անոր չարունակութեանը վրայ պիտի դպչէր . բայց ԱԲ եւ ԳԴ զուգահեռական ըլլալով չեն կրնար իրարու դպչիլ . ուրեմն ԱԲ գիծը ՄՆ մակարդակին չի կրնար դպչիլ , եւ անոր զուգահեռական է (Սահ . 2) :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երեք մակարդակները միեւնոյն գծին ուղղահայեաց են , իրարու զուգահեռական են :


Եթէ ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակները ուղղահայեաց են ԱԲ գծին , իրարու զուգահեռական են : Ենթադրենք թէ զուգահեռական չեն , եւ թէ չարունակուելով կէտի մը վրայ , ինչպէս Օ , իրար կը կտրեն : Քաշէ ՕԱ եւ ՕԲ : Ո-



րովհետեւ ԱԲ գիծը ուղղահայեաց է ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակներուն , ուղղահայեաց է ՕԱ եւ ՕԲ գծերուն (Սահ . 1) . ուստի ՕԲԱ եռանկեան մէջ երկու ուղիղ անկիւն կայ . բայց ասիկա անկարելի է (Գիրք Ա . Նախ . Իե . Հետ . 3) . ուրեմն ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակները իրար չեն կրնար կտրել , եւ զուգահեռական են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Երբ մակարդակ մը երկու իրարու զուգահեռական մակարդակները կը կտրէ , հատման գծերը զուգահեռական են :



Եթէ ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակները զուգահեռական են, եւ ԵՁ մակարդակը ԵՖ եւ ԿՁ գծերուն վրայ զանոնք կը կտրէ , ԵՖ եւ ԿՁ հատման գծերը իրարու զուգահեռական են : Քանզի , եթէ զուգահեռական չեն , միեւնոյն մակարդակին վրայ ըլլալով , եթէ չարունակուին , իրարու պիտի դպչին . այսինքն ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակները իրար պիտի կտրեն . բայց այս մակարդակները զուգահեռական են եւ չեն կրնար իրարու դպչիլ . ուրեմն ԵՖ եւ ԿՁ զուգահեռական են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երեք մակարդակները իրարու զուգահեռական են , այն գիծը որ ձեւոն ուղղահայեաց է՝ ձեւոյն ալ ուղղահայեաց է :




Եթէ ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակները զուգահեռական են, ՄՆ մակարդակին ուղղահայեաց եղող ԱԲ գիծը ՓՊ մակարդակին ալ ուղղահայեաց է։

ՓՊ մակարդակին վրայ որեւէ ուղղութեամբ ԲԳ քաշէ, եւ ԲԳ ու ԱԲ գծերուն վրայէն միօգդ մակարդակ մը անցուր որ կտրէ ՄՆ մակարդակը ԱԴ գծին վրայ։ ԱԴ զուգահեռական է ԲԳ գծին (Նախ. ԺԱ.). ուստի ԱԲ գիծը, որ ԱԴ ին ուղղահայեաց է, ուղղահայեաց է ԲԳ գծին (Գիրք Ա. Նախ. Ի. Հետ. 1). ուրեմն ուղղահայեաց է ՓՊ մակարդակին (Սահ. 1)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու զուգահեռական մակերպոյթները երկու զուգահեռական գծեր կը կտրեն, գծերուն այն մասերը, որ մակերպոյթներուն ներքեւ կ'իյնան, իրարու հաւասար են։



Եթէ ՄՆ եւ ՓՊ զուգահեռական մակարդակները կտրեն Կ, Ե, Հ եւ Ֆ կէտերուն վրայ, կտրեն հաւասար է ՀՖ գծին։


Քաշէ ԵՖ եւ ԿՀ գծերը։ Այս գծից վրայ կեցիր մակարդակը՝ ՄՆ եւ ՓՊ մակարդակները կը կտրէ. ուստի ԿՀ եւ ԵՖ զուգահեռական են. բայց ենթադրութեամբ կտրեն ՀՖ զուգահեռական են. ուրեմն ԿԵՀՖ զուգահեռագիծ է, եւ կտրեն հաւասար է ՀՖին։

ՀԵՒ. Կը հետեւի թէ երկու զուգահեռական մակերպոյթներ ամէն տեղ իրարմէ հաւասարաչափ հեռու են. քանզի, եթէ երկու զուգահեռական գծերու մէկը այն

մակարդակներուն ուղղահայեաց է, միւսն ալ ուղղահայեաց է (Նախ. Է.). եւ, որովհետեւ այս գծերը իրարու հաւասար են, մակարդակները իրարմէ հաւասարաչափ հեռու են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ նոյն մակերպոյթին վրայ չեղող երկու անկեանց կողերը զուգահեռական են, և նոյն ուղղութիւնը ունին, այն անկիւնները իրարու հաւասար են, և անոնց մակերպոյթները զուգահեռական են։



Եթէ ԳԱ եւ ԴԲ՝ նաեւ ԱԵ եւ ԲՖ զուգահեռական են,

Նախ. ԳԱԵ հաւասար է ԴԲՖ անկեան։

Կտրէ ԱԳ գիծը ԲԴին հաւասար, նաեւ ԱԵ՝ ԲՖ ին հաւասար, եւ ԳԵ, ԴՖ, ԱԲ, ԳԴ եւ ԵՖ գծերը քաշէ։

Որովհետեւ ԱԳ եւ ԲԴ իրարու զուգահեռական ու հաւասար են, ԱԲԴԳ զուգահեռագիծ է. ուստի ԳԴ եւ ԱԲ զուգահեռական ու հաւասար են։ Նաեւ, որովհետեւ ԱԲՖԵ զուգահեռագիծ է, ԵՖ եւ ԱԲ զուգահեռական ու հաւասար են. ուստի ԳԴ եւ ԵՖ զուգահեռական ու հաւասար են (Նախ. Է. Հետ. 2). ուստի ԳԵՖԴ զուգահեռագիծ է, եւ ԳԵ ու ԴՖ իրարու զուգահեռական եւ հաւասար են. ուրեմն ԱԳԵ եւ ԲԴՖ եռանկիւնները հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. ԺԴ.), եւ ԳԱԵ հաւասար է ԴԲՖ անկեան։


Երէսպէտ. ԱԳԵ եւ ԲԴՖ մակարդակները զուգահեռական են։ Գանզի, եթէ այն մակարդակը, որ ԲԴՖ

մակարդակին զուգահեռական է, եւ Ա կէտին վրայէն կ'անցնի, ԴԳ եւ ՖԵ գծերը կը կտրեր ոչ Գ եւ Ե՝ այլ ուրիշ կէտերու վրայ, ինչպէս կ եւ Հ, Գկ եւ ՖՀ հաւասար կ'ըլլային ԱԲ գծին (նախ. ԺԲ.). քայց ԴԳ եւ ՖԵ հաւասար են ԱԲ ին. ուրեմն ԱԳԵ եւ ԲԴՖ մակարդակները զուգահեռական են։

Հետ. Երբ երկու զուգահեռական մակարդակներ, ինչպէս ՄՆ եւ ՓՊ, ուրիշ երկու մակարդակներ կը կտրեն, ինչպէս ԳԱՐԴ եւ ԵԱԲՖ, անոնց հատման գծերուն անկիւնները, ԳԱԵ եւ ԴԲՖ, իրարու հաւասար են. քանզի ԱԳ եւ ԲԴ զուգահեռական են, նաեւ ԱԵ եւ ԲՖ գծերը (նախ. Ժ.). ուրեմն ԳԱԵ հաւասար է ԴԲՖ անկեան (Դիրք Ա. նախ. ԻԴ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ նոյն մակարդակէն վրայ չընդհատուած գծեր իրարու զուգահեռական և հաւասար են, անոնց ծայրերը միացնող գծերը երկու եռանկիւն կը յետագծենին որոնք իրարու հաւասար են, և որոնց մակարդակները իրարու զուգահեռական են։




Եթէ ԱԲ, ԳԴ եւ ԵՖ գծերը իրարու հաւասար են, ԱԳԵ եւ ԲԴՖ եռանկիւնները իրարու հաւասար են, եւ անոնց մակարդակները՝ իրարու զուգահեռական։

Որովհետեւ ԱԲ, ԳԴ եւ ԵՖ իրարու հաւասար եւ զուգահեռական են, ԱԲԴԳ, ԱԲՖԵ եւ ԳԴՖԵ զուգահեռագիծ են. ուստի ԱԳ եւ ԲԴ իրարու հաւասար եւ զուգահեռական են, նաեւ ԴՖ

ու ԳԵ, եւ ԲՖ ու ԱԵ. ուրեմն ԱԳԵ եւ ԲԴՖ եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Դիրք Ա. Նախ. ԺԴ.). նաեւ անոնց մակարդակները իրարու զուգահեռական են (Նախ. ԺԳ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երեք զուգահեռական մակարդակ երկու գիծ կը կտրեն, այդ գիծերուն հատուածները իրարու համեմատական են։



Եթէ ԱԲ եւ ԳԴ կտրող ՄՆ, ՓՊ եւ ՐՍ մակարդակները իրարու զուգահեռական են,

ԱԵ : ԵԲ :: ԳՖ : ՖԴ։


ԱԴ, եւ ՓՊ մակարդակին վրայ ԵԿ եւ ԿՖ գծերը քաշէ, նաեւ ԱԴ եւ ԲԴ գծերը։ ԵԿ եւ ԲԴ զուգահեռական են (Նախ. ԺԴ.). ուստի ԱԵ : ԵԲ :: ԱԿ : ԿԴ. նաեւ ԱԴ եւ ԿՖ զուգահեռական են,

եւ ԱԿ : ԿԴ :: ԳՖ : ՖԴ.

ուրեմն ԱԵ : ԵԲ :: ԳՖ : ՖԴ (Դիրք Բ. Նախ. Դ. Հետ.)։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԶ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ գիծ մը ուրիշ մակարդակի մը ուղղահայեաց է, այդ մակարդակն ուղղահայեաց է նաեւ առաջին մակարդակ ուր այդ գիծին վրայէն կ'անցնի։




Եթէ ԱՓ գիծը ուղղահայեաց է ՄՆ մակարդակին, ԱՓ գծին վրայէն անցնող որեւէ մակարդակ, ինչպէս ԱԲ, նոյն մակարդակին ուղղահայեաց է։

ՄՆ մակարդակին վրայ դիր քաչէ՝ ՄՆ եւ ԱԲ մակարդակներուն հատման ԲԳ գծին ուղղահայեաց. որովհետեւ ԱՓ ուղղահայեաց է ՄՆ մակարդակին, ուղղահայեաց է ԲԳ եւ դիր գծերուն (Սահ. 1). բայց ԱՓԴ անկիւնը ՄՆ եւ ՄԲ մակարդակներուն անկիւնն է (Սահ. 4), եւ, որովհետեւ այս անկիւնը ուղիղ է, մակարդակներն իրարու ուղղահայեաց են։

Պոր. Երբ երեք գծեր, ինչպէս ԱՓ, ԲՓ եւ ԴՓ, իրարու ուղղահայեաց են, անոնց որոշած մակարդակներուն որեւէ մէկը, ինչպէս ԱԲ, միւս երկուքին ուղղահայեաց է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԷ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու մակարդակներ իրարու ուղղահայեաց են, այն գիծը, որ մէկուն վրայ հարման գծին ուղղահայեաց տարուած է, միւս մակարդակին ուղղահայեաց է։




Եթէ ԱԲ մակարդակը ուղղահայեաց է ՄՆ մակարդակին, եւ ԱՓ գիծը անոնց հատման ԲԳ գծին ուղղահայեաց է, ԱՓ ուղղահայեաց է ՄՆ մակարդակին։

ՄՆ մակարդակին վրայ քաչէ ԴՓ գիծը ԲՓ գծին ուղղահայեաց. որովհետեւ մակարդակները իրարու ուղղահայեաց են, ԱՓԴ անկիւնը ուղիղ է. ուստի ԱՓ գիծը ՓԲ եւ ՓԴ գծերուն ուղղահայեաց է. ուրեմն ՄՆ մակարդակին ուղղահայեաց է (Նախ. Դ.)։

Հետ. Երբ ԱԲ մակարդակը ուղղահայեաց է ՄՆ մակարդակին, եթէ անոնց հատման գծին որեւէ մէկ կէտէն, ինչպէս Փ, ՄՆ մակարդակին ուղղահայեաց գիծ մը քաչուի, ինչպէս ՓԱ, այն գիծը՝ ԱԲ մակարդակին վրայ պիտի ըլլայ. քանզի, եթէ այն մակարդակին վրայ չէ, այն մակարդակին վրայ Փ կէտէն ՓԲ հատման գծին ուղղահայեաց գիծ մը քաչէ. այս գիծը ՄՆ մակարդակին ուղղահայեաց է. ուստի Փ կէտէն ՄՆ մակարդակին ուղղահայեաց երկու գիծ քաչուած կ'ըլլան. բայց ասիկա անկարելի է (Նախ. Դ. Հետ. 2). ուրեմն ՓԱ ուղղահայեացը ԱԲ մակարդակին վրայ է։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երեք մակերեսներ միմեանց անկիւն մը կը կազմեն, անոնց որեւէ երկուքին գումարը երրորդէն մեծ է։



Եթէ Ս մարմնոյ անկիւնը կազմող մակարդակի անկեանց մեծը՝ ԱՍԲ անկիւնն է, ապացուցուելու է թէ ԱՍԲ<ԱՍԳ+ԲՍԳ։


ԱՍԲ մակարդակին վրայ ՍԴ գիծը քաչէ՝ ԲՍԴ անկիւնը ԲՍԳ անկեան հաւասար ընելով, եւ որեւէ ուղղութեամբ ԱԴԲ քաչէ. նաեւ ՍԳ կտրէ ՍԴ գծին հաւասար, եւ ԱԳ ու ԳԲ քաչէ։

ԲՍԴ եւ ԲՍԳ եռանկիւնները իրարու հաւասար են. քանզի անոնց մէկուն ԲՍ եւ ՍԴ կողմերը հաւասար են միւսին ԲՍ եւ ՍԳ կողմերուն. նաեւ ԲՍԴ անկիւնը հաւասար է ԲՍԳ անկեան. ուստի ԲԳ=ԲԳ։ Բայց ԱԲԳ եռանկեան մէջ ԱԲ<ԱԳ+ԲԳ. ասոր մէկ անդամին

հանելով ԲԴ, եւ միւսէն՝ ԲԴ ին հաւասար եղող ԲԳ, կ՚ունենանք ԱԴ<ԱԳ։ ԱՍԴ եռանկեան ԱՍ եւ ՍԴ կողմերը հաւասար են ԱՍԳ եռանկեան ԱՍ եւ ՍԳ կողմերուն. բայց ԱԴ<ԱԳ. ուստի ԱՍԴ<ԱՍԳ (Գիրք Ա. Նախ. Թ. Պար.). եւ գումարելով ԲՍԴ=ԲՍԳ, կ՚ունենանք ԱՍԴ+ԲՍԴ կամ ԱՍԲ<ԱՍԳ+ԲՍԳ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ի. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Որե՛ւէ յարթնոյ անկիւն կազմող յակաբդակի անկեանց ջոյլը ընդ ո՛րեղ անկիւննէրէ ջոյլ է։



Ս մարմնոյ անկիւնն կազմող մակարդակները կարէ որեւէ մակարդակով, ինչպէս ԱԲԳԴԵ, եւ անոր մէկ կէտէն, Օ, քաշէ ՕԱ, ՕԲ, ՕԳ եւայլն գծերը, այնքան եռանկիւն գծելով որքան կը կազմեն Ս մարմնոյ անկիւնը։ Որովհետեւ ամէն եռանկեան անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկիւններու, յայտնի է թէ Ս գագաթը ունեցող եռանկեանց բոլոր անկիւններուն գումարը հաւասար է Օ գագաթը ունեցող եռանկեանց բոլոր անկիւններուն գումարին։ Բայց ԱԲՍ+ՍԲԳ>ԱԲՕ +ՕԲԳ կամ ԱԲԳ անկեան (Նախ. ԻԹ.). նաեւ ՍԳԲ+ ՍԳԴ>ԲԳԴ. այսինքն ՍԲԱ+ՍԲԳ+ՍԳԲ+ՍԳԴ եւայլն >ՕԲԱ+ՕԲԳ+ՕԳԲ+ՕԳԴ եւայլն. ուստի ԱՕԲ+ԲՕԳ եւայլն անկեանց գումարը մեծ է ԱՍԲ+ԲՍԳ եւայլն անկեանց գումարէն. բայց առաջին գումարը հաւասար է չորս ուղիղ անկեան (Գիրք Ա. Նախ. Դ. Պար.). ուրեմն ԱՍԲ+ԲՍԳ եւայլն անկեանց գումարը փոքր է քան չորս ուղիղ անկիւն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԻԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու յարթնոյ անկիւնք երեք հաւասար անկիւններէ կազմուածք են, և մէկու առաջին յակաբդակի անկիւնը հաւասար է միւսին առաջին յակաբդակի անկիւնը հաւասար է միւսին առաջին անկեան, երկրորդը երկրորդին եւայլն, հաւասար յակաբդակի անկիւնոց երեսները երբոս միւնոյն հակառակ ուղիղ են։



Եթէ ԱՍԳ=ԴԹՖ անկեան, ԱՍԲ=ԴԹԵ անկեան, եւ ԲՍԳ=ԵԹՖ անկեան, ԱՍԳ եւ ԱՍԲ մակարդակաց հակումը՝ ԴԹՖ եւ ԴԹԵ մակարդակաց հակման հաւասար է։

ՍԲ գծին որեւէ մէկ կէտէն, ինչպէս Բ, ԱՍԳ մակարդակին ուղղահայեաց ԲՕ գիծը քաշէ. այն գծին ոտքէն, Օ, ՍԱ եւ ՍԳ գծերուն ուղղահայեաց ՕԱ եւ ՕԳ քաշէ. նաեւ ԱԲ եւ ԲԳ քաշէ։ Ցետոյ ՍԲ գծին հաւասար ԹԵ կարէ. ԴԹՖ մակարդակին ուղղահայեաց ԵՓ քաշէ. Փ ոտքէն ԹԴ եւ ԹՖ գծերուն ուղղահայեաց ՓԴ եւ ՓՖ քաշէ. քաշէ նաեւ ԴԵ եւ ԵՖ գծերը։

ՍԱԲ եւ ԹԴԵ եռանկեանց մէջ Ա եւ Դ անկիւնները ուղիղ են (Նախ. Զ.). եւ, որովհետեւ ԱՍԲ=ԴԹԵ, ՍԲԱ=ԹԵԴ եւ ՍԲ=ԹԵ, երկու եռանկիւններն իրարու հաւասար են, ՍԱ=ԹԴ, եւ ԱԲ=ԴԵ։ Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ ՍԳ=ԹՖ, եւ ԲԳ=ԵՖ. ուստի ՍԱՕԳ հաւասար է ԹԴՓՖ քառանկեան. քանզի, եթէ մէկը միւսին վրայ դրուի այնպէս որ ԱՍԳ անկիւնը իրեն հաւասար եղող ԴԹՖ անկեան վրայ իյնայ, որովհետեւ ՍԱ=ԹԴ, եւ ՍԳ=ԹՖ, Ա կէտը՝ Դ ին վրայ, եւ Գ կէտը Ֆ ին վրայ պիտի իյնայ. նաեւ ՍԱ գծին ուղղահայեաց եղող ԱՕ պիտի իյնայ ԹԴ գծին ուղղահայեաց եղող ԴՓ ի վրայ, ՕԳ՝ ՓՖ ի վրայ, եւ Օ կէտը՝ Փ ի վրայ. ուստի ԱՕ=ԴՓ։ Բայց ԱՕԲ եւ ԴՓԵ

ուղղանկիւն եռանկեանց մէջ ԱԲ=ԴԵ, եւ ԱՕ=ԴՓ. ուստի այս եռանկիւնները իրարու հաւասար են (Գիրք Ա. Նախ. ԺԷ.). ուստի ՕԱԲ=ՓԴԵ անկեան. բայց ՕԱԲ անկիւնը ԱՍԲ եւ ԱՍԳ մակարդակաց հակումն է, եւ ՓԴԵ անկիւնը՝ ԴԹԵ ու ԴԹՓ մակարդակաց հակումը. ուրեմն այս հակումները իրարու հաւասար են:

Պաբ. 1. երբ ԲՕ ուղղահայեացը ՍԱ գծէն դուրս կ'իյնայ, ԱՍԲ եւ ԱՍԳ մակարդակաց հակումը՝ նաեւ ԴԹԵ եւ ԴԹՓ մակարդակաց հակումը, այսինքն ԲԱՕ եւ ԵԴՓ անկիւնները բթանկիւն կ'ըլլան, բայց այս պարագայիս մէջ այն հակմանց իրարու հաւասար ըլլալը վերոյիշեալ ապացուցմութեամբ կը ցուցուի:

Պաբ. 2. երբ մարմնոյ անկիւնները կազմող մակարդակի անկեանց իրարու հաւասար եղողները միեւնոյն դիրքը ունին, այն մարմնոյ անկիւնները, իրարու վրայ դրուելով զուգընթաց կ'ըլլան. քանզի ցուցուեցաւ թէ ԱՍԳՕ=ԴԹՓՓ քառանկեան. ուստի, Ո կէտը Փ ին վրայ պիտի իյնայ, եւ, որովհետեւ ՕԲ=ՓԵ, Բ կէտը՝ Ե ին վրայ, եւ Ս մարմնոյ անկիւնը Թ մարմնոյ անկեան հետ զուգընթաց կ'ըլլայ:

Պաբ. 3. երբ իրարու հաւասար եղող մակարդակի անկիւնները նոյն դիրքը չունին, թէեւ անոնց երեսները միեւնոյն հակումն ունին, մարմնոյ անկիւնները՝ իրարու վրայ դրուած աաեն, զուգընթաց չեն ըլլար. անաաեն մարմնոյ անկիւնները համաչափութեամբ հաւասար անկիւն կը կոչուին:


ԳԻՐՔ Է.

ԲԱԶՄԱՆԻՍՏՔ

Սահմանք:

1. Ամէն մարմին՝ որ մակարդակի բազմանկիւններէ սահմանեալ է, քաղմանիստ կը կոչուի: Սահմանող բազմանկիւնները՝ բազմանիստին երեսները, եւ այն գծերը՝ որոնց վրայ երեսներն իրար կը կարեն, բազմանիստին ծայրերը կը կոչուին:

2. Հասուածակողմն այն բազմանիստն է որուն երեսաց երկուքը հաւասար բազմանկիւն են, բազմանկեանց մակարդակներն ու համանուն կողմերնալ՝ զուգահեռական. նաեւ միւս երեսները զուգահեռագիծ են:



Զօրօրինակ, ԱԲԳԴԵ–Ֆ բազմանիստը հասուածակողմ է. ԱԲԳԴԵ եւ ՖԿՀԻՖ երեսները իրարու հաւասար բազմանկիւն են, որոնց համանուն կողմերը, ԱԲ ու ՖԿ, ԲԳ ու ԿՀ, եւայլն զուգահեռական են. նաեւ ԱԲԿՖ, ԲԳՀԿ եւայլն երեսները զուգահեռագիծ են:

ԱԲԳԴԵ բազմանկիւնը՝ հասուածակողման վերի խոբէսը, եւ ՖԿՀԻՖ անոր վերէի խոբէսը կը կոչուի. եւ

ԱԲԿՖ, ԲԳՀԿ եւայլն զուգահեռագծերը հատուածակողման կողմնային մակերեսոյթը կը կազմեն։

3. Հատուածակողման բարձրութիւնը այն գիծն է, որ անոր մէկ խարսխին որեւէ մէկ կէտէն միւս խարսխին մակարդակին ուղղահայեաց կը քաշուի։

4. Երբ հատուածակողման կողմերը, ինչպէս ԱԲԿՖ, ԲԳՀԿ եւայլն, անոր խարսխին ուղղահայեաց են, հատուածակողմը ո՛ղիղ կը կոչուի։

5. Հատուածակողմեր եռանկիւնի, քառանկիւնի, հնգանկիւնի, եւայլն կը կոչուին, երբ անոնց խարիսխները եռանկիւնի, քառանկիւնի, հնգանկիւնի, եւայլն։


6. Զո՛հահեռոպն այն հատուածակողմն է որուն խարիսխները զուգահեռագիծ են։

7. Ո՛ղղանկիւն զուգահեռոպ այն է որուն բոլոր երեսները ուղղանկիւնի են։

8. Խո՛րանարդ կը կոչուի այն զուգահեռոպը որուն երեսները իրարու հաւասար քառակուսի են։



9. Բո՛ւրգը այն բազմանիստն է որուն խարիսխ կոչուած մէկ երեսը բազմանկիւնի է, եւ միւս երեսները հասարակաց գագաթ ունեցող եռանկիւնիներ են, որոնց խարիսխները բազմանկեան կողմերն են։



10. Երբ բուրգ մը անոր խարսխին զուգահեռական եղող մակարդակէ մը կը կտրուի, ինչպէս աբգդ, երկու մակարդակաց մէջտեղ եղող մասը հոփե՛լ բո՛ւրգ կը կոչուի։

11. Եռանկիւնի երեսներուն հաւասարակաց կէտը բուրգին գագաթը կը կոչուի։

12. Բուրգի մը բարձրո՛ւթիւնը այն ուղղահայեացն է որ բուրգին գագաթէն մինչեւ անոր խարսխին մակարդակը կը քաշուի։

13. Բուրգեր եռանկիւնի, քառանկիւնի, եւայլն կը կոչուին, երբ անոնց խարիսխներն են եռանկիւնի, քառանկիւնի, եւայլն։

14. Ո՛ղիղ բուրգը այն է որուն խարիսխը կանոնաւոր բազմանկիւնի է, նաեւ գագաթէն քաշուած ուղղահայեացը խարսխին կեդրոնէն կ՚անցնի։ Անանուն ուղղահայեացը բուրգին առանցքը կը կոչուի։


15. Ուղիղ բուրգի մը ընդհանո՛ւր բարձրո՛ւթիւնը այն գիծն է որ գագաթէն բուրգին խարսխին որեւէ կողման ուղղահայեաց կը քաշուի։

16. Բազմանասին պրամիդը այն գիծն է որ նոյն երեսին վրայ չեղող որեւէ երկու անկիւնի իրարու կը կապէ։

17. Երկու բազմանիստներ նման են, երբ նոյն թիւ երես ունին, եւ մէկուն առաջին երեսը միւսին առաջին երեսին հաւասար է, երկրորդը՝ երկրորդին, եւայլն, նաեւ հաւասար երեսները նման դիրք ու նոյն հակումն ունին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ո՛ղիղ հատուածակողման մը կորնիթարդ մակերեսոյթը հաւասար է անոր խարսխին ընդհատիչ, բազմապատկեալ անոր բարձրո՛ւթեամբը։




Եթէ ԱԲԳԴԵ–Ֆ ուղիղ հատուածակողմ է, անոր կորնիթարդ մակերեսոյթը հաւասար է (ԱԲ+ԲԳ+ԳԴ+ԴԵ+ԵԱ)×ԱՖ արտադրելոյն։

Քանզի այն մակերեսոյթը հաւասար է զոյն կազմող ԱԿ, ԲՀ, ԳԻ, ԴՔ եւ ԵՖ ուղղանկիւնիներուն գումարին։ Այդ ուղղանկիւնիներուն բարձրութիւնները եւ հատուածակողման բարձրութիւնը նոյն են. ուրեմն անոնց մակերեսաց գումարը, այսինքն հատուածակողման կորնիթարդ մակերեսոյթը, հաւասար է (ԱԲ+ԲԳ+ԳԴ+ԴԵ+ԵԱ)×ԱՖ արտադրելոյնս

Հետ. Երբ երկու ուղիղ հատուածակողմ նոյն բարձրութիւնն ունին, անոնց կորնթարդ մակերեւոյթները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խաչուածոց չրջապատները։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու զուգահեռական մակերեսէ սրեւէ հարուածակողմ կը կոչուի, կարուածները նման բազմանկիւններ են։



Եթէ ԱԲԳԴԵ-ը հարուածակողմը կտրող ՆՓ եւ ՍՎ մակարդակները զուգահեռական են, ՆՕՓՊՐ եւ ՍՖՎՏՈ կտրուածները նման բազմանկիւններ են։

Քանզի ՍՓ եւ ՆՕ զուգահեռական են (Գիրք Զ. Նախ. ժ.)։ Նաեւ, որովհետեւ ՆՍ եւ ՕՓ զուգահեռական են, ՆՕ եւ ՍՓ իրարու հաւասար են։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ ՊՎ=ՕՓ, ՎՏ=ՓՊ, եւայլն։ Որովհետեւ հարուածակողմին հաւասար եղող կողմերը զուգահեռական են, կը հետեւի թէ ՆՕՓ=ՍՖՎ անկեան, ՕՓՊ=ՊՎՏ անկեան, եւայլն (Գիրք Զ. Նախ. ժԳ.)։ ուրեմն այս կտրուածները նման բազմանկիւններ են։

Հետ. Հարուածակողման մը ամէն կտրուածը որ խաչուածոց զուգահեռական է, խաչուածին հաւասար է։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ քառեդր մը անոր խաչուածին զուգահեռական եղող մակերեսէ մը կը կտրուի,

Նախ, Անոր ծայրերը և քառեդրոնը համեմատական մասանց կը բաժնուին։


Երկրորդ, կտրուածը խաչուածին նման բազմանկիւն մըն է։

Եթէ Ս–ԱԲԳԴԵ քառեդը կտրող ափ մակարդակը քառեդրին խաչուածին զուգահեռական է, Ս.Ա : ՍԱ :: Ս.Ե : ՍՕ, եւ ափքրե բազմանկիւնը նման է ԱԲԳԴԵ խաչուածին։



Նախ. Որովհետեւ ԱԳ եւ ափ մակարդակները զուգահեռական են, ափ ու ԱԲ, քփ ու ԲԳ, եւայլն զուգահեռական են (Գիրք Զ. Նախ. ժ.)։ ուստի Ս.Ա : ՍԱ :: Ս.Բ : ՍԲ. բայց, որովհետեւ Քօ եւ ԲՕ զուգահեռական են, Ս.Բ : ՍԲ :: Ս.Ե : ՍՕ. ուրեմն Ս.Ա : ՍԱ :: Ս.Ե : ՍՕ։

Երկրորդ. Որովհետեւ ափ ու ԱԲ, նաեւ քփ ու ԲԳ, եւայլն զուգահեռական են, ափքփ հաւասար է ԱԲԳ անկեան, քփր՝ ԲԳԴ անկեան, եւայլն (Գիրք Զ. Նախ. ԺԳ.)։ Նաեւ, որովհետեւ Ս.Ք նման է ՍԱԲ եռանկեան, ՍՔՓ՝ ՍԲԳ եռանկեան, եւայլն, Ա.Բ : ՔՓ :: ՍԲ : ՍՔ, եւ ՍԲ : ՍՔ :: ԲԳ : ՔՓ, եւայլն. ուստի Ա.Բ : ՔՓ :: ԲԳ : ՔՓ, եւայլն. ուրեմն ՔՓՐԵ եւ ԱԲԳԴԵ բազմանկիւնները իրարու նման են (Գիրք Դ. Սահ. 1)։



Հետ. 1. Եթէ Ս հաստատակայ դադարին ունեցող Ս–ԱԲԳԴԵ եւ Ս–ՏՈՌ քառեդրոնին խաչհատները միեւնոյն մակարդակին վրայ են, այն խաչհատաց զուգահեռական եղող որեւէ մակարդակը՝ որ քառեդրը կը կտրէ, երկու կտրուածք կը ձեւացընէ, ինչպէս ափքրե ու փոռ, որոնք իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս խաչհատները։


Քանզի, որովհետեւ ԱԲԳԴԵ եւ ափքրե նման բազմանկիւններ են, տակերես ԱԲԳԴԵ : տակերես ափքրե :: ԱԲ² : ափ² (Գիրք Դ. Նախ. ԻԷ.)։ բայց ԱԲ : ափ ::

ՍԱ : Սա · ուստի հակբեա ԱԲԳԴԵ : հակբեա աբգդե :: ՍԱ² : Սա² : Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ հակբեա ՏՈՈ : հակբեա պոո : : ՍՏ² : Սո² : Բայց , որովհետեւ աբգ եւ պոո նոյն մակարդակին վրայ են , ՍԱ : Սա : : ՍՏ : Սո (Գիրք Չ· Նախ · ժե ·) · ուրեմն ԱԲԳԴԵ : աբգդե : : ՏՈՈ : պոո · կամ աբգդե : պոո : : ԱԲԳԴԵ : ՏՈՈ :

Հետ · 2· *Եթէ* ԱԲԳԴԵ *եւ* ՏՈՈ *խարիսխները համազօր են , անոնց զուգահեռական եղող որեւէ կտրուածքները , ինչպէս աբգդե եւ պոո , համազօր են :*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ · ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ո՛ղղէ բո՛ւրգի մը կրնկաւոր հակբեա-ոյրը հատասար է անոր խարիսխին ընդհատած , բազմապատկեալ ընդհատեալ բարձրութեան կէսովը :



Եթէ Ս–ԱԲԳԴԵ *բուրգը ուղիղ է , եւ* ՍՑ *ուղղահայեաց է* ԱԵ *դծին , բուրգին կորնթարդ մակերեւոյթը հատասար է* (ԱԲ+ԲԳ+ԳԴ+ԴԵ+ԵԱ) ×½ՍՑ *արտադրելոյն :*

Որովհետեւ բուրգը ուղիղ է , Ո կէտը ԱԲԳԴԵ կանոնաւոր բազմանկեան կեդրոնն է (Սահ · 14) · *ուստի* ՍԱ , ՍԲ , ՍԳ *եւայլն ծայրերը իրարու հատասար են* (Գիրք Չ· Նախ · Ե ·) · *նաեւ* ՍԱԲ , ՍԲԳ , ՍԳԴ *եւայլն երկկողմնագոյգ եռանկիւնք իրարու հատասար են , եւ իւրաքանչիւրին բարձրութիւնը հատասար է* ՍՑ *դծին :* Արդ ՍԱԲ *եռանկեան մակերեսը հատասար է* ԱԲ×½ՍՑ *արտադրելոյն · ուրեմն բոլոր եռանկեանց մակերեսներուն գումարը , կամ բուրգին կորնթարդ մակերեւոյթը , հատասար է* (ԱԲ+ԲԳ+ԳԴ+ԴԵ+ԵԱ)×½ՍՑ *արտադրելոյն :*


Հետ · *Ո՛ղղէ հարթաձեւ բո՛ւրգի մը կրնկաւոր հակբեա-ոյրը*

ընդհատատ է անոր խարխիսց ընդլայնեալ կէսոյն , բազմապատկեալ անոր ընդհատեալ բարձրութեանը :

Գանգի , որովհետեւ աբգդե կտրուածքը խարսխին նման է (Նախ · Գ·) , եւ ԱԲԳԴԵ խարխիսը կանոնաւոր բազմանկիւն է (Սահ · 14) , կը հետեւի թէ աբ , բգ , գդ , եւայլն իրարու հատասար են · ուստի աԲ , բԳ , գԴ , եւայլն իրարու հատասար տրապիզաձեւեր են , եւ իւրաքանչիւրին բարձրութիւնը հատասար է ՏՑ դծին , կամ հատեալ բուրգին չեղեալ բարձրութեանը : Բայց իւրաքանչիւր տրապիզաձեւին մակերեսը հատասար է ½ (ԵԱ+Եա)×ՏՑ արտադրելոյն (Գիրք Գ· Նախ · Է·) · ուրեմն ամենուն մակերեսը , այսինքն հատեալ բուրգին մակերեւոյթը , հատասար է երկու խարսխաց չդլայնեալ բազմապատկեալ չեղեալ բարձրութեամբ :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե · ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ հարթաձեւ սրե՛ւ մը մարմնոյ անկեանը կողմնագիծ երեսները սրելէ հարթաձեւ մը մարմնոյ անկեանը կողմնագիծ երեսոց հատասար են , և հատասար եղող երեսներէն նման դիրք ունին , հարթաձեւ երեսները հատասար են :



Եթէ ԱԲԳԴԵ *հատասար է աբգդե խարսխին , ԱԲԿՖ՝ աբկֆ զուգահեռաձեւն , եւ ԲԳՀԿ՝ բգհկ զուգահեռա-*

գծին, ԱԲԳԴԵ–Ֆ հատուածակողմը հաւասար է աբգդե–ֆ հատուածակողման։


Քանզի, եթէ ԱԲԳԴ խարիսխը անոր հաւասար եւ զոյգ աբգդ խարսխին վրայ դրուի, անոնք պիտի զուգընթանան. եւ, որովհետեւ Բ մարմնոյ անկիւնը հաւասար է բ մարմնոյ անկեան (Գիրք Ձ. Նախ. ԻԱ. Պար. 2), Բկ անոր հաւասար եղող բկ ի վրայ պիտի իյնայ, եւ ԲԳ ու ԲԱ՝ բգ եւ բա ի վրայ. քայց, որովհետեւ ԲՁ եւ ԲՀ երեսները հաւասար են բֆ եւ բհ երեսներուն, կՁ եւ կՀ պիտի իյնան կֆ ու կհ ի վրայ, եւ հատուածակողմերուն վերի խարիսխները զուգընթաց պիտի ըլլան. ուրեմն ոչ միայն խարիսխները՝ այլեւ բոլոր երեսները զուգընթաց պիտի ըլլան. ուրեմն հատուածակողմները հաւասար են։

Հետ. Հաւասար եռանկեան եւ հաւասար բազկանկիւն ուղղանկիւնի հատուածակողմերը երկուքական հաւասար են։

Քանզի, եթէ ԱԲ=աբ, եւ ԲԿ=բկ, ԱԲԿՖ=աբկֆ ուղղանկիւնին, նաեւ ԲԳՀԿ=բգհկ ուղղանկիւնին. ուստի Բ=բ մարմնոյ անկեան. ուրեմն հատուածակողմերը հաւասար են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամեն զոփահեռոփ էրեռո պեմառ պեմեղող երեսները հաւասար են, եւ անոնց մակերեսները՝ զոփահեռական։



Եթէ ԱԲԳԴ–Հ զուգահեռոտ է, ԱԲԳԴ եւ ԵՖԿՀ խարիսխները հաւասար զուգահեռագիծ են, եւ անոնց մակերեսները՝ զուգահեռական (Սահ. 2 եւ 6). եւ ապացուցուելու է թէ անոր ուրիշ որեւէ երկու դէմառ դէմ եղող երեսները, ինչպէս ԱԵՀԴ եւ ԲՖԿԳ, իրարու զուգահեռական ու հաւասար են։

Որովհետեւ ԱԲԳԴ զուգահեռագիծ է, ԱԴ եւ ԲԳ հաւասար ու զուգահեռական են. Ան եւ ԲՖ ալ հաւասար ու զուգահեռական են. ուստի ԴԱԵ հաւասար է ԳԲՖ անկեան, եւ անոնց մակերեսները զուգահեռական են (Գիրք Ձ. Նախ. ԺԳ.). ուրեմն ԴԱԵՀ եւ ԳԲՖԿ զուգահեռագծերը զուգահեռական ու հաւասար են։

Հետ. 1. Կը հետեւի թէ զուգահեռոտի մը վեց երեսայ որեւէ երկուքը որ իրարու դէմառ դէմ են՝ խարիսխ կրնան համարուիլ։


Հետ. 2. Զոփահեռոփ մը ըրս փրամանկիւններէը ձեւընդիկ երկու հաւասար մասանց կը բաժնէն։

Զուգահեռոտին ԲՀ եւ ՖԳ տրամանկիւնք իրար հաւասար մասանց կը բաժնեն, քանզի անոնք ԲԳՖՀ զուգահեռագծին տրամանկիւններն են (Գիրք Ա. Նախ. ԼԱ.). Նաեւ ԵԳ ու ՖԳ տրամանկիւնք իրար հաւասար մասանց կը կտրեն, քանզի ԵՖԳԴ զուգահեռագծին տրամանկիւններն են. Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ ԱԿ ու ՖԴ իրար հաւասար մասանց կը բաժնեն. ուրեմն այն չորս տրամանկիւնները հասարակայ կէտ մը ունին որ զուգահեռոտին կեդրոնը կրնայ համարուիլ։

Պար. Եթէ Ա կէտէն քաչուած ԱԲ, ԱՆ եւ ԱԴ գծերը, եւ անոնց իրարու հետ կազմած անկիւնները ծանօթ են, այն գծից վրայ զուգահեռոտ մը գծելու համար, Բ կէտէն՝ ԴԱԵ ին, Ե կէտէն՝ ԲԱԴ ին, եւ Դ կէտէն ԲԱԵ ին զուգահեռական մակարդակ անցուր. այս բոլոր մակարդակները իրար կտրելով զուգահեռոտ մը պիտի գծեն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ մակերեսակ մը զոփահեռոփ մը որեւէ երկու փրամանկիւնայնի ծայրերէն կ'անցնի, զոփահեռոփը երկու էրեռո համաչափ հոփոռոձակողմանց կը բաժնուի։



Եթէ ԱԲԳԴ–Հ զուգահեռատ է, *ա-նոր* ԲՖ *եւ* ԴՀ *տրամանկիւնային ծայ-րերուն վրայէն անցնող մակարդակը կը բաժնէ զուգահեռատը* ԲԱԴ–Հ *եւ* ԲԳԴ–Հ *հատուածակողմանց, որոնք իրարու հաւասար են:*

Բ ու Ֆ կէտերէն ԲՖ *ծայրին ուղ-զահայեաց Բաբ եւ Ֆէհկ մակար-դակները անցուր, եւ* Ա*է, Դհ, եւ* Գկ *ծայրերը երկնցուր մինչեւ Բաբ մակարդակը կտրեն: Բաբ եւ Ֆէհկ կտրուածները հաւասար են (նախ.* Բ.)*. Նաեւ զուգահեռագիծ են, քանզի* ա*Բ ու բ*Ֆ *զուգահեռական են (Գիրք Զ. Նախ. ժ.): Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ* Բ*է*Ֆ, Բ*Ֆէ*, *բ*Ֆհ*, *եւ* ա*բհէ զուգահեռագիծ են. ուստի Բաբ–ի ուղիղ հատուածակողմ է (Սահ. 4). ուրեմն* Բա*բ–ը եւ* Բ*բ–ը եռանկիւնի ուղիղ հատուածակողմերը, հաւասար խա-րիսխ, Բա*ա *ու Բ*բ*, եւ նոյն բարձրութիւնը, ԲՖ, ունենալով, իրարու հաւասար են (Նախ. ե. Հետ.):*


Որովհետեւ ԱԲՖԵ *եւ* ա*Բ*Ֆ*է զուգահեռագիծ են, Ա*է *=* ա*է. եւ անոնց հաւասարաց մասը, Ա*է*, հանելով կ'ունենանք* ա*Ա=*Ե*է: Նոյն կերպով կրնանք ցուցնել թէ* Դ*Ո=*Հ*հ: Եթէ* ՖԵՀհ *բազմանիստը* Բա*Ֆ*Դ *բազ-մանստին վրայ դրուի, որովհետեւ անոնց խարիսխ-ները, Բաբ եւ* Ֆ*է*Հ*, հաւասար են, եւ* Ա*ա, Դբ, եւ Ե*է *եւ* Հհ *ծայրերը խարխափաց ուղղահայեաց են, Եէ ու* Հհ՝ *Ա*ա *ու Դբ ի հետ զուգընթաց ալիսի ըլլան. ուրեմն այս բազմանիստերը իրարու հաւասար են. եւ, եթէ իւրաքանչիւրին՝ Ա*ԲԴ*–ն աւելցնենք, յայտնի է թէ* ԲԱԴ*–Հ եւ Բաբ–ը հաւասար են: Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ* ԲԳԴ*–Հ եւ Բ*բ*–ը հաւասար են: Բայց արդէն ապացուցուեցաւ թէ Բաբ–ը եւ Բ*բ*–ը հաւա-սար են. ուրեմն ԲԱԴ–Հ եւ ԲԳԴ–Հ իրարու հաւասար են:*

Հետ. Երբ եռանկիւնի հատուածակողմ մը, ինչպէս ԴԱԲ*–Հ*Ե*Ֆ, եւ զուգահեռատ մը, ինչպէս Ա*Կ*, հաս-*

*բակաց մարմնոյ անկիւն մը ունին, ինչպէս Ա, եւ հա-սարակաց ծայրեր, ինչպէս Ա*Բ*, Ա*Դ *եւ Ա*Ե*, հատուա-ծակողմը զուգահեռաձեւ կ'ըսուի է:*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու զուգահեռանիստ վերի խոյակները հաւասա-կից է, և անոնց վերի խոյակներէն միեւնոյն հակադրակէն վերայ, և միեւնոյն զուգահեռական գծերուն վրայ են, զուգահեռանիստերն իրարու համազոյ են:



*Ակ եւ Ա*Լ *զուգա-հեռաձեւները, որոնց վե-րի խարիսխը,* ԱԲԳԴ*, հաւասարակաց է, եւ վե-րի խարիսխները, Եկ եւ Մ*Ք*, միեւնոյն մա-կարդակին վրայ եղող Հլ ու Երք զուգահե-ռական գծերուն մէջ-տեղը կ'իյնան, իրարու հաւասար են:*


*Որովհետեւ Ան եւ Բ*Ֆ*, նաեւ Հե ու Կ*Ֆ *զուգահե-ռական են,* Ա*Եհ=*Բ*Ֆ*Ք *անկեան, Հ*Եհ*=Կ*Ֆ*Ք *անկեան, եւ Հ*ԵԱ*=Կ*Ֆ*Ք *անկեան:*

Նաեւ, Եֆ=Իք, քանզի իւրաքանչիւրը հաւասար է Ա*Բ գծին. ուստի Եֆ+*Ֆ*Իհ=*Ֆ*Իհ+Իք, կամ Եհ=Ֆք. ուրեմն* Ա*Եհ=*Բ*Ֆ*Ք *եռանկեան (Գիրք* Ա*. Նախ. ե.), եւ ԵՄ=Ֆլ, զուգահեռագծին: Բայց* Ա*Հ=Ֆ*Ք *զուգա-հեռագծին (Նախ. Զ.). ուրեմն Ե մարմնոյ անկիւնը հաւասար է Ֆ մարմնոյ անկեան, եւ (Նախ. Ե.)* Ա*Եհ–Մ եռանկիւնի հատուածակողմը հաւասար է* Բ*Ֆ*Ք*–Լ եռան-կիւնի հատուածակողման:*

ԱԲՔԵ*–Հ բազմանիստէն հանէ* Ա*Եհ–Մ հատուածա-կողմը, Ա*Լ *զուգահեռատը կը մնայ. Նոյն բազմանիս-տէն հանէ* Բ*Ֆ*Ք*–Լ հատուածակողմը, Ա*Կ *զուգահեռա-տը կը մնայ. ուրեմն Ա*Կ *եւ Ա*Լ *զուգահեռաններն իւ-րարու հաւասար են:*

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու զուգահեռանիստ նոյն խարիսխին ու նոյն բարձրութեան ունին, իրարու հաւասար են։




Եթէ ԱԲԳԴ խարիսխը ունեցող Ա՛Լ եւ Ա՛Կ զուգահեռանիստները նոյն բարձրութիւնն ունին, անոնք հաւասար են։


Որովհետեւ այս զուգահեռանիստները նոյն բարձրութիւնն ունին, անոնց վերի խարիսխները նոյն մակարդակին վրայ են։ Արդ եթէ եւ ԱԲ, նաեւ ԻՔ եւ ԱԲ հաւասար ու զուգահեռական են. ուստի եթէ եւ ԻՔ հաւասար ու զուգահեռական են. եւ նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ թէ կթ եւ ԼՔ հաւասար ու զուգահեռական են։ Երկնցուր կՀ, ֆե, ՓԼ եւ ԻՄ գծերը մինչեւ իրար կարելով՝ ՆՕՓՊ զուգահեռագիծը կազմեն. յայտնի է թէ այս զուգահեռագիծը հաւասար է թէ եկ եւ թէ ԻԼ զուգահեռագծին։ Եթէ ԱՔ եւ ՆՓ խարիսխներն ունեցող երրորդ զուգահեռա մը գծուի, այն զուգահեռաը հաւասար պիտի ըլլայ թէ Ա՛Լ եւ եւ թէ Ա՛Կ զուգահեռանին (Նախ. Ը.)։ ուրեմն Ա՛Լ եւ եւ Ա՛Կ զուգահեռանիները հաւասար են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ուրեք խոտորնակ զուգահեռաչ մը հաւասար սուղանիստ զուգահեռաչ մը կրնայ գծուիլ, որուն խարիսխը խոտորնակ զուգահեռաչին խարիսխին հաւասար, և բարձրութիւնը անոր բարձրութեանը հաւասար ըլլայ։


Ա՛Կ խոտորնակ զուգահեռանին խարիսխի կէսերէն, Ա, Բ, Գ, Դ, խարիսխին ուղղահայեաց Ա՛Ի, ԲՔ, ԳԼ, եւ ԴՄ գծերը քաշէ մինչեւ եզիակ վերի խարիսխին մակարդակը. այսպէս Ա՛Լ զուգահեռաը կը գծուի որ Ա՛Կ զուգահեռանին հաւասար է (Նախ. Թ.). նաեւ ասոր կողմնական երեսները ուղղանկիւն են։ Ուրեմն, եթէ ԱԲԳԴ խարիսխը ուղղանկիւն է, Ա՛Լ՝ ուղղանկիւնի զուգահեռաը է, որ Ա՛Կ ին խարիսխին ու բարձրութիւնն ունի, եւ անոր հաւասար է։ Բայց, եթէ ԱԲԳԴ ուղղանկիւն չէ; Գ՛Դ ին ուղղահայեաց Ա՛Օ եւ ԲՆ գծերը քաշէ, նաեւ խարիսխին ուղղահայեաց՝ ՕՊ եւ ՆՓ գծերը։ Ա՛ԲՆՕ–ԻՔՓՊ հատուածակոտը ուղղանկիւնի զուգահեռաը է. քանզի Ա՛ԲՆՕ եւ ԻՔՓՊ խարիսխները, նաեւ Ա՛Բ, ԲՓ, ՆՊ, եւայլն կողմնական երեսները ուղղանկիւն են։ Բայց Ա՛Փ եւ Ա՛Լ զուգահեռանիերուն հաւասարակաց երեսը, Ա՛ԲԻ, անոնց խարիսխը կրնայ հաւարուիլ, եւ Ա՛Օ՝ անոնց բարձրութիւնը (Նախ. Զ. Հետ. 1.). ուստի այս զուգահեռանիները իրարու հաւասար են (Նախ. Թ.). ուրեմն Ա՛Լ ուղղանկիւնի զուգահեռաը Ա՛Կ խոտորնակ զուգահեռանին հաւասար է. նաեւ ասոնց խարիսխները հաւասար, եւ անոնց բարձրութիւնները՝ հաւասար են։





ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէկ-ուրդ խորհուրդ առնելու համար՝ պէտք է ըստ հանգամանաց ընտրել այնպէս կը հաճեցնի, ինչպէս անոնց խորհրդները։



ԱԿ եւ ԱԼ ուղղանկիւնի զուգահեռանիստերն իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները, ԱԵ եւ ԱԻ։

Նախ. Ենթադրենք թէ ԱԵ եւ ԱԻ հաւասարակաց չափ ունին, եւ իրարու այնպէս կը համեմատին ինչպէս երկու ամբողջ թիւ, զորօրինակ, 15 եւ 8։ ԱԵ բաժնէ 15 հաւասար մասանց. ԱԻ պիտի պարունակէ անոնցմէ 8 հատը. նաեւ պ.ո.բ. եւայլն բաժանման կէտերէն խարխիններ զուգահեռական մակարդակ անցուր։ Այս մակարդակները պիտի բաժնեն ԱԿ զուգահեռոտը 15 իրարու հաւասար ուղղանկիւնի զուգահեռանիստներու, քանզի անոնց խարխիններուն իւրաքանչիւրը հաւասար է ԱԳ խարխինին (նախ. Բ.), եւ անոնց բարձրութիւններն իրարու հաւասար են։ Բայց, որովհետեւ այս 15 զուգահեռանիստերէն 8 հատը ԱԼ ի մէջ են, ԱԿ։ԱԼ։։15։8. այսինքն, զուգահեռանիստերն իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները։


Երկրորդ. Եթէ բարձրութիւնները հաւասարակաց չափ չունին, բայց եւ այնպէս ԱԿ։ՂԿ։։ԱԵ։ԱԻ։ Քանզի, եթէ այս համեմատութիւնը չիտակ չէ, ենթադրենք թէ ՂԿ։ԱԿ։։ԱԼ։։ԱԵ։ԱՕ։ Բաժնէ ԱԵ քանի մը հաւասար մասանց որոնց իւրաքանչիւրը Օի էն փոքր ըլլայ. բաժանման կէտերէն գոնէ մէկը, ինչպէս Տ, Օ եւ Ի կէտերուն մէջտեղ պիտի իյնայ. եթէ ԱԲԳԴ խարխինը եւ Ա՟ բարձրութիւնն ունեցող զուգահեռոտը Փ ով ցուցընենք, կ'ունենանք ՂԿ։ՂՓ։։ԱԿ։ՂՓ։։ԱԵ։Ա՟. քանզի այս բարձրութիւնները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս երկու ամբողջ թիւ։ Բայց ենթադրութեամբ ՂԿ։ԱԿ։ՂՓ։ԱԼ։։ԱԵ։ԱՕ. ուստի ՂՓ։ԱԼ։։ՂՓ։Փ։։ԱՕ։Ա՟։ Բայց ԱՕ մեծ է Ա՟ էն. ուստի, եթէ այս համեմատութիւնը չիտակ է, ՂՓ։ԱԼ մեծ է ՂՓ։Փ էն, բայց ընդհակառակն պզտիկ է. որովհետեւ համեմատութիւնը չիտակ չէ, եւ յայտնի է թէ ՂՓ։ԱԿ եւ ՂՓ։ԱԼ իրարու չեն կրնար այնպէս համեմատիլ, ինչպէս ԱԵ՝ ԱԻ էն մեծ եղող որեւէ գծի մը։

Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ համեմատութեան չորրորդ եզրը՝ ԱԻ էն պակաս չի կրնար ըլլալ. ուրեմն ՂՓ։ԱԿ։։ԱԼ։։ԱԵ։ԱԻ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մէկ-ուրդ բաբախ-ընկեր առնելու համար՝ պէտք է ըստ հանգամանաց ընտրել այնպէս կը հաճեցնի, ինչպէս անոնց խորհրդները։

Եթէ ԱԿ եւ ԱՖ ուղղանկիւնի զուգահեռանիստերը նոյն բարձրութիւնն ունին, անաւանդ ՂՓ։ԱԿ։ՂՓ։ԱՖ։։ԱԲԳԴ։ԱՄՆՕ։



Երկու զուգահեռոտանիները իրարու քով դիր այնպէս որ ՄԱ եւ ԱԴ ուղիղ գիծ մը կազմեն, եւ ԱՕ ԱԲ ին հետ զուգընթաց ըլլայ. նաեւ ՕՆԲԼ մակարդակը երկրորդ մինչեւ ԳԴՀԿ մակարդակը կարէ ՓՊ գծին վրայ, ԱՊ զու-

դահեռատը կազմելով։ Որովհետեւ Ա՛Կ եւ Ա՛Պ զուգահեռանները նոյն խարխափը, Ա՛ԵՀԴ, ունին, իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս Ա՛Բ եւ Ա՛Օ (Նախ. ԺԱ.)։ Նաեւ, որովհետեւ Ա՛Պ եւ Ա՛Բ նոյն խարխափը, Ա՛ՕԼԵ, ունին, անոնք իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս Ա՛Դ ու Ա՛Մ՛ այսինքն,

ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Կ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Պ՝՝Ա՛Բ՝Ա՛Օ,

եւ ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Պ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Բ՝՝Ա՛Դ՝Ա՛Մ՛։

Այս երկու կարգ համեմատութեանց մէկուն առաջին եզրը միւսին առաջին եզրովը, երկրորդը՝ երկրորդովը, եւայլն բազմապատկելով (Գիրք Բ. Նախ. ԺԳ.), եւ ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Պ, թէ նախագասին եւ թէ յետագասին բազմապատկիչ ըլլալուն համար, զանց ընելով, կ՛ունենանք ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Կ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Բ՝՝Ա՛Դ×Ա՛Բ՝Ա՛Օ×Ա՛Մ՛։

Բայց Ա՛Դ×Ա՛Բ արտադրեալը Ա՛ԲԳԴ մակերեսն է, եւ Ա՛Օ×Ա՛Մ՛՝ Ա՛ՄՆՕ մակերեսը (Գիրք Դ. Նախ. Դ. Պար. 1)· ուրեմն ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Կ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Բ՝՝Ա՛ԲԳԴ՝Ա՛ՄՆՕ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Որքա՛ն երկա՛ր ուղղանկիւնի ղ՛ո՛փ՛ահեղ՛ոպնէր իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարխափները, այսինքն, ինչպէս անոնց երեք զոյգ զուգահեռները։

Ա՛Կ եւ Ա՛Ո ուղղանկիւնի զուգահեռանեռն այնպէս դիր որ անոնք Բ՛Ա՛Ե հաւասարակոյս անկիւնը ունենան. նաեւ Ա՛Ն խարխափը եւ Ա՛Ե բարձրութիւնն ունեցող Ա՛Բ զուգահեռատը կազմելու պէտք եղած մակարդակները երկնցուր։ Որովհետեւ Ա՛Կ եւ Ա՛Բ նոյն բարձրութիւնը, Ա՛Ե, ունին, անոնք իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարխափները, Ա՛Դ եւ Ա՛Ն (Նախ. ԺԲ.)· եւ որովհետեւ Ա՛Բ եւ Ա՛Ո նոյն խարխափը Ա՛Ն ունին, անոնք իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները, Ա՛Ե եւ Ա՛Տ (Նախ. ԺԱ.), այսինքն,

ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Կ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Բ՝՝Ա՛ԲԳԴ՝Ա՛ՄՆՕ,

եւ ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Բ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Ո՝՝Ա՛Ե՝Ա՛Տ։

Ուսոի բազմապատկելով եւ հաւասարակոյս բազմապատկիչը, ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Բ, զանց ընելով կ՛ունենանք ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Կ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Ո՝՝Ա՛ԲԳԴ×Ա՛Ե՝Ա՛ՄՆՕ×Ա՛Տ։



Եթէ Ա՛ԲԳԴ եւ Ա՛ՄՆՕ խարխափներուն տեղ Ա՛Բ×Ա՛Դ եւ Ա՛Օ×Ա՛Մ՛պնենք կ՛ունենանք ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Կ՝ղ՛ո՛փ՛ Ա՛Ո՝՝Ա՛Բ×Ա՛Դ×Ա՛Ե՝Ա՛Օ×Ա՛Մ՛×Ա՛Տ· ուրեմն որեւէ երկու ուղղանկիւնի զուգահեռաններ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց երկու տարածութեանց արտադրեալները։

Պոր. 1. Եթէ Ա՛Օ՝ փձայլն դ՛ուրկեռ համարինք, եւ Ա՛Մ՛=Ա՛Օ, Ա՛Մ՛×Ա՛Օ՝ հակերեսուրկան դ՛ուրկեռ է (Գիրք Դ. Նախ. Դ.)· նաեւ, եթէ Ա՛Տ=Ա՛Օ, Ա՛Օ×Ա՛Մ՛×Ա՛Տ=1։ Ա՛ՄՆՕ–Տ զուգահեռատը ձաւալէ դ՛ուրկեռն կը կոչուի, եւ, որովհետեւ Ա՛Օ×Ա՛Մ՛×Ա՛Տ արտադրեալն թիւը՝ Ա՛ՄՆՕ–Տ զուգահեռատին ծաւալի միաւորներուն թիւն հաւասար է, յայտնի է թէ Ա՛Բ×Ա՛Դ×Ա՛Ե արտադրեալը եւ Ա՛Կ զուգահեռատ ծաւալի միաւորներուն հաւասար թիւ ունին· ուրեմն ո՛ղղանկիւնի ղ՛ո՛փ՛ահեղ՛ոպի մը ձաւալը հաւասար է անոր երեք զոյգ զուգահեռներուն արտադրեալին։

Պոր. 2. Որովհետեւ խորանարդին երեք տարածութիւններն իրարու հաւասար են, երբ անոր կողմը 1 է, անոր ծաւալը 1×1×1=1 կ՛ըլլայ· երբ կողմը 2 է, ծաւալը 2×2×2=8 կ՛ըլլայ· երբ կողմը 3 է, ծաւալը 3×3×3=27 կ՛ըլլայ, եւայլն· ուրեմն, եթէ կարգ մը խորանարդներուն կողմերը իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս 1,2,3, եւայլն, խորանարդները իրա-

րու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս 1,8,27, եւայլն։ Ասոր համար է որ թուաբանութեան մէջ երեք հատասար համարտադրիչներուն արտադրեալին խորանարդ անունը կը տրուի։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որչա՞փ հարուածներէն ձայնը հատասար է անոր խտութեան, քառակուսիաբար առնուած անոր բարձրութեան։

Նախ. Որեւէ զուգահեռատ համաշոր է այն ուղղանկիւնի զուգահեռատին, որ նոյն բարձրութիւնը, եւ համաշոր խարիսխ ունի (Նախ. ժ.)։ բայց ուղղանկիւնի զուգահեռատին ծաւալը հատասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութիւնը (Նախ. ԺԴ. Պար. 1)։ ուրեմն որեւէ զուգահեռատի ծաւալը հատասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը։

Երկրորդ. Որովհետեւ ամէն եռանկիւնի հատուածակողմ՝ նոյն բարձրութիւնը եւ կրկնապատիկ խարիսխը ունեցող զուգահեռատին կէսն է (Նախ. է.), յայտնի է թէ եռանկիւնի հատուածակողմին ծաւալը հատասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը։


Երրորդ. Որովհետեւ տրամանկիւնիներ քաշելով կրնանք որեւէ հատուածակողմի խարիսխը քանի մը եռանկեանց բաժնել, յայտնի է թէ այն տրամանկիւնիներուն եւ հատուածակողմին ծայրերուն վրայէն մատկարակ անցընելով կրնանք հատուածակողմը բաժնել եռանկեանց թիւին չափ եռանկիւնի հատուածակողմանց։ նաեւ բոլոր եռանկիւնի հատուածակողմանց ծաւալը հատասար է անոնց խարսխաց, բազմապատկեալ անոնց բարձրութեամբը։ ուրեմն ամէն հատուածակողմի ծաւալը հատասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը։

Հէք. Նոյն բարձրութիւնն ունեցող հատուածակող-

մաց իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարիսխները։ նաեւ նոյն խարիսխն ունեցող հատուածակողմաց իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները։ եւ որեւէ երկու հատուածակողմանց ծաւալները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարսխաց ու բարձրութեանց արտադրեալները։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու եռանկիւնի բուրգ որ հատասար բազմանկիւն համալոր խարիսխ ունին, համալոր են, կամ հատասար ծաւալ ունին։



Եթէ ԱԹ բարձրութիւնն ունեցող Ա–ԱԲԳ եւ Ա–ՔԵՖ բուրգերուն խարիսխները համալոր են, բուրգերն ալ համալոր են, կամ հատասար ծաւալ ունին։

Եթէ համալոր չեն, ենթադրենք թէ Ա–ՔԵՖ պզտիկ է, եւ անոնց տարբերութիւնը հատասար է ԱԲԳ խա-

բիսը եւ Ա՞ բարձրութիւնը ունեցող հատուածակողմանի :


Բուրգերը նոյն մակարդակին վրայ դիր , եւ Ա՞Թ բարձրութիւնը բաժնէ քանի մը հաւասար մասանց , ինչպէս Ա՞ , ՚՚ , ՚՚՚ եւայլն , որոնց իւրաքանչիւրը Ա՞ էն փոքր ըլլայ . նաեւ բաժանման կէտերէն , ՚,՚,՚ եւայլն , խարսխին զուգահեռական մակարդակներ անցուր . անոնց կտրուածներէն Դ-ին հաւասար է Բ-ին , կէտ կէտ ին , եւայլն (Նախ . Գ . Հետ . 2) : Ցետոյ Ա-Բ , Դ-ին , կէտ եւայլն խարիսխներուն վրայ , Ա՚ , Դ՚ , Կ-Բ եւայլն ծայրերը ունեցող արտաքին հատուածակողմերը դէպ . նաեւ Բ-ին , կէտ , ՚-ը եւայլն խարիսխներուն վրայ Բ՚ , Բ՚ , կ՚ եւայլն ծայրերը ունեցող ներքին հատուածակողմերը դէպ : Յայտնի է թէ Ս-Ա-Բ բուրգին բոլոր արտաքին հատուածակողմանց գումարը մեծ է Ս-Ա-Բ բուրգէն . նաեւ յայտնի է թէ Ս-Բ՚Բ բուրգին բոլոր ներքին հատուածակողմանց գումարը Ս-Բ՚Բ բուրգէն պզտիկ է . ուրեմն այս երկու գումարներուն տարբերութիւնը երկու բուրգերուն տարբերութենէն մեծ է :

Երբ այս հատուածակողմերը կը բազդատենք , կը տեսնենք թէ երկրորդ արտաքին հատուածակողմը Դ-ին-Կ համազօր է առաջին ներքին հատուածակողման , Բ-ին-Բ՚ , քանզի համազօր խարիսխ եւ հաւասար բարձրութիւն ունին . նաեւ երրորդ արտաքին հատուածակողմը համազօր է երկրորդ ներքին հատուածակողման , չորրորդը՝ երրորդին , եւայլն . այսինքն վերի չորս արտաքին հատուածակողմները համազօր են Ս-Բ՚Բ բուրգին մէջ եղած չորս ներքին հատուածակողմանց . ուրեմն այս երկու կարգ հատուածակողմանց գումարներուն տարբերութիւնը հաւասար է Ա-Բ-Գ հատուածակողման : Բայց արդէն ցուցուցինք թէ այս տարբերութիւնը մեծ է բուրգերուն տարբերութենէն . եւ հետեւաբար ցուցինք թէ այս վերջին տարբերութիւնը հաւասար է Ա-Բ-Գ հատուածակողման . ուստի Ա-Բ-Գ մեծ ըլլալու է Ա-Բ-Գ էն . բայց ընդհակառակն փոքր է , քանզի անոնց խարիսխը , Ա-Բ , նոյն է , այլ Ա՞ բարձրութիւնը մեծ է Ա՞ բարձրութենէն . ուստի կարելի

չէ որ բուրգերուն ծայրերուն մէկը միւսէն մեծ ըլլայ . ուրեմն հաւասար բարձրութիւն ու համազօր խարիսխ ունեցող որեւէ երկու եռանկիւնի բուրգերը իրարու համազօր են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ . ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ եռանկիւնի բուրգ մը և եռանկիւնի հատուածակողմ մը նոյն խարիսխը և նոյն բարձրութիւնն ունին , բուրգը հատուածակողման երրորդ մասին համազօր է :




Եթէ Ֆ-Ա-Բ-Գ բուրգը եւ Ա-Բ-Գ-Եֆ-Դ հատուածակողմը նոյն բարձրութիւնն ունին , բուրգին ծայրը հատուածակողմանն ծայրին երրորդ մասն է :

Ֆ-Ա-Դ մակարդակը անցընենք Ֆ-Ա-Բ-Գ բուրգը կտրէ հատուածակողմէն . Ֆ գագաթը ունեցող Ֆ-Ա-Դ-Ե քառանկիւնի բուրգը կը մնայ : Եթէ տրամանկիւնը քաշէ , եւ Ֆ-Ե-Դ մակարդակը անցուր , Ֆ-Ա-Ե եւ Ֆ-Դ-Ե եռանկիւնի բուրգերը կազմուին : Այս երկու բուրգերը հաւասար խարիսխ ունին , Ա-Ե-Դ-Ե , քանզի իւրաքանչիւրը Ա-Դ-Ե զուգահեռագծին կէսն է . նաեւ նոյն բարձրութիւնն ունին , քանզի Ֆ գագաթը հաստատակայ է . ուստի համազօր են (Նախ . ԺԵ .) : Բայց Ֆ-Դ-Ե եւ Ֆ-Ա-Բ-Գ հաւասար խարիսխներ ունին , Ա-Բ-Գ եւ Ե-Ֆ-Դ . նաեւ նոյն բարձրութիւնը , այսինքն Ա-Բ-Գ եւ Ե-Ֆ-Դ մակարդակաց մէկէն միւսին ուղղահայեաց քաշուած գիծը . ուստի համազօր են : Ուրեմն Ա-Բ-Գ-Եֆ հատուածակողմը կազմող երեք բուրգերը , Ֆ-Ա-Բ-Գ , Ֆ-Դ-Ե-Ե եւ Ֆ-Ա-Դ-Ե , իրարու համազօր են , եւ Ֆ-Ա-Բ-Գ՝ Ա-Բ-Գ-Եֆ-Դ հատուածակողման երրորդ մասն է :

Հետ. Եռանկիւնի բուրգի մը ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին ու բարձրութեան արտադրեալին երրորդ մասին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԷ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ոչ-ե՞ բուրգի ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին և բարձրութեան արտադրեալին երրորդ մասին։



Ս–ԱԲԴԵ բուրգին խարսխին վրայ եր և եզ տրամանկիւնները քաշէ, և ՍԵՐ ու ՍԵԳ մակարդակները անցուր. այսպէս Ս–ԱԲԴԵ բուրգը քանի մը եռանկիւնի բուրգերու կը բաժնուի, որոնք նոյն բարձրութիւնն ունին, ՍՕ։ Բայց այս բուրգերուն խարտաքանչիւրին ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին ու բարձրութեան արտադրեալին երրորդ մասին (Նախ. ԺԶ. Հետ.). ուստի անոնց ծաւալներուն գումարը, կամ Ս–ԱԲԴԵ բուրգին ծաւալը, հաւասար է ԱԵՒ+ԵԲԳ+ԵԴԳ կամ ԱԲԴԵ խարսխին և ՍՕ բարձրութեան արտադրեալին երրորդ մասին. ուրեմն որևէ բուրգի ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին եւ բարձրութեան արտադրեալին երրորդ մասին։

Հետ. 1. Բուրգ մը նոյն խարխափը եւ նոյն բարձրութիւնն ունեցող հաստուածակողման երրորդ մասն է։

Հետ. 2. Երկու բուրգեր, որ նոյն բարձրութիւնն ունին, իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարխափները։


Հետ. 3. Երկու բուրգեր, որ հաւասար խարխափներ ունին, իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները։

Հետ. 4. Բուրգեր իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարսխաց եւ բարձրութեանց արտադրեալները։

Պոր. Բազմանասի մը ծաւալը գիտնալու համար, նախ, բաժնէ բազմանիստը քանի մը բուրգերու, անոր որուն մարմնոյ անկեան գագաթէն մակարդակներ անցընելով։ Յայտնի է թէ մարմնոյ անկիւնը կազմող երեսներէն զատ, բազմանասին ամէն երեսը մէյմէկ բուրգի խարխափ կ'ըլլայ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԸ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Ոչ-ե՞ հոփեալ բուրգի մը ծաւալը հաւասար է երեք բուրգերու ծաւալներուն գումարին, որոնց խարտաքանչիւրին բարձրութիւնը հաւասար է հոփեալ բուրգին բարձրութեանը, և առաջնոյն խարխափը հոփեալ բուրգին վերի խարխափն է, երկրորդինը՝ անոր վարի խարխափը, և երրորդինը՝ այն վերէ և վարէ խարխափ ունեցող հակադարձականը։



Եթէ նոյն մակարդակին վրայ եղող Ս–ԱԲԳԴԵ եւ Թ–ՖԿՀ բուրգերը հաւասարաչափ խարխափ եւ նոյն բարձրութիւնն ունին, եւ խարխափներուն զուգահեռական մակարդակ մը, ինչպէս ԱԲ, անցընենք, ԱԲՓԵ եւ ՖԿՀ կտրուածքները համաչափ կ'ըլլան (Նախ. Գ. Հետ. 2). ուստի Ս–ԱԲՓԵ եւ Թ–ՖԿՀ բուրգերը համաչափ են (Նախ. ԺԵ.). Նաեւ Ս–ԱԲԳԴԵ եւ Թ–ՖԿՀ բուրգերը համաչափ են. ուստի ԱԲԳ–ԱԲՓ եւ ՖԿՀ–ՖԿՀ հաւասար բուրգերը համաչափ են. ուրեմն, եթէ նախադասութիւնը կրնայ ապացուցուիլ եռանկիւնի հաւասար բուրգի մը նկատմամբ, ճշմարիտ է որևէ հաւասար բուրգի նկատմամբ։

ՖԿՀ–ՖԿՀ եռանկիւնի հաւասար բուրգին ՖՀ ծայրէն ՖԿՀ մակարդակը անցընելով Կ–ՖԿՀ բուրգը կտրեհանէ. այս բուրգին խարխափը հաւասար բուրգին խարխափն է. նաեւ անոր բարձրութիւնը հաւասար է հա-

տեալ բուրգին բարձրութեանը, քանզի անոր գագաթը վերի խաբղեանին վրայ է։



Այժ բուրգը հանուելով կը մնայ Կ գագաթը եւ ՖՀՉ խարիսխն ունեցող Կ-ՖՀՉ բուրգը. ՖԿՀ մակերեսը անցուր Կ-ՖՉՀ եւ Կ-ՖՀՉ բուրգերը դծելով։ Այս վերջինը ՖԿՀ խարիսխն ունի, այսինքն, հատեալ բուրգին վերի խարիսխը, նաեւ անոր բարձրութիւնը հատեալ բուրգին բարձրութեանը հաւասար է, քանզի Հ գագաթը հատեալ բուրգին վարի խարիսխին վրայ է։

Երրորդ բուրգը, Կ-ՖՉՀ, քննելու համար կը քաշէ ՖՉ դծին զուգահեռական։ Եթէ ՖՉՀ խարիսխը եւ Ֆ գագաթն ունեցող նոր բուրգ մը մտօք ըմբռնենք, այս նոր բուրգը եւ Կ-ՖՉՀ բուրգը նոյն խարիսխը, ՖՉՀ, ունին. նաեւ նոյն բարձրութիւնը, քանզի անոնց գագաթները, Կ եւ Ֆ, խարիսխին զուգահեռական եղող կը դծին վրայ են. ուրեմն այս բուրգերը համարժէք են։ Բայց Ֆ կրնայ Ֆ-ՖՉՀ բուրգին գագաթը համարուիլ. անտուն անոր բարձրութիւնը հատեալ բուրգին բարձրութեանը հաւասար կ'ըլլայ. եւ կը մնայ ապացուցանել թէ անոր ՖԲՀ խարիսխը, ՖԿՀ եւ ՖԿՀ միջին համեմատականն է։ ՖՀԲ եւ ՖԿՀ եռանկիւնքն միջ Ֆ հաւասար է Ֆ անկեան. ուստի ՖՀ:ՖԿ::ՖԲ×ՖՀ:ՖԿ×ՖՀ (Գիրք Դ. Նախ. ԻԴ.) բայց, որովհետեւ ՖՖ եւ ԿԲ զուգահեռական են, ՖԿ=ՖԲ. ուստի

ՖՀ:ՖԿ::ՖՀ:ՖՀ։

Նաեւ ՖՀԿ:ՖՀԲ::ԴԿ:ՖԲ կամ ՖԿ (Գիրք Դ. Նախ. Զ. Հետ.). բայց, որովհետեւ ՖԿՀ եւ ՖԿՀ նման եռանկիւնները են,

ՖԿ:ՖԿ::ՖՀ:ՖՀ.


ուստի ՖԿՀ:ՖՀԲ::ՖՀԲ:ՖԿՀ.

այսինքն, ՖՀԲ միջին համեմատականն է ՖԿՀ եւ ՖԿՀ խարխաց. ուրեմն հատեալ բուրգի մը ծալալը հաւասար է երիք բուրգերուն ծալալներուն գումարին, որոնց իւրաքանչիւրին բարձրութիւնը հաւասար է հատեալ բուրգին բարձրութեանը, եւ որոնց առաջնոյն խարիսխը հատեալ բուրգին վերի խարիսխն է, երկրորդինը՝ անոր վարի խարիսխը, եւ երրորդինը՝ այն վերի եւ վարի խարխաց միջին համեմատականը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԹ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Նման եռանկիւնի հատուածակողմանց ծաւալները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն ծայրերուն կողքերը։

Եթէ ԳԲԴ-Փ եւ ՔՔԴ-Ֆ հատուածակողմները նման են, անոնց ծաւալները այնպէս կը համեմատին, ինչպէս ԲԴ³ եւ ՔՔ³։



Որովհետեւ հատուածակողմները իրարու նման են, Բ հաւասար է Ք մարմնոյ անկեան (Սահ. 17, եւ Գիրք Զ. Նախ. ԻԱ. Պար. 2). ուստի, եթէ մէկը միւսին վրայ դրուի, անոնք պիտի զուգընթանան, եւ Ֆ-ՔԴՖ հատուածակողմը Բ-ՓԴԳ դիրքը պիտի ունենայ։ Ա էն հատուածակողմանց հաւասարակաց խարխին ուղղահայեաց Ա՛Հ՛ քաշէ. Բ՛Ա՛Հ՛ մակարդակը ուղղահայեաց է ԲԴԳ մակարդակին (Գիրք Զ. Նախ. ԺԶ.)։ Բ՛Ա՛Հ՛ մակարդակին վրայ ա կէտէն ահ քաշէ Բ՛Հ՛ դծին ուղղահայեաց. ահ ալ ուղղահայեաց է ԲԴԳ խարխին (Գիրք Զ. Նախ. ԺԷ.), եւ Ա՛Հ՛ ու ահ՝ երկու հատուածակողմանց բարձրութիւններն են։

Այդ, որովհետեւ Ա՛Բ՛Հ՛ եւ աԲՀ եռանկիւնները, նաեւ ԱԳ ու աՔ զուգահեռագիծերը իրարու նման են,

Ա՛Հ՛:աՀ::Ա՛Բ՛:աԲ::ԲԳ:ԲՔ։

Բայց, որովհետեւ խարիսխները իրարու նման են, խոբ. ԲԴԳ:խոբ. ՔՔՔ::ԲԳ²:ԲՔ² (Գիրք Դ. Նախ. ԻԵ.). ուստի խոբ. ԲԴԳ:խոբ. ՔՔՔ::Ա՛Հ՛²:ահ²։

Նախադասները Ա.Հ ով, եւ յետադասները ահ ով բազմապատկելով կ'ունենանք խոբ. ԲԳԴ×Ա.Հ:խոբ. ԲՔՊ×ահ::Ա.Հ³:ահ³։

Բայց առաջին նախադասը՝ ԲԳԴ-ի հատուածակողման ծաւալն է, եւ առաջին յետադասը՝ ԲՔՊ-ի հատուածակողման ծաւալը (Նախ. ԺԲ.). ուրեմն եռանկիւնի հատուածակողմանց ծաւալներն իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն ծայրից խորանարդները։


Հետ. Որեւէ երկու նման երկու հատուածակողմանց ծաւալները երկու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն ծայրից խորանարդները։

Քանզի, եթէ տրամանկիւններ քաշելով նման խարիսխները (Սահ. 17) երկու կարգ եռանկեանց բաժնենք (Գիրք Դ. Նախ. ԻԶ.), եւ այն տրամանկիւններուն եւ կողմնական ծայրերուն վրայէն մակարդակներ անցընենք, երկու հատուածակողմները երկու կարգ եռանկիւնի հատուածակողմանց կը բաժնուին, որոնց մէկուն առաջինը նման է միւսին առաջնոյն, երկրորդը՝ երկրորդին, եւայլն։ Բայց այս եռանկիւնի հատուածակողմները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն ծայրից խորանարդները. եւ որովհետեւ այս ծայրերը համեմատական են բազմանկիւնի հատուածակողմանց ծայրերուն, եռանկիւնի հատուածակողմանց մէկ կարգը միւս կարգին այնպէս կը համեմատի ինչպէս բազմանկիւնի հատուածակողմանց համանուն ծայրից խորանարդները։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ի. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու երբոր նման բուրգեր երբոր այնպէս կը համեմատին ինչպէս անոնց համանուն ծայրից խորանարդները։

Ս-աբգդե բուրգը անոր նման եղող Ս-Ա.ԲԳԴԵ բուրգին վրայ այնպէս դիր որ Ս մարմնոյ անկիւնը հասաբակաց ըլլայ. բուրգերուն դադաթան անկիւնները ալիսի զուգընթացման (Սահ. 17). նաեւ անոնց խարիսխները իրարու զուգահեռական ալիսի ըլլան. քանզի, որովհետեւ համանուն երեսները նման են, Սաբ հաւասար է ՍԱ.Բ անկեան, եւ Սբգ՝ ՍԲԳ անկեան. ուրեմն Ա.ԲԳ մակարդակը զուգահեռական է աբգ մակարդակին (Գիրք Զ. Նախ. ԺԳ.)։ Քաշէ ՍՕ գիծը Ա.ԲԳ մակարդակին ուղղահայեաց, կտրելով աբգ մակարդակը օ կէտին վրայ. անատեն ՍՕ::Սօ::ՍԱ.:Սա::Ա.Բ:Ա.բ (Նախ. Գ.). ուստի ⅓ՍՕ:⅓Սօ::Ա.Բ:աբ։ Բայց որովհետեւ խարիսխներն իրարու նման են,



Ա.ԲԳԴԵ:աբգդե:Ա.Բ²:աբ² (Գիրք Դ. Նախ. ԻԷ.)։ երկու համեմատութիւնները բազմապատկելով, նախադասը՝ նախադասով եւայլն, կ'ունենանք

Ա.ԲԳԴԵ×⅓ՍՕ:աբգդե×⅓Սօ::Ա.Բ³:աբ³։

Բայց առաջին նախադասը՝ Ս-Ա.ԲԳԴԵ բուրգին ծաւալն է, եւ առաջին յետադասը՝ Ս-աբգդե բուրգինը (Նախ. ԺԷ.). ուրեմն երկու իրարու նման բուրգեր իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց համանուն ծայրից խորանարդները։

Ընդհանուր Պրպտումն.

Այս գրքին գլխաւոր նախադասութիւնները կրնանք համառօտ խօսքով ըսել։

Ա. Եթէ հատուածակողման խարիսխը՝ խ ով, եւ անոր բարձրութիւնը Բ ով ցուցընենք, հատուածակողման ծաւալը կ'ըլլայ Բ×խ արտադրեալը։

Բ. Եթէ բուրգի մը խարիսխը՝ խ ով, եւ անոր բարձրութիւնը Բ ով ցուցընենք, բուրգին ծաւալը կ'ըլլայ Բ×⅓խ, կամ խ×⅓Բ, կամ ⅓Բխ արտադրեալը։

Գ. Եթէ հատեալ բուրգի մը բարձրութիւնը՝ Բ ով, եւ անոր խարիսխները Ա եւ Գ ով ցուցընենք, անոր ծաւալը կ'ըլլայ ⅓Բ (Ա+Գ+√Ա.Գ)։

Դ. Եթէ որեւէ իրարու նման երկու բազմանիստանեքրու ծաւալները՝ փ եւ ֆ ով, եւ անոնց որեւէ երկու համանուն ծայրերը Ա եւ ա ով ցուցընենք, կ'ունենանք


փ:ֆ::Ա³:ա³։

ԳԻՐՔ Ը.

ԳԼԱՆ, ԿՈՆ ԵՒ ԳՈԻՆԴ

Սահմանք։

1. Երբ ուղղանկիւն մը, ինչպէս ԱԲԳԴ, անոր անշարժ ԱԲ կողման վրայ կը դառնայ, գծուած մարմինը գլան կը կոչուի։



Որովհետեւ ԱԴ եւ ԲԳ կողմերը այս շարժման մէջ ԱԲ գծին ուղղահայեաց են, անոնք երկու իրարու հաւասար բոլորակներ կը գծեն, ԴՀՓ եւ ԳԿՊ, որոնք գլանին խոբեխնեերը կը կոչուին. նաեւ ԳԴ կողմը գլանին կոթնոցը մակերեւոյթը կը գծէ։


ԱԲ անշարժ գիծը գլանին առանցքը կը կոչուի։

Առանցքին ուղղահայեաց եղող ամէն կտրուած, ինչպէս ՓԼՄ, խարսխին հաւասար բոլորակ մըն է. քանի երբ ուղղանկիւնը կը դառնայ առանցքին վրայ, ԱԲ ին ուղղահայեաց եղող ՓԻ գիծը խարսխին հաւասար բոլորակ մը կը գծէ, այսինքն ՓԼՄ կտրուածը։


Ամէն կտրուած որ առանցքին վրայէն կ'անցնի, ինչպէս ՓՊԿ, ուղղանկիւն է, եւ ԱԲԳԴ ուղղանկիւնին կրկնապատիկն է։

2. Երկու գլան նման են, երբ անոնց առանցքներն իրարու այնպէս կը հաւնեմատին, ինչպէս անոնց խարսխապատ շրջանագծերը։

3. Եթէ գլանի մը խարսխի շրջանակին մէջ բազմանկիւն մը գծուի, ինչպէս ԱԲԳԴԵ, եւ անոր վրայ գլանին բարձրութիւնն ունեցող ուղիղ հաւասարակողմ մը գծուի, հաւասարակողմը գլանին նեբսը գծուած է, կամ գլանը հպուած ակոլման պրսը գծուած է կ'ըսուի։ Յայտնի է թէ հաւասարակողման ծայրերը, ԱՖ, ԲԿ, եւայլն գլանին կոթնոցի մակերեւոյթին վրայ են։




4. Նաեւ, եթէ ԱԲԳԴ՝ գլանի մը խարսխին դուրսը գծուած բազմանկիւն է, անոր վրայ գլանին բարձրութիւնն ունեցող ուղիղ հաւասարակողմը գլանին պրսը գծուած է, եւ գլանը հպուած ակոլման նեբսը գծուած է կ'ըսուի։ Եթէ Մ, Ն, եւայլն ԱԲ, ԲԳ, եւայլն կողմանց չափման կէտերն են, յայտնի է թէ ՄՏ, ՆՈ, եւայլն գծերը թէ գլանին եւ թէ հաւասարակողման կորնթարդ մակերեւոյթներուն վրայ են։



5. Երբ ուղղանկիւն եռանկիւն մը, ինչպէս ՍԱԲ, անոր անշարժ ՍԱ կողման վրայ կը դառնայ, գծուած մարմինը կոն կը կոչուի։

ԲԳԳԵ բոլորակը կոնին խոբեխը կը կոչուի, եւ ՍԲ հակուղիղին գծած երեսը՝ կոնին կոթնոցը մակերեւոյթը։ Ս կէտը կոնին գագաթն է, ՍԱ՝ անոր քաջբռնութիւնը, եւ ՍԲ՝ անոր ընդհանուր քաջբռնութիւնը։




Առանցքին ուղղահայեաց եղող ամէն կտրուած, ինչպէս ՀՔՓԻ, բոլորակ է. նաեւ առանցքին վրայէն անցնող ամէն կրտ-

բուած, ինչպէս ՍԴԵ, երկկողմնազոյգ եռանկիւն է, եւ ՍԱԲ եռանկեան կրկնապատիկն է։


6. Եթէ ՖԲՀ կտրուածը ԳԴԲ խարսխին զուգահեռական է, ԳԲԴ–Բ մարմինը հատեալ կոն կը կոչուի։ Եթէ կ եւ Ա ուղիղ անկիւններն ունեցող ԱԲՀԿ տրապիզաձեւը անոր ԿԱ անշարժ կողման վրայ դառնայ, գծուած մարմինը հատեալ կոն մը կ'ըլլայ։ Ա.Կ անոր բաբյրոն-ներն ու ատանդն է, ԲԴ ու ՀՖ բոլորակները անոր խարիսխներն են, եւ ԲՀ՝ անոր ընդհատ բաբյրոն-ը։

7. Երկու կոներ նման են, երբ անոնց առանցքներն իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարսխաց տրամագծերը։

8. Եթէ Ս–ԱԲԳԴԵ կոնին խարսխին մէջ բազմանկիւն մը գծուի, ինչպէս ԱԲԳԴԵ, եւ կոնին Ս գագաթէն ՍԱ, ՍԲ, եւայլն գծերը քաշուին, Ս–ԱԲԳԴԵ բուրգը կոնին ներքին գծուած է կ'ըսուի։



9. Երբ կիսաբոլորակ մը, ինչպէս ԴԱԵ, անոր անշարժ ԴԵ տրամագծին վրայ կը դառնայ, գծուած մարմինը գունդ կը կոչուի. եւ անոր մակերեւոյթին ամէն կէտերը հաւասարապէս հեռու են գունդին Գ կեդրոնէն։



10. Կիսաբոլորակին դարձած ժամանակը անոր որեւէ հատիչը, ինչպէս ՖԳՀ կամ ԴԳՖ, մարմին մը կը գծէ որ գնդաձեւ հատիչ կը կոչուի։

11. Գնդոյ մը շառաւիղը այն գիծն է որ գնդոյն կեդրոնէն մինչեւ

մակերեւոյթին որեւէ մէկ կէտը կը քաշուի։ Տրամագիծը կամ տրամագիծը գիծ մըն է որ կեդրոնէն կ'անցնի, եւ որուն երկու ծայրերը մակերեւոյթին կը դպչին։

12. Կրնայ ապացուցուիլ թէ գնդոյ մը ամէն մէկ կտրուածը բոլորակ է. կեդրոնէն անցնող կտրուածը մեծ բոլորակ կը կոչուի, եւ կեդրոնէն չանցնողը՝ փոքր բոլորակ։

13. Մակարդակ մը գնդոյ մը շօշափէ, երբ անոնք միայն մէկ հատարակաց կէտ ունին։

14. Գնդոյ մը մակերեւոյթին այն մասը, որ երկու իրարու զուգահեռական մակարդակաց մէջտեղ կ'իյնայ, գօտի կը կոչուի. եւ մակարդակները անոր եզրերն են։ Երբ մակարդակաց մէկը շօշափող է, գօտին միայն մէկ խարիսխ ունի։


15. Գնդոյ մը այն մասը, որ երկու իրարու զուգահեռական մակարդակաց մէջ կ'իյնայ, գնդական հատուած կը կոչուի։ Մակարդակներն անոր եզրերուն կը կոչուին. եւ, եթէ մէկը շօշափող է, հատուածը միայն մէկ խարիսխ ունի։

16. Գօտւոյ մը կամ հատուածոյ մը բաբյրոն-ը այն գիծն է որ անոնց խարսխաց մէկէն միւսին ուղղահայեաց կը քաշուի։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գլանի մը կորնթարդ մակերեւոյթը հաւասար է անոր խարսխի շրջանակին, բազմապատկեալ անոր բաբյրոն-ովը։

Եթէ ԱԳ՝ Հ բարձրութիւն ունեցող գլանին խարսխի շառաւիղն է, գլանին կորնթարդ մակերեւոյթը հաւասար է շրջ. ԱԳ× Հ արտադրելոյն։



Գլանին խարսխին մէջ որեւէ կանոնաւոր բազմանկիւն մը գծէ, ինչպէս ԱԲԳ եւայլն, եւ անոր վրայ Հ

բարձրութիւնն ունեցող ուղիղ հատուածակողմ մը գծէ. այս հատուածակողմը գլանին ներքը գծուած կ'ըլլայ: Եթէ բազմանկեան կողմերը չարունակ աւելցընենք, վերջապէս անոր չրջագիծը գլանին չրջանակին հետ զուգընթաց կ'ըլլայ (Գիրք Ե. Նախ. Ը. Հետ. 2), եւ հատուածակողմին մակերեսոյթը հաւասար կ'ըլլայ գլանին մակերեսոյթին. բայց անոր կորնթարդ մակերեսոյթը հաւասար է անոր խարսխի չրջագծին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը (Գիրք Ե. Նախ. Ա.) . ուրեմն գլանի մը կորնթարդ մակերեսոյթը հաւասար է անոր խարսխի չրջանակին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գլանի մը ծաւալը հաւասար է անոր խարխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը:



Եթէ Է ցուցընէ գլանի մը բարձրութիւնը, եւ ԱԳ՝ անոր խարսխի չառաւիղը, անոր ծաւալը հաւասար կ'ըլլայ մակերես ԳԱ×Է արտադրելոյն:

Գլանին խարսխին մէջ գծէ որեւէ կանոնաւոր բազմանկիւն մը, ինչպէս ԱԲԴԵՑ, եւ անոր վրայ Է բարձրութիւնն ունեցող ուղիղ հատուածակողմ մը գծէ. այս հատուածակողմը գլանին ներքը գծուած կ'ըլլայ: Եթէ բազմանկեան կողմերը չարունակ աւելցընենք, վերջապէս անոր մակերեսը գլանին խարսխի մակերեսին հաւասար կ'ըլլայ, եւ անոր չրջագիծը՝ գլանին խարսխի չրջանակին (Գիրք Ե. Նախ. Ը. Հետ. 1 եւ 2). նաեւ անոր կորնթարդ մակերեսոյթը եւ գլանին մակերեսոյթը զուգընթաց կ'ըլլան. բայց հատուածակողման ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը (Գիրք Է. Նախ. ԺԲ.) . ուրեմն գլանի մը ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը:

Հետ. 1. Նոյն բարձրութիւնն ունեցող երկու գլան իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարիսխները, եւ հաւասար խարիսխ ունեցող երկու գլան՝ ինչպէս անոնց բարձրութիւնները:


Հետ. 2. Նման գլաններ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութեանց կամ անոնց խարսխաց տրամագծերուն խորանարդները: Քանզի խարիսխները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց տրամագծերուն քառակուսիները. եւ, որովհետեւ գլանները իրարու նման են, անոնց խարսխաց տրամագծերը իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները (Սահ. 2). ուստի խարիսխները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս բարձրութեանց քառակուսիները. ուրեմն խարիսխները՝ գլաններուն բարձրութիւններովը բազմապատկեալ, այսինքն գլաններուն ծաւալները, իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս բարձրութեանց խորանարդները:

Պ–բ. Եթէ գլանի մը խարսխին չառաւիղը շ ով ցուցընենք, եւ անոր բարձրութիւնը՝ բ ով, խարսխին մակերեսը կ'ըլլայ ¾×շ² (Գիրք Ե. Նախ. ԺԲ. Հետ. 2). եւ գլանին ծաւալը կ'ըլլայ ¾ շ²բ արտադրեալը:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Կոնի մը կոնքնաբար մակերեսոյթը հաւասար է անոր խարսխի չրջանակին, բազմապատկեալ չեղեալ անոր կողմնակի գծով:

Ս գագաթը, ՍՕ բարձրութիւնը, եւ ՍԱ չեղեալ բարձրութիւնն ունեցող Ս–ԱԲԳԴ կոնին կորնթարդ մակերեսոյթը հաւասար է չբ. ԱՕ×½ՍԱ արտադրեալին:



Կոնին խարսխին մէջ որեւէ կանոնաւոր բազմանկիւն մը գծէ, ինչպէս ԱԲԳԴ, եւ անոր վրայ ՍՕ բարձրութիւնն ունեցող ուղիղ բուրգ մը գծէ. այս բուրգը կոնին ներսը գծուած կ'ըլլայ։ Նաեւ Ս գագաթէն ՍԿ քաշէ բազմանկեան մէկ կողման ուղղահայեաց. ՍԿ է բուրգին չեզեալ բարձրութիւնը (Գիրք Է. Սահ. 15)։ Եթէ բազմանկեան կողմանց թիւը չարուննակ աւելցընենք, վերջապէս անոր չրջագիծը կոնին խարսխի չրջանակին հաւասար կ'ըլլայ, ՍԿ՝ ՍԱ ին, եւ բուրգին կորնթարդ մակերեւոյթը՝ կոնին մակերեւոյթին։ Բայց բուրգին մակերեւոյթը հաւասար է անոր խարսխի չրջանակին, բազմապատկեալ անոր չեզեալ բարձրութեան կիսովը (Գիրք Է. Նախ. Դ)։ ուրեմն կոնի մը կորնթարդ մակերեւոյթը հաւասար է անոր խարսխի չրջանակին, բազմապատկեալ անոր չեզեալ բարձրութեան կիսովը։


Պոր. Եթէ շղթ. Բ ցուցընէ կոնի մը չեզեալ բարձրութիւնը, եւ Շ՝ անոր խարսխի չառաւիղը, խարսխին չրջանակը կ'ըլլայ 2ֆ×Շ, եւ կոնին կորնթարդ մակերեւոյթը՝ 2ֆ×Շ×½ շղթ. Բ, կամ ֆ×Շ×շղթ. Բ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Հարթեալ կոնէ մը կոթնարդ մակերեւոյթը հաւասար է անոր շեղեալ բարձրութեանը, բազմապատկեալ անոր խարսխի չրջանակին կէսովը։

Բիւր–Դե հաւասար կոնին կորնթարդ մակերեւոյթը հաւասար է ½ (շղթ. ՕԱ+շղթ. ԴԴ)×ԱԴ արտադրելոյն։

Երկու խարսխաց մէջ գծէ երկու իրարու նման կանոնաւոր բազմանկիւններ այնպէս որ անոնց համանուն կողմերը զուգահեռական ըլլան, նաեւ համանուն




անկեանց գագաթները գծերով կապէ. այսպէս հաւասար կոնին ներսը հաւասար ուղիղ բուրգ մը գծուած կ'ըլլայ։ Եթէ բազմանկեանց կողմերուն թիւը չարունակ աւելցընենք, վերջապէս անոնց չրջագծերը՝ ԲԻԱ եւ ԵԿԴ չրջանակներուն հաւասար կ'ըլլան, հաւասար բուրգին ֆՀ չեզեալ բարձրութիւնը՝ հաւասար կոնին չեզեալ բարձրութեանը, նաեւ անոնց կորնթարդ մակերեւոյթները զուգընթաց կ'ըլլան։ Բայց հաւասար բուրգին կորնթարդ մակերեւոյթը հաւասար է անոր չեզեալ բարձրութեանը, բազմապատկեալ անոր խարսխաց չրջանակներուն գումարին կիսովը (Գիրք Է. Նախ. Դ. Հետ.)։ ուրեմն հաւասար կոնի մը կորնթարդ մակերեւոյթը հաւասար է անոր չեզեալ բարձրութեանը, բազմապատկեալ անոր խարսխաց չրջանակներուն գումարին կիսովը։

Հետ. ԱԴ գծին մէջտեղ Լ կէտէն ԼՔ, զիծը քաշէ ԱԲ ին զուգահեռական, նաեւ ԼՔ եւ ԴԲ՝ ԳՕ առանցքին զուգահեռական։ Որովհետեւ ԱԼ=ԼԴ, ուստի ԱՔ=ՔԲ (Գիրք Դ. Նախ. ԺԵ. Հետ. 2). ուրեմն ՓԼ=½(ՕԱ+ԴԲ)։ Բայց, որովհետեւ չրջանակներ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց չառաւիղները (Գիրք Ե. Նախ. ԺԱ.), շղթ. ՓԼ=½ (շղթ. ՕԱ+շղթ. ԴԲ). ուրեմն հարթեալ կոնէ մը կոթնարդ մակերեւոյթը հաւասար է անոր շեղեալ բարձրութեան, բազմապատկեալ անոր խարսխաց չրջանակներուն գումարին կիսովը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Կոնի մը ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեան երրորդ մասովը։



ՍՕ բարձրութիւնն ու ԱԲ–ԳԴԵՁ խարիսխն ունեցող կոնին ծաւալը հաւասար է մակ· ՕՍ×$\frac{1}{3}$ՍՕ արտադրելոյն։

Խարիսխին մէջ որևէ կանոնաւոր բազմանկիւն մը գծէ, ինչպէս ԱԲԳԴԵՁ, եւ անոր անկեանց գագաթներէն ՍԱ, ՍԲ, եւայլն գծերը քաշէ· այսպէս կոնին ներսը ուղիղ բուրգ մը գծուած կ'ըլլայ։ Եթէ անոր խարիսխին կողմերուն թիւը չարունակ աւելցուի, վերջապէս անոր չրջագիծը հաւասար կ'ըլլայ կոնին խարսխի չրջանակին, եւ բուրգն ու կոնը զուգընթաց կ'ըլլան· բայց բուրգին ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեան երրորդ մասովը (Գիրք Ը· Նախ· ԺԵ·)· ուրեմն կոնի մը ծաւալը հաւասար է անոր խարսխին, բազմապատկեալ անոր բարձրութեան երրորդ մասովը։

Հետ· 1· Կոն մը նոյն խարիսխն ու հաւասար բարձրութիւն ունեցող գլանին երրորդ մասն է· ուրեմն

Ա· Հաւասար բարձրութիւն ունեցող կոներ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարիսխները·

Բ· Հաւասար խարիսխ ունեցող կոներ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները·


Գ· Նման կոներ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց խարսխաց տրամագծերուն կամ անոնց բարձրութեանց նմանապղնները։

Հետ· 2· Կոնի մը ծաւալը հաւասար է համազօր խարիսխ եւ նոյն բարձրութիւնն ունեցող բուրգի մը ծաւալին։

Պոր· Եթէ Շ ցուցընէ կոնի մը խարսխի չառաւիղը, եւ Բ՝ անոր բարձրութիւնը, անոր ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{1}{3}$×Շ²×$\frac{1}{3}$Բ, կամ $\frac{1}{3}\frac{1}{3}$Շ²Բ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ· ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Հարթեալ կոնէ մը ծառուզը հաւասար է երեք կոներու ծառուզներուն գումարին, որոնց բազիսները հաւասար են հարթեալ կոնին բազիսներուն, և որոնց խոյերը են հարթեալ կոնին վերի խոյերը, անոր վերի խոյերը, և այն երկու խոյերուն միջեն հասնելու ուղիղներուն։



Ասեր–ԳԴ հատեալ կոնին ծաւալը հաւասար է $\frac{1}{3}$×ՕՓ (ԱՕ²+ԴՓ²+ԱՕ×ԴՓ)։

Երկու խարսխաց մէջ իրարու նման երկու կանոնաւոր բազմանկիւն գծէ, այնպէս որ անոնց հասմանուն կողմերը զուգահեռական ըլլան, եւ համանուն անկեանց գագաթները գծերով կապէ· այսպէս կոնին ներսը հատեալ ուղիղ բուրգ մը գծուած կ'ըլլայ։ Եթէ հատեալ բուրգին խարսխաց կողմերուն թիւը չարունակ աւելցընենք, վերջապէս անոր խարիսխները կոնին խարսխաց հաւասար կ'ըլլան, եւ հատեալ բուրգն ու հատեալ կոնը զուգընթաց կ'ըլլան· բայց հատեալ բուրգին ծաւալը հաւասար է երեք բուրգերուն ծաւալներուն գումարին, որոնց բարձրութիւնները հաւասար են հատեալ բուրգին բարձրութեանը, եւ որոնց խարիսխներն են անոր վերի խարիսխը, անոր վարի խարիսխը, եւ այն երկու խարսխաց միջին հասմեմատականը (Գիրք Ը· Նախ· ԺԸ·)· ուստի, որովհետեւ բոլորակի մը մակերեսը հաւասար է Շ²$\frac{1}{4}$ արտադրելոյն (Գիրք Ե· Նախ· ԺԲ· Հետ· 2), հատեալ կոնին ծաւալը հաւասար է սա կոներուն ծաւալներուն գումարին·

Ա· $\frac{1}{3}$ՕՓ×ՕԱ²$\frac{1}{4}$·


Բ· $\frac{1}{3}$ՕՓ×ՓԴ²$\frac{1}{4}$· եւ

Գ· $\frac{1}{3}$ՕՓ×ՕԱ×ՓԴ$\frac{1}{4}$· քանզի

ՕԱ×ՓԴ՝ ՕԱ² եւ ՓԴ² միջին համեմատականն է. ուրեմն հատեալ կոնին ծաւալը հաւասար է $\frac{1}{3}$π×ՕՓ×(ՕԱ²+ՓԴ²+ԱՕ×ՓԴ) արտադրելոյն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՅՏՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ ակլոտակ մը գնդոյ մը վրայ կ'անցնէ, կոչուածը բոլորակ է։



Գ կեդրոնն ունեցող գնդոյ կըտրուածը, ԱՄԲ, բոլորակ է։ Գ կեդրոնէն քաշէ ԳՕ՝ ԱՄԲ մակարդակին ուղղահայեաց. նաեւ քաշէ ԳՄ եւ ԳՄ գծերը կարուածքին ծայրի որեւէ երկու կէտերուն։

ԳՄ, ԳՄ, ԳԱ եւայլն գնդոյն շառաւիղներն ըլլալով, իրարու հաւասար են. ուստի հաւասարապէս հեռու են ԳՕ ուղղահայեացէն (Գիրք Ձ. Նախ. Ե. Հետ.). ուրեմն այս գծերը իրարու հաւասար են, եւ ԱՄԲ բոլորակ մըն է որուն կեդրոնը Օ կէտն է։

Հեփ. 1. Երբ կարուածը գնդոյն կեդրոնէն կ'անցնի, անոր շառաւիղը գնդոյն շառաւիղը կ'ըլլայ. ուրեմն գնդոյ մը մեծ բոլորակներն իրարու հաւասար են։

Հեփ. 2. Գնդոյ մը որեւէ երկու մեծ բոլորակայ մէկը միւսը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ. քանի անոնց հաւասարակաց հատման գիծը թէ բոլորակաց եւ թէ գնդոյն տրամագիծ է։

Հեփ. 3. Ամէն մեծ բոլորակ գունդը եւ անոր մակերեւոյթը երկերկու հաւասար մասանց կը բաժնէ. քանզի, եթէ մէկ մասը միւսին վրայ դրուի, երկուքը զուգընթաց կ'ըլլան. ապա թէ ոչ կը հետեւի թէ մակերեւոյթին վրայ կան կէտեր որ հաւասարապէս հեռու չեն կեդրոնէն։


Հեփ. 4. Գնդոյ մը շառաւիղը, որ փոքր բոլորակի մը ուղղահայեաց է, այն բոլորակին կեդրոնէն կ'անցնի։

Հեփ. 5. Երկու փոքր բոլորակներէն մեծը այն է որուն մակարդակը մօտ է գնդոյն կեդրոնին։ Յայտնի է թէ երբ ԳՕ կը մեծնայ, ԱԲ տրամագիծը կը պզտիկնայ։

Հեփ. 6. Մեծ բոլորակ մը կրնայ քաշուիլ որ գնդոյ մը մակերեւոյթի որեւէ երկու կէտերէն անցնի. քանի այն երկու կէտերն եւ գնդոյն կեդրոնը երեք կէտ կ'ըլլան որոնք մակարդակին դիրքը կ'որոշեն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՅՏՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ուրեք մակլոտակ որ շոշափէ մը ծայրը շոշափէն ուղղահայեաց կը տանի, շօշափէ գնդոյն։




Եթէ ՖԱԿ մակարդակը Ա կէտին վրայ ուղղահայեաց է ՕԱ շառաւիղին, մակարդակը գնդոյն չշօշափող է։

Մակարդակին որեւէ մէկ կէտին, ինչպէս Մ, ՕՄ գիծը քաշէ։ ՕԱՄ ուղղանկիւն եռանկիւն է. ուստի ՕՄ մեծ է ՕԱ էն. ուրեմն Մ կէտը գնդէն դուրս է, եւ, որովհետեւ գունդը եւ մակարդակը միայն Ա հասարակաց կէտն ունին, մակարդակը գնդոյն չշօշափող է Ա կէտին վրայ (Սահ. 13)։

Պոր. Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ երկու գունդ իրարու չշօշափող են, երբ անոնց կեդրոնները իրարմէ եղած հեռաւորութիւնը հաւասար է անոնց շառաւիղներուն թէ գումարին եւ թէ տարբերութեանը. եւ անտաեն անոնց կեդրոններն ու շօշափման կէտը միեւնոյն ուղիղ գծին վրայ են։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ԱՌՈՒՄՆ

Երբ կանոնաւոր կիսաբազմանկիւն մը անոր կեդրոնին և ուղիղ եզիս անկեանց վերայեն անցնող գծէ մը վերայ կը դառնայ, անոր շրջագծին գծած մակերեւոյթը հաւասար կ'ըլլայ ԱՖ առանցքին, բազմապատկեալ ներսը գծուած բոլորակին շրջանակովը։



Որեւէ մէկ կողման ծայրերէն, ինչպէս Դ եւ Է, եկ ուղիղ Դի քաշէ ԱՖ ին ուղղահայեաց. նաեւ Օ կեդրոնէն ՕՆ քաշէ Դէ ին ուղղահայեաց. ՕՆ ներսը գծուած բոլորակին մէկ չառաւիղն է (Գիրք Ե. Նախ. Բ.)։ Արդ, երբ կիսաբազմանկիւնը անոր առանցքին վրայ կը դառնայ, Դէ կողման գծած մակերեւոյթը հաւասար է ԴԷ×ՀԸ. ՆՄ (Նախ. Դ. Հետ.)։ Բայց, որովհետեւ ԵԴ եւ ՕՆՄ եռանկիւնները իրարու նման են (Գիրք Դ. Նախ. ԻԱ.), ԵԴ:ԵՌ կամ ՀԻ::ՕՆ:ՆՄ ::ՀԸ. ՕՆ:ՀԸ. ՆՄ. ուստի

ԵԴ×ՀԸ. ՆՄ=ՀԻ×ՀԸ. ՕՆ.

Եւ, որովհետեւ նոյն բանը կրնայ ապացուցուիլ որեւէ մէկ կողման նկատմամբ, յայտնի է թէ ամբողջ շրջագծին գծած մակերեւոյթը հաւասար է (ՖՀ+ՀԻ+ԻՓ+ՓՊ+ՊԱ)×ՀԸ. ՕՆ կամ ԱՖ×ՀԸ. ՕՆ արտադրելոյն։

Հետ. Շրջագծին որեւէ մասին, ինչպէս ԵԴ ին, գծած մակերեւոյթը հաւասար է անոր ծայրերէն առանցքին ուղղահայեաց քաշուած երկու գծերուն իրարմէ հեռաւորութեանը, բազմապատկեալ ներսը գծուած բոլորակին շրջանակովը։ Քանզի ԴԵ ին գծածը հաւասար է ՀԻ×ՀԸ. ՕՆ արտադրելոյն, եւ ԴԳ ին գծածը՝ ԻՓ×ՀԸ. ՕՆ արտադրելոյն. ուրեմն ԵԳ ին գծածը հաւասար է (ՀԻ+ԻՓ)×ՀԸ. ՕՆ կամ ՀՓ×ՀԸ. ՕՆ արտադրելոյն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գնդոյ մը մակերեսոյթը հաւասար է անոր պրամիդին, բազմապատկեալ գծէ բոլորակի մը ՀԸ շառաւիղին քառակուսիով։



Աբդոնէ կիսաբոլորակին մէջ որեւէ կանոնաւոր կիսաբազմանկիւն մը գծէ, եւ Օ կեդրոնէն անոր մէկ կողման ուղղահայեաց ՕՖ գիծը քաշէ։ Կիսաբոլորակին ու կիսաբազմանկիւնը Ա՛Ե առանցքին վրայ դարձուր. Աբդոնէ կէս շրջանակը գնդոյ մը մակերեւոյթը կը գծէ (Սահ. 9). եւ կիսաբազմանկեան շրջագիծը կը գծէ մակերեւոյթ մը որ հաւասար է Ա՛Ե×ՀԸ. ՕՖ արտադրելոյն (Նախ. Թ.)։

Բայց, եթէ բազմանկեան կողմերուն թիւը շարունակ աւելցընենք, վերջապէս Աբդոնէ շրջագիծը եւ Աբդոնէ շրջանակը զուգընթաց կ'ըլլան, եւ ՕՖ հաւասար կ'ըլլայ ՕԲ չառաւիղին. ուրեմն գնդոյն մակերեւոյթը հաւասար է Ա՛Ե×ՀԸ. ՕԲ արտադրելոյն։

Հետ. 1. Որովհետեւ մեծ բոլորակի մը մակերեսը հաւասար է անոր շրջանակին, բազմապատկեալ կամ անոր չառաւիղին կիսովը եւ կամ անոր տրամագծին մէկ քառորդովը (Գիրք Ե. Նախ. ԺԲ.), կը հետեւի թէ գնդոյ մը մակերեսոյթը հաւասար է անոր ծէ բոլորակաց ընդին. այսինքն 4 Ֆ×ՕԱ² արտադրելոյն (Գիրք Ե. Նախ. ԺԲ. Հետ. 2)։

Հետ. 2. Գնդոյ մը մակերեսոյթը հաւասար է անոր բոլոր բոնեանը, բազմապատկեալ ծէ բոլորակի մը շրջանակովը։

Թանզի, երբ ԱԲԳԴ կիսաբազմանկիւնը անոր առանցքին վրայ կը դառնայ, անոր չրջագծին որեւէ մէկ մասը, ինչպէս ԲԳ+ԳԴ, կը գծէ մակերեւոյթ մը որ հաւասար է եզ×չրջ. օՖ արտադրեալին (Նախ. Թ. Հետ.): Բայց, եթէ բազմանկեան կողմերուն թիւը չարուներ աւելցուի, ԲԳ+ԳԴ հաւասար կ'ըլլայ ԲԴ աղեղին, օՖ՝ օԱ.ի, եւ ԲԳ+ԳԴ կողմերուն ու ԲԴ աղեղին գրծած մակերեւոյթները կը զուգընթանան. ուրեմն գօաւոյն մակերեւոյթը հաւասար է եզ×չրջ. օԱ արտադրեալին:




Հետ. 3. Թէեւ գօաին միայն մէկ խարիսխ ունենայ, բայց եւ այնպէս անոր մակերեւոյթը հաւասար է անոր բարձրութեանը, բազմապատկեալ մեծ բոլորակի մը չրջանակովը:

Հետ. 4. Նոյն գնդոյն կամ հաւասար գնդաց որեւէ երկու գօաինները իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց բարձրութիւնները, եւ որեւէ գօաի մը գնդոյն ամբողջ մակերեւոյթին այնպէս կը համեմատի, ինչպէս անոր բարձրութիւնը՝ գնդոյն տրամագծին:


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ԱՌՈՒՄՆ

Երբ նոյն քաշչբուիլնան ու նոյն խոչոխն առնչող երանկիւն մը և ուղղանկիւն մը իրենց հաւասարապատ խոչոխին վրայ դիպուելու կը դառնան, երանկեան գծած մարմինը ուղղանկեան գծած գլանին երրորդ մասն է:



ԱԲԳ եռանկեան գագաթէն՝ Ա դիծը քաշէ ԲԳ խարսխին ուղղահայեաց:

Երբ ԱԲԳ եռանկիւնը եւ ԲԳԵՖ ուղղանկիւնը ԲԳ խարսխին վրայ կը դառնան, ԱԲԳ ին գծած կոնը հաւասար կ'ըլլայ ԲԴԱՖ ին գծած գլանին երրորդ մասին (Նախ. Ե. Հետ. 1). նաեւ ԱԴԳ ին գծած կոնը հաւասար կ'ըլլայ ԱԴԵ ին գծած գլանին երրորդ մասին. ուրեմն երկու կոնեբուն գումարը, կամ ԱԲԳ եռանկեան գծած մարմինը, հաւասար կ'ըլլայ երկու գլաններուն գումարին երրորդ մասին, այսինքն, ԲԳԵՖ ուղղանկեան գծած գլանին երրորդ մասին:




Երբ Ա ուղղահայեացը եռանկեան գագաթի կողմը կ'իյնայ, ԱԲԳ ին գծածը հաւասար է ԱԲԳ եւ ԱԴԳ եռանկեանց գծած կոներուն տարբերութեանը. եւ ԲԳԵՖ ին գծած գլանը՝ ԱՖԲԳ եւ ԱԵԳԴ ուղղանկիւնիներուն գծած գլաններուն տարբերութեանը. բայց եւ այնպէս յայտնի է թէ եռանկեան գծածը ուղղանկեան գծածին երրորդ մասն է:

Պոր. ԱԴ՝ չառաւիղն ունեցող բոլորակին մակերեսը հաւասար է ¼×ԱԴ² արտադրեալին. ուրեմն ԲԳԵՖ ին գծած գլանին ծաւալը հաւասար է ¼×ԱԴ²×ԲԳ արտադրեալին. եւ ԱԲԳ եռանկեան գծած մարմնոյն ծաւալը՝ ⅓¼×ԱԴ²×ԲԳ արտադրեալին:


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ԱՌՈՒՄՆ

Երբ եռանկիւն մը՝ նոյն մակերեսին վրայ եղող և անկիւնոյ մէկուն գագաթին անցնող գիծ մը վրայ կը դառնայ, եռանկեան գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է եռանկեան մակերեսին, բազմապատկեալ այն գագաթէն երկու եղբորդովը:



Եթէ ԱԲԳ եռանկիւնը նոյն մակարդակին վրայ եղող ԳԴ գիծին վրայ դառնայ, անոր գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար կ'ըլլայ եռանկեան մակերեսին, բազմապատ-

կեալ ԱԲ կողման ի միջին կէտին գծած չորանակին երկու երրորդումը : ԱԲ կողմը երկնցուր մինչեւ որ ԳԴ առանցքին զպչի . նաեւ ԴԱ լին չարունակութեանը ուղղահայեաց՝ ԳՓ գիծը , եւ ԳԴ լին ուղղահայեաց ՄԱ ու ԲՆ գծերը քաշէ :




Երբ ԳԱԴ եռանկիւնը ԳԴ լին վրայ կը դառնայ , անոր գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{1}{3}\pi\times$ԱՄ$^2\times$ԳԴ արտադրելոյն (Նախ . ԺԱ . Պար .) . եւ ԳԲԴ լին գծած ծինը՝ $\frac{1}{3}\pi\times$ԲՆ$^2\times$ԳԴ արտադրելոյն . ուրեմն անոնց տարբերութիւնը , այսինքն , ԱԲԳ լին գծած մարմնոյն ծաւալը , հաւասար է $\frac{1}{3}\pi$ (ԱՄ^2—ԲՆ^2)$\times$ԳԴ արտադրելոյն :


ԱԲ կողման ի միջին կէտէն ԳԴ գծին ուղղահայեաց ԻՔ քաշէ . նաեւ ԲՕ՝ ԳԴ լին զուգահեռական : ԱՄ+ԲՆ =2 ԻՔ (Գիրք Դ . Նախ . Է .) . եւ ԱՄ—ԲՆ=ԱՕ . ուստի (ԱՄ+ԲՆ)$\times$(ԱՄ—ԲՆ) , կամ ԱՄ^2—ԲՆ^2=2ԻՔ$\times$ԱՕ (Գիրք Դ . Նախ . ԺԸ .) . ուրեմն վերոյիշեալ ծաւալը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ԻՔ$\times$ԱՕ$\times$ԳԴ արտադրելոյն : Բայց , ուրմէհետեւ ԱԲՕ եւ ԳԴՓ եռանկիւնները իրարու նման են ,

ԱՕ : ԳՓ : : ԱԲ : ԳԴ . ուստի ԱՕ$\times$ԳԴ=ԳՓ$\times$ԱԲ . բայց ԳՓ$\times$ԱԲ արտադրեալը ԱԲԳ եռանկեան կրկնապատիկն է . ուստի ԱՕ$\times$ԳԴ արտադրեալը ԱԲԳ եռանկեան մակերեսին կրկնապատիկն է , եւ ԱԲԳ եռանկեան գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{4}{3}\pi\times$ԱԲԳ$\times$ԻՔ կամ ԱԲԳ$\times\frac{2}{3}$ շրջ . ԻՔ արտադրելոյն . քանզի շրջ . ԻՔ եւ 2$\pi\times$ԻՔ արտադրեալներն իրարու հաւասար են . ուրեմն ԱԲԳ եռանկեան գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է եռանկեան մակերեսին , բազմապատկեալ ի կէտին գծած շրջանակին երկու երրորդովը :

Հետ . երբ ԱԳ=ԲԳ , ԳԻ ուղղահայեաց կ'ըլլայ ԱԲ լին , ԱԲԳ եռանկեան մակերեսը հաւասար կ'ըլլայ ԱԲ$\times\frac{1}{2}$ԳԻ արտադրելոյն , եւ $\frac{4}{3}\pi\times$ԱԲԳ$\times$ԻՔ ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{2}{3}\pi\times$ԱԲ$\times$ԻՔ$\times$ԳԻ : Բայց ԱԲՕ եւ ԳԻՔ եռանկիւնները իրարու նման են . ուստի ԱԲ : ԲՕ : : ԳԻ : ԻՔ , եւ ԱԲ$\times$ԻՔ=ՄՆ$\times$ԳԻ . ուրեմն ԱԲԳ երկկողմնատոյզ եռանկեան գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ԳԻ$^2\times$ՄՆ արտադրելոյն . այսինքն այն արտադրեալոյն որուն բազմապատկիչները են π ին երկու երրորդը , ջոջիկին խոշոր շառաւիղ ուղղահայեաց գծին հատածը , և խոշոր առանցքին ուղղահայեաց հատած գծերուն երկուքին հետ ունեցած հետեւութիւնը :




Պար . Վերոյիշեալ ապացուցուածին մէջ կ'ենթադրուի թէ ԱԲ կողմը չարունակութեամբ առանցքին կը դպչի . բայց հետեւութիւնը ճշմարիտ է , երբ ԱԲ կողմը առանցքին զուգահեռական է :



Գանգի ԱՄՆԲ լին գծած գլանին ծաւալը հաւասար է $\pi\times$ԱՄ$^2\times$ՄՆ արտադրելոյն . ԱԳՄին գծած կոնին ծաւալը հաւասար է $\frac{1}{3}\pi\times$ԱՄ$^2\times$ԳՄ արտադրելոյն . եւ ԲԳՆ լին գծած կոնին ծաւալը հաւասար է $\frac{1}{3}\pi\times$ԱՄ$^2\times$ԳՆ արտադրելոյն : Գումարելով առաջին երկու արտադրեալները , եւ գումարին հանելով երրորդը կ'ունենանք ԱԲԳ լին գծած մարմնոյն ծաւալը , որ հաւասար է $\pi\times$ԱՄ^2 (ՄՆ+$\frac{1}{3}$ԳՄ—$\frac{1}{3}$ԳՆ) արտադրելոյն . եւ , որովհետեւ ԳՆ—ԳՄ=ՄՆ , այս արտադրեալը կրնայ վերածուիլ $\pi\times$ԱՄ$^2\times\frac{2}{3}$ՄՆ կամ $\frac{2}{3}\pi\times$ԳՓ$^2\times$ՄՆ արտադրելոյն , որ հետեւութեան ցուցածն է :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ԱՌՈՒՄՆ

Երբ կանոնաւոր կիսաբազմանկիւն մը անոր կեդրոնին և օրթ-ի երկու անկեանց փոխադիրներէն անցնող ջնջի մը վրայ կը դառնայ, անոր ջնջած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է կոնի մը ծաւալին որուն խարխոխն է բազմանկեան ներսը ջնջած բոլորակը, և բարձրութիւնը՝ բազմանկեան առանցքին երկայնադարձը։




Եթէ ՖԱԲԳԴԿ կանոնաւոր կիսաբազմանկիւնը՝ ՖԿ գծին վրայ դառնայ, անոր գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար կ'ըլլայ $\frac{1}{3}$ բազ. ՕԻ×2ՖԿ արտադրեալին։ ՕՖԱ, ՕԱԲ, ՕԲԳ, եւայլն եռանկիւնները երկկողմնապղպեղ եւ իրարու հաւասար են, եւ կեդրոնէն անոնց ՖԱ, ԱԲ, եւայլն խարիսխներուն ուղղահայեաց քաշուած գծերը իրարու՝ եւ ներսը գծուած բոլորակի ՕԻ շառաւիղին հաւասար են։

Արդ ՕԱԲ-ին գծած մարմնոյն ծաւալն է $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$ՄՆ արտադրեալը (նախ. ԺԲ. Հետ.)։ ՕՖԱ-ին գծածինը՝ $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$ՖՄ։ ՕԲԳ-ին գծածինը՝ $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$ՆՕ, եւայլն։ ուստի գծուած ամբողջ մարմնոյն ծաւալն է $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ^2(ՖՄ+ՄՆ+ՆՕ+ՕՊ+ՊԿ), կամ $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$ՖԿ, կամ $\frac{1}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$2ՖԿ արտադրեալը։ Բայց $\pi\times$ՕԻ^2 ներսը գծուած բոլորակին մակերեսն է (Գլրք Ե. Նախ. ԺԲ. Հետ. 2)։ ուրեմն այս ծաւալը հաւասար է կոնի մը ծաւալին որուն խարիսխն է բոլորակ ՕԻ, եւ բարձրութիւնը՝ 2ՖԿ

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գնդոյ մը ծաւալը հաւասար է անոր մակերեսոյթին, բազմապատիկ անոր շառաւիղին ուղղ երկրորդովը։



ԱԲԴԵ կիսաբոլորակին ներսը որեւէ կանոնաւոր կիսաբազմանկիւն մը գծէ, ինչպէս ԱԲԴԵ, եւ ԱԲ կողման ուղղահայեաց ՕԻ գիծը քաշէ։ ՕԻ՝ բազմանկեան ներսը գծուած բոլորակին մէկ շառաւիղն է։

Եթէ կիսաբոլորակը եւ կիսաբազմանկիւնը Ա-ն առանցքին վրայ դառնան, առաջինը գունդ մը պիտի գծէ, եւ երկրորդը՝ մարմին մը որուն ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$ԵԱ արտադրեալը (Նախ. ԺԴ.)։ Բայց, եթէ բազմանկեան կողմանց թիւը չարունակ աւելցուի, վերջապէս անոր շրջագիծը բոլորակին շրջանակին հետ զուգընթաց կ'ըլլայ, ՕԻ հաւասար կ'ըլլայ ՕԱ-ին, եւ բազմանկեան գծածին ծաւալը՝ գնդոյն ծաւալին. ուստի գնդոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԱ$^2\times$ԵԱ արտադրեալին, որ, ԵԱ-ին տեղ անոր հաւասարը, 2ՕԱ, դնելով, կ'ըլլայ $\frac{4}{3}\pi\times$ՕԱ$^2\times$ՕԱ կամ $4\pi\times$ՕԱ$^2\times\frac{1}{3}$ՕԱ։ Բայց $4\pi\times$ՕԱ^2 հաւասար է գնդոյն մակերեսոյթին (Նախ. ԺԱ. Հետ. 1). ուրեմն գնդոյ մը ծաւալը հաւասար է անոր մակերեսոյթին, բազմապատկեալ անոր շառաւիղին մէկ երրորդովը։

Պոր. 1. Ա-ին գնդական հատկէ ծաւալը հաւասար է անոր խարխոխը կազմող գօտւոյն, բազմապատկեալ շառաւիղին մէկ երրորդովը։

Ինանպէ, զորօրինակ, ԱԲԴԵ բազմանկեան ՕԱԲ երկկողմնապղպեղ եռանկեան գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ՕԻ$^2\times$ԱՖ արտադրեալին (Նախ. ԺԲ. Հետ.). եւ, երբ բազմանկիւնը, անոր կողմանց թիւն աւելցնելով, բոլորակին հաւասար կ'ըլլայ, ՕԱԲ մասը ԱՕԲ հատիչը կ'ըլլայ, ՕԻ հաւասար կ'ըլլայ ՕԱ-ին, եւ գծուած մարմինը գնդական հատիչ մը կ'ըլլայ, որուն ծաւալը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ԱՕ$^2\times$ԱՖ կամ $2\pi\times$ԱՕ$\times$ԱՖ$\times\frac{1}{3}$ԱՕ արտադրեալին։ Բայց $2\pi\times$ԱՕ մեծ բոլորակի մը մակերեսն է (Գլրք Ե. Նախ. ԺԲ. Հետ. 2), եւ այս արտադրեալը ԱՖ-ով բազմապատկուելով գնդական


հատչի խաբիսիսը կազմող գօտւոյն մակերեսն է (Նախ. ժ. Հետ. 2). ուրեմն գնդական հատչին ծաւալը հաւասար է անոր խաբիսիսը կազմող գօտւոյն, բազմապատկեալ չառաւիղին մէկ երրորդովը։

Պոր. 2. Որովհետեւ Շ չառաւիղն ունեցող գնդոյն մակերեսոյթն է $4\frac{1}{2}Շ^2$ (Նախ. ժ. Հետ. 1), կը հետեւի թէ գունդերու մակերեսոյթներ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց չառաւիղներուն քառակուսիները. եւ, որովհետեւ անոնց ծաւալներն իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց մակերեսոյթները բազմապատկեալ անոնց չառաւիղներովը, կը հետեւի թէ գնդերու ծաւալք երբու այնպէս կը հաղորդին, ինչպէս անոնց շառաւղաց կամ տրամագծից խորանարդքերը։

Պոր. 3. Եթէ Շ ցուցընէ գնդոյ մը չառաւիղը, գնդոյն մակերեսոյթը կ'ըլլայ $4\frac{1}{2}×Շ^2$, եւ անոր ծաւալը՝ $4\frac{1}{2}×Շ^2×\frac{1}{3}Շ$, կամ $\frac{4}{3}\frac{1}{2}×Շ^3$։ Եթէ S ցուցընէ գնդոյն տրամագիծը, կ'ունենանք $Շ=\frac{1}{2}S$, եւ $Շ^3=\frac{1}{8}S^3$. ուրեմն գնդոյն ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{4}{3}\frac{1}{2}×\frac{1}{8}S^3$, կամ $\frac{1}{6}\frac{1}{2}×S^3$։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գնդոյ մը մակերեսոյթը անոր գօտւոյն ճիշտ կէսին ամբողջ մակերեսոյթին այնպէս կը հաղորդի, ինչպէս երկու երրորդ։ անոնց ծաւալներն ալ նոյն հաղորդութեան ունին։



Երբ ՊՓ առանցքին վրայ ՊՄՓ կիսաբոլորակը, եւ ՊԴԱՓ ուղղանկիւնը կը դառնան, առաջինը՝ գունդ մը, եւ երկրորդը գնդոյն գօտւոյն գլան մը կը գծէ։

Գլանին բարձրութիւնը հաւասար է գնդոյն ՊՓ տրամագծին. նաեւ գլանին խաբիսիսը գնդոյն մէկ մեծ բոլորակին հաւասար է, քանզի գունդն ուղղանկիւնին

գլանին խաբիսիսը նոյն տրամագիծն ունին. ուստի գլանին կորնթարդ մակերեսոյթը հաւասար է մեծ բոլորակին չորքապատկեալ, բազմապատկեալ անոր տրամագծովը (Նախ. Ա.). ուրեմն գլանին կորնթարդ մակերեսոյթը հաւասար է գնդոյն մակերեսոյթին (Նախ. ժ.)։

Բայց գնդոյն մակերեսոյթը հաւասար է չորս մեծ բոլորակներու. ուստի գլանին կորնթարդ մակերեսոյթը հաւասար է չորս մեծ բոլորակներու. բայց, որովհետեւ գլանին խաբիսիսները հաւասար են երկու մեծ բոլորակներու, գլանին ամբողջ մակերեսոյթը հաւասար է վեց մեծ բոլորակներու. ուրեմն գնդոյն մակերեսոյթը գլանին ամբողջ մակերեսոյթին այնպէս կը համեմատի, ինչպէս չորսը՝ վեցին, կամ ինչպէս երկուքը՝ երեքին։


Դարձեալ, որովհետեւ գլանին խաբիսիսը հաւասար է գնդոյն մէկ մեծ բոլորակին, եւ անոր բարձրութիւնը՝ գնդոյն տրամագծին, գլանին ծաւալը հաւասար է մեծ բոլորակի մը, բազմապատկեալ անոր տրամագծովը (Նախ. Բ.)։ Բայց գնդոյն ծաւալը հաւասար է չորս մեծ բոլորակներու, բազմապատկեալ չառաւիղին մէկ երրորդովը (Նախ. ԺԳ.). այսինքն հաւասար է մէկ մեծ բոլորակի, բազմապատկեալ թէ չառաւիղին չորս երրորդովը, թէ տրամագծին երկու երրորդովը. ուրեմն գնդոյն ծաւալը գլանին ծաւալին այնպէս կը համեմատի, ինչպէս երկուքը՝ երեքին։

Պոր. Երբ գնդոյ մը գօտւոյն որեւէ բազմանիստ մը կը գծուի, կրնանք բազմանիստը նկատել իբրեւ քանի մը բուրգերէ կազմուած, որոնց ամէն մէկուն խաբիսիսը բազմանիստին մէկ երեսն է, որոնց գագաթներն գնդոյն կեդրոնն են, եւ որոնց հաւասարակաց բարձրութիւնը գնդոյն չառաւիղն է. ուստի բոլոր բուրգերուն կամ բազմանիստին ծաւալը հաւասար է բազմանիստին մակերեսոյթին, բազմապատկեալ գնդոյն չառաւիղին մէկ երրորդովը. ուրեմն որեւէ գօտւոյն գծուած բազմանիստին ծաւալը գնդոյն ծաւալին այնպէս կը համեմատի, ինչպէս բազմանիստին մակերեսոյթը՝ գնդոյն մակերեսոյթին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ բևեռական մը ունի հատուածը բևեռական այն հատուածն է որ ներս կը գտնուի մարմնոյն ծաւալին, հատուածին գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{1}{3}$ի անգամ շրջագծին, բազմապատկեալ շրջանի հատուածին ու շրջին ձեղքագրչէն, բազմապատկեալ շրջանի հատուածին ու շրջին ձայրերէն առանցքին ուղղահայեաց հատուածի գծած գծերուն քառակուսիներուն գումարովը։

Գ կեդրոնէն ԴՄԲ հատուածին շրջին ուղղահայեաց ԳԻ գիծը, եւ շրջին ձայրերէն ՕԳ առանցքին ուղղահայեաց ԲԵ ու ԴՖ գծերը քաշէ. նաեւ քաշէ ԳԲ եւ ԳԴ շառաւիղները։




Եթէ ԱԲՄԴԳ դառնայ ԱԳ ին վրայ, ԲԴԳ հատուածին գծած մարմնոյն ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{2}{3}\pi\times$ԳԲ$^2\times$ԵՖ արտադրեալը (Նախ. ԺԴ. Պար. 1)։ Բայց ԴԳԲ երկկողմնապտոյտ եռանկեան գծածինը կ'ըլլայ $\frac{2}{3}\pi\times$ԳԻ$^2\times$ԵՖ (Նախ. ԺԲ. Հետ.). ուստի ԲՄԴ հատուածին գծածինը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ԵՖ (ԳԲ^2—ԳԻ^2)ի։ Արդ, որովհետեւ ԳԻԲ ուղիղ անկիւն է, ԳԲ^2—ԳԻ^2=ԲԻ^2=$\frac{1}{4}$ԲԴ^2. ուրեմն ԲՄԴ հատուածին գծած մարմնոյն ծաւալը հաւասար է $\frac{2}{3}\pi\times$ԵՖ$\times\frac{1}{4}$ԲԴ^2 կամ $\frac{1}{6}\pi\times$ԲԴ$^2\times$ԵՖ արտադրեալին։

Պոր. ԲՄԴ հատուածին գծած մարմինը ԲԴ տրամագիծն ունեցող գնդոյն այնպէս կը հաւնիանայ, ինչպէս $\frac{1}{6}\pi\times$ԲԴ$^2\times$ԵՖ եւ $\frac{1}{6}\pi\times$ԲԴ^3 արտադրեալները, այսինքն, ինչպէս ԵՖ եւ ԲԴ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Որեւէ գնդական հատուածին ծաւալը հաւասար է անոր խոնխոյ գոմարին կէսին, բազմապատկեալ անոր բոլոյնութեամբը, այսինքն այն գնդոյն ծաւալը՝ որուն տրամագիծը հաւասար է հատուածին բոլոյնութեանը։

ԲՄԴ աղեղան ձայրերէն ԱԳ չափուած ուղղահայեաց ԲԵ եւ ԴՖ գծերը քաշէ։ եթէ ԲՄԴԵ դառնայ ԵՖ առանցքին վրայ, ԲՄԴ հատուածին գծած մարմնոյն ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{1}{6}\pi\times$ԲԴ$^2\times$ԵՖ արտադրեալը (Նախ. ԺԶ.)։ նաեւ ԲԴՖԵ տրապիզաձեւին գծած հատեակ բուրգին ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{1}{3}\pi\times$ԵՖ (ԲԵ^2+ԴՖ^2+ԲԵ$\times$ԴՖ) արտադրեալը (Նախ. Զ.)։ եւ այս երկու արտադրեալներուն գումարը, այսինքն գնդական հատուածին ծաւալը, կ'ըլլայ $\frac{1}{6}\pi\times$ԵՖ (2ԲԵ^2+2ԴՖ^2+2ԲԵ$\times$ԴՖ+ԲԴ^2) արտադրեալը։ Բայց ԵՖ ին զուգահեռական Բ0 քաշելով կ'ունենանք Դ0=ԴՖ—ԲԵ. ուստի Դ0^2=ԴՖ^2—2ԴՖ$\times$ԲԵ+ԲԵ^2 (Գիրք Գ. Նախ. Թ.), եւ ԲԴ^2=Բ0^2+Դ0^2=ԵՖ^2+ԴՖ^2—2ԴՖ$\times$ԲԵ+ԲԵ^2)։ Այս արժէքը դնելով ԲԴ^2 ին տեղը եւ վերածելով դնդական հատուածին ծաւալը ցուցընող արտադրեալը՝ կ'ունենանք $\frac{1}{6}\pi\times$ԵՖ (3ԲԵ^2+3ԴՖ^2+ԵՖ^2)։



Այս արտադրեալը սա երկու մասանց կրնանք բաժնել. $\frac{1}{6}\pi\times$ԵՖ (3ԲԵ$^2\times$3ԴՖ^2) կամ ԵՖ$\times\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$ԲԵ^2+$\frac{1}{2}$ԴՖ^2), եւ $\frac{1}{6}\pi\times$ԵՖ^3։ Բայց առաջին մասն է հատուածին երկու խարխաց գումարին կէսը, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը. եւ երկրորդը կը ցուցընէ ԵՖ տրամագիծը ունեցող գնդոյն ծաւալը. ուրեմն որեւէ բևեռական հատուածի մը ծաւալը հաւասար է անոր խոնխոյ գոմարին կէսին, բազմապատկեալ անոր բոլոյնութեամբը, այսինքն այն գնդոյն ծաւալը՝ որուն տրամագիծը հաւասար է հատուածին բոլոյնութեանը։

Հետ. երբ հատուածը միայն մէկ խարխախ ունի, ինչպէս ԲԵ=0, եւ էՖ կ'ըլլայ ԱՖ. նաեւ հատուածին ծաւալը կ'ըլլայ ԱՖ$\times\frac{1}{2}\pi\times$ԴՖ^2 եւ $\frac{1}{6}\pi\times$ԱՖ^3 արտադրեալները. ուրեմն մէկ խոնխոյ ունեցող գնդական հատուածի մը ծաւալը հաւասար է նոյն խոնխոյն ու բոլոյնութեան ունեցող գլանին ծաւալին կէսին, այսինքն այն գնդոյն ծաւալը՝ որուն տրամագիծը հաւասար է հատուածին բոլոյնութեանը։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՐԱՊՈՄ.

Ա. Եթէ գլանի մը խարսխի չառաւիղը՝ շ ոտ, եւ ա-նոր բարձրութիւնը բ ոտ ցուցընենք, գլանին ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{2}{3}\pi\times շ^2\times բ$ արտադրեալը:

Բ. Եթէ կոնի մը խարսխի չառաւիղը՝ շ ոտ, եւ անոր բարձրութիւնը բ ոտ ցուցընենք, կոնին ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{1}{3}\pi\times շ^2\times բ$ արտադրեալը:

Գ. Եթէ հատեալ բուրգի մը խարսխաց չառաւիղները՝ շ եւ շ' ոտ, եւ անոր բարձրութիւնը բ ոտ ցուցընենք, հատեալ բուրգին ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{1}{3}\pi\times բ\ (շ^2+շ'^2+շ\times շ')$ արտադրեալը:

Դ. Եթէ գնդոյ մը չառաւիղը շ ոտ ցուցընենք, անոր ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{4}{3}\pi\times շ^3$ արտադրեալը:

Ե. Եթէ գնդական հատչի մը չառաւիղը՝ շ ոտ, եւ անոր խարիսխը կազմող գօտւոյն բարձրութիւնը բ ոտ ցուցընենք, հատչին ծաւալը կ'ըլլայ $\frac{2}{3}\pi\times շ^2\times բ$ արտադրեալը:

Զ. Եթէ գնդական հատուածի մը խարիսխները՝ խ եւ խ' ոտ, եւ անոր բարձրութիւնը բ ոտ ցուցընենք, հատուածին ծաւալը կ'ըլլայ $բ\times\frac{1}{2}(խ+խ')+\frac{1}{6}\pi\times բ^3$ քանաձեւութիւնը: Երբ հատուածը միայն մէկ խարիսխ ունի, անոր ծաւալը կ'ըլլայ $բ\times\frac{1}{2}խ+\frac{1}{6}\pi\times բ^3$ քանաձեւութիւնը:

ԳԻՐՔ Թ.

ԳՆԴԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹԻՒՆ

ՍԱՀՄԱՆՔ:

1. Գնդոյ մը մակերեւոյթին որեւէ մասը որ մեծ բոլորակաց աղեղներով սահմանեալ է, գնդական բեւեռան կը կոչուի:

2. Այս աղեղները բազմանկեան կողքերը կը կոչուին, եւ այն կողմերուն մակարդակաց կազմած անկիւնները բազմանկեան անկիւններն են:

3. Գնդական եռանկիւնը այն բազմանկիւնն է որ միայն երեք կողմ ունի, եւ կողմանց իւրաքանչիւրը կիսաշրջանակէ մը փոքր է:

4. Մահիկը գնդոյ մը մակերեւոյթին այն մասն է, որ հասարակաց տրամագիծ մը ունեցող մեծ բոլորակաց երկու կիսաշրջանակներուն մէջտեղը կ'իյնայ:


5. Գնդոյ մը այն մասը որ հասարակաց տրամագիծ մը ունեցող երկու մեծ կիսաբոլորակաց մէջտեղը կ'իյնայ, գնդական սեպ կը կոչուի:

6. Գնդական բեւեռքը գնդոյն այն մասն է որ գնդական բազմանկեան մը այլեւայլ կողմերուն մակարդակաց մէջտեղը կ'իյնայ. անոր խոլխոլը գնդական բազմանկիւնն է, եւ անոր դագաթը՝ գնդոյն կեդրոնը:

7. Բոլորակի մը բեւեռը գնդոյն մակերեւոյթին այն կէտն է որ բոլորակին չրջանակին ամէն մէկ կէտէն հաւասարապէս հեռու է:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ա. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ


Ամէն գնդական եռանկեան ութը մէկ կողմը քոյր է միւս երկու կողմանց գումարին:



Աբգ գնդական եռանկեան անկիւններուն գագաթներէն Ա.Օ, Գ.Օ եւ Բ.Օ չառաւիղները քաշէ: Ա.Օբ, Ա.Օգ եւ Գ.Օբ մակարդակները Օ մարմնոյ անկիւնը կը կազմեն. եւ Ա.Օբ, Ա.Օգ եւ Գ.Օբ անկեանց չափերն են Աբ, Ագ եւ Բգ աղեղները, այսինքն գնդական եռանկեան կողմերը: Բայց այն անկեանց որեւէ մէկը փոքր է միւս երկուքին գումարէն (Գիրք Զ. Նախ. ժթ.). ուրեմն Աբգ եռանկեան որեւէ մէկ կողմը միւս երկու կողմանց գումարէն փոքր է:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Բ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ոչ-ե՛ւ գնդական բաղմանկիւն մը ըլլալ կրնայ գոմարը մեծ բոլորակի մը շրջանակէն փոքր է։



Եթէ ԱԲԳԴԵ գնդական բաղմանկիւնն է, անոր կողմանց գումարը մեծ բոլորակի մը շրջանակէն փոքր է։

Գնդոյն Ո կեդրոնէն ՈԱ, ՈԲ, ՈԳ, եւայլն չառաւիղները քաշէ։ Ո մարմնոյ անկիւնը կազմող ԱՈԲ, ԲՈԳ, ԳՈԴ, եւայլն մակարդակի անկեանց գումարը չորս ուղիղ անկիւններէ փոքր է (Գիրք Զ. Նախ. Ի.)։ ուրեմն այն անկեանց չափերն եղող ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ, եւայլն կողմանց գումարը մեծ բոլորակի մը շրջանակէն փոքր է։

Հետ. Յայտնի է *թէ* գնդական եռանկեան մը կողմանց գումարը մեծ բոլորակի մը շրջանակէն փոքր է։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Գ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գնդոյ մը մէկ մեծ բոլորակէն բեւեռները այն պրամաջըձէն ծայրերն են որ բոլորակէն ուղղահայեաց է. նաեւ այն ծայրերը մեծ բոլորակէն ըստ-ֆահեռական եղող բոլոր փոքր բոլորակաց բեւեռներն են։

Եթէ ԴԵ պրամագիծը ԱՄԲ մեծ բոլորակին ուղղահայեաց է, անոր Դ եւ Ե ծայրերը բոլորակին բեւեռներն են. նաեւ ԱՄԲ ի զուգահեռական եղող ՀՓԻ եւ ՑՆԿ փոքր բոլորակներուն բեւեռներն են։

Քանզի ԴՓ ուղղահայեաց ըլլալով ԱՄԲ մակարդակին, ուղղահայեաց է ԳԱ, ԳՄ, ԳԲ եւայլն գծերուն (Գիրք Զ. Սահ. 1). ուստի ԴԱ, ԴՄ, ԴԲ, եւայլն ա-

ղեղներուն լրացքանչիւրը մեծ բոլորակի մը չրջանակին մէկ քառորդն է. նաեւ ԵԱ, ԵՄ, ԵԲ, եւայլն աղեղները նոյն չափը ունին. ուրեմն Դ եւ Ե կէտերը հաւասարապէս հեռու ըլլալով ԱՄԲ չրջանակին բոլոր կէտերէն՝ ԱՄԲ բոլորակին բեւեռներն են (Սահ. 7)։



Դարձեալ, ԴՓ չառաւիղը ԱՄԲ բոլորակին ուղղահայեաց ըլլալով անոր զուգահեռական եղող ՀՓԻ բոլորակին ալ ուղղահայեաց է. ուստի ՀՓԻ բոլորակին Պ կեդրոնէն կ'անցնի (Գիրք Ը. Նախ. Է. Հետ. 4). ուստի, եթէ ԴՀ, ԴՓ, ԴԻ, եւայլն ուղիղ գծերը քաշուին, անոնք իրարու հաւասար կ'ըլլան (Գիրք Զ. Նախ. Ե.)։ Բայց, *եթէ* այս լարերը իրարու հաւասար են, ԴՀ, ԴՓ, ԴԻ, եւայլն աղեղներն իրարու հաւասար են. ուրեմն Դ՝ ՀՓԻ բոլորակին բեւեռն է։ Նոյն կերպով կրնայ ցուցուիլ *թէ* Ե կէտը անոր մեւս բեւեռն է։

Հետ. 1. ԱՄԲ մեծ բոլորակին չրջանակին որեւէ մէկ կէտէն, ինչպէս Մ էն, մինչեւ բեւեռը քաշուած ՄԴ աղեղը չրջանակին մէկ չորրորդ մասն է, եւ *ո-ո՛ր* կը կոչուի։ Նաեւ այս քառորդը եւ ԱՄ աղեղը ուղիղ անկիւն մը կը կազմեն. քանզի, որովհետեւ ԴՓ ուղղահայեաց է ԱՄԲ մակարդակին, ԴՓ ին վրայէն անցնող ամէն մակարդակ, ինչպէս ԴՄԲ, ԱՄԲ մակարդակին ուղղահայեաց է (Գիրք Զ. Նախ. ԺԶ.) ուրեմն այն մակարդակաց անկիւնը, այսինքն ԱՄԲ անկիւնը, ուղիղ է։

Հետ. 2. Հակադարձաբար, *եթէ* Դ կէտին՝ Ա եւ Մ


կէտերէն ունեցած հեռաւորութիւնը քառորդի մը հաւասար է, Դ՝ ԱՄ աղեղան բեւեռն է, եւ ԴԱՄ ու ԴՄԱ ուղիղ անկիւններ են։

Քանզի, որովհետեւ ԱԴ եւ ՄԴ քառորդ են, ԱԴԴ եւ ՄԴԴ ուղիղ անկիւններ են. ուստի Դ՝ ուղղահայեաց է ԳԱՄ մակարդակին (Գիրք Զ. Նախ. Դ.). ուրեմն Դ՝ ԱՄ աղեղան բեւեռն է, եւ ԴԱՄ ու ԴՄԱ ուղիղ անկիւններ են։

Պոր. Այս բեւեռաց յատկութիւնները գիտնալով կրնանք գիւրաւ գնդական աղեղներ եւ չրջանակներ գծել։ Զօրօրինակ, յայտնի է թէ Դ՝ ամէն վրայ գտնուելով ՖՆԿ չրջանակը կը քաշէ, եւ ԴԱ քառորդը՝ ԱՄԲ մեծ բոլորակին չրջանակը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Դ. ՀԱՅՏՅՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ մեծ բոլորակի երկու աղեղներ էրար կը կոբեն, անոնց անկիւնը հաւասար է այն անկեան ըր այս աղեղներուն շօշափողները անոնց հատման կէտին վրայ կը կազմեն, և անկեան չափ է մեծ բոլորակի մը այն աղեղը որուն բեւեռը անկեան գագաթն է, և որ երկու աղեղներուն միջին մասը կը տառնէ։




Եթէ ԱԲ եւ ԱԳ մեծ բոլորակի աղեղներ են, ԲԱԳ անկիւնը հաւասար է ՖԱ եւ ԿԱ չօշափողներուն ՖԱԿ անկեանը. նաեւ անոր չափն է Դե աղեղը որուն բեւեռը Ա կէտն է։

Քանզի ՖԱ չօշափողը, ԱԲ աղեղան մակարդակին վրայ, ԱՕ չառաւիղին ուղղահայեաց քաշուած է. նաեւ ԿԱ չօշափողը, ԱԳ մակարդակին վրայ, նոյն չառաւիղին ուղղահայեաց քաշուած է. ուրեմն ՖԱԿ անկիւնը հաւասար է ԱՕԲ եւ ԱՕԳ մակարդակաց ԲԱԳ անկեանը (Գիրք Զ. Սահ. 4)։

Դարձեալ, եթէ ԱԴ եւ ԱԵ աղեղները քառորդ են, ՕԴ եւ ՕԵ ուղղահայեաց են ԱՕ ին, եւ ԴՕԵ անկիւնը մակարդակաց անկիւնն է. ուրեմն Դե այն անկեան չափն է։

Հէտ. 1. Կրնանք գնդական անկիւններ իրարու բազդատել, եւ անկիւն մը ուրիշ անկեան մը հաւասար գծել անոնց չափերուն միջոցաւ։

Հէտ. 2. Երբ մեծ բոլորակի աղեղներ, ինչպէս ԱԲ եւ ՕՆ, իրար կը կտրեն, անոնց գագաթման անկիւնները իրարու հաւասար են. նաեւ յայտնի է թէ երկու առընթերակաց ՕԳԱ եւ ԱԳՆ անկեանց գումարը հաւասար է երկու ուղիղ անկեանց։




ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ե. ՀԱՅՏՅՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու գնդական եռանկիւններ այնպէս գտնուած են, որ առաջնոյն անկեանց գագաթներէն երկրորդին կողմանց բեւեռներն են, երկրորդին անկեանց գագաթները առաջնոյ կողմանց բեւեռներն են։

Եթէ Ա, Գ եւ Բ գագաթները ԴԵՖ եռանկեան ԵՖ, ԵԴ եւ ԴՖ կողմանց բեւեռներն են, անոնց Դ, Ե եւ Ֆ գագաթները ԲԳ, ԱԳ եւ ԱԲ կողմանց բեւեռներն են։

Քանզի, որովհետեւ Ա գագաթը ԵՖ աղեղան բեւեռն է, ԱԵ քառորդ մըն է. եւ, որովհետեւ Գ գագաթը ԵԴ կողման բեւեռն է, ԴԵ քառորդ մըն է. ուրեմն Ե կէտը ԱԳ աղեղան




բեւեռն է (նախ. Գ. Հետ. 2)։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ Դ՝ ԲԳ կողման, եւ Ֆ՝ ԱԲ կողման բեւեռներն են։

Պոր. Երբ երկու գնդական եռանկիւնիներէն մէկուն գագաթները միւսին կողմանց բեւեռներն են, անոնք ԷՆԵՐԱՅԻՆ կամ ԼՐացուցիչ Եռանկիւնիներ կը կոչուին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Զ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու ԷՆԵՐԱՅԻՆ կամ ԼՐացուցիչ եռանկիւնիներու մէկ անկեան չափն է կիսաշրջանակ մը, ուրեմն այն կողմը որ միւս եռանկիւնին մէջ անոր չափուած է։




Եթէ ԱԲԳ եւ ԴԵՖ բեւեռային եռանկիւնին են, Ա անկեան չափն է ½ շրջ.—ԵՖ։

Քանզի, որովհետեւ Ա գագաթը Կհ աղեղան բեւեռն է, Կհ աղեղը Ա անկեան չափն է (Նախ. Դ.)։ Բայց որովհետեւ Ե գագաթը Ահ ին բեւեռն է, եւ Ֆ գագաթը՝ Ակ ին բեւեռը, եհ եւ կՖ քառորդ են. ուստի եհ+կՖ հաւասար է կիսաշրջանակի մը։ Բայց եհ+կՖ=ԵՖ+կհ. ուրեմն կհ, այսինքն Ա աղեղան չափը, հաւասար է կիսաշրջանակի մը, նուազ ԵՖ կողմը։ Նոյն կերպով կրնայ ապացուցուիլ թէ Բ անկեան չափն է ½ շրջ.—ԴՖ, եւ Գ ին չափը՝ ½ շրջ.—ԴԵ։ Նաեւ Դ, Ե եւ Ֆ անկեանց չափերն են ½ շրջ.—ԲԳ, ½ շրջ.—ԱԳ, եւ ½ շրջ.—ԱԲ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Է. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկու ԷՆԵՐԱՅԻՆ կամ ԼՐացուցիչ եռանկիւնիներ կոչուին այն երկու եռանկիւնիները որոնց մէջ անկեանց կողմերը հակառակ կ'ըլլան զոյգ եռանկիւնիներուն։



Եթէ ԱԲԳ ձանօթ գնդական եռանկիւնի Ա կէտը Դեկ աղեղան կեդրոնն է, Բ ալ՝ ԴֆԳ ին կեդրոնը, եւ ԱԴ ու ԲԳ մեծ բոլորակի աղեղներ են, անտատեն ԱԴԲ գնդական եռանկիւնի կողմերն ու անկիւնները հաւասար են ԱԲԳ եռանկիւնի կողմերուն եւ անկիւններուն։

Քանզի ԱԲ կողմը հասարակաց է. եւ, որովհետեւ Ա կէտը Դեկ աղեղան կեդրոնն է, ԱԳ=ԱԴ. նաեւ, որովհետեւ Բ կէտը ԴՖԳ աղեղան կեդրոնն է, ԲԳ=ԲԴ. ուրեմն եռանկիւնիները փոխադարձաբար հաւասարակողմ են։


Եթէ Օ կէտը գնդոյն կեդրոնն է, կրնանք մարմնոյ անկիւն մը ըմբռնել ԴՕԱ, ԴՕԲ եւ ԲՕԱ մակարդակի երեսներէն կազմուած Օ կէտին վրայ. նաեւ կրնանք ըմբռնել ուրիշ մը ԱՕԲ, ԱՕԳ եւ ԲՕԳ մակարդակի եռանկիւնէն կազմուած Օ կէտին վրայ։ Բայց, որովհետեւ ԱԲԳ եռանկիւնի կողմերը հաւասար են ԱԲԳ եռանկիւնի կողմերուն, այս երկու մարմնոյ անկիւնոց մէկը կազմող մակարդակի անկիւնները հաւասար են միւսը կազմող մակարդակի անկիւնոց. ուստի անոնց մակարդակները իրարու միեւնոյն հակումն ունին (Գիրք Զ. Նախ. ԻԱ.). ուրեմն ԴԱԲ հաւասար է ԲԱԳ անկեան,

ԴԲԱ՝ ԱԲԳ անկեան, եւ ԱԴԲ՝ ԱԳԲ անկեան. այսինքն, ԱԴԲ եռանկեան անկիւններն ու կողմերը հաւասար են ԱԲԳ եռանկեան անկիւններուն եւ կողմերուն։

Պոր. Որովհետեւ համանուն կողմերը նոյն դիրքը չունին. այս երկու եռանկիւնները չեն կրնար մէկը միւսին վրայ այնպէս դրուիլ որ զուգընթանան. եւ այսպիսի եռանկիւններ հակադիպական կը կոչուին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ը. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ ինքնուին գնդոյն կամ հաւասար գնդոց վրայ երկու եռանկեանց ներսը երկու կողքերն ու անոնց կազմած անկիւնը հաւասար են միւսին երկու կողքերուն եւ անոնց կազմած անկիւնը, ասոնցմէ միւս մասերն ալ հաւասար են երկրորդին միւս մասերուն։



Եթէ ԱԲ=ԵՖ կողման, ԱԳ=ԵԿ, եւ ԲԱԳ=ՖԵԿ անկեան, անատեն ԲԳ=ՖԿ կողման, եւ ԱԲԳ=ԵՖԿ ու ԱԳԲ=ԵԿՖ անկեան։

Քանզի ԱԲԳ եռանկիւնը կրնայ դրուիլ կամ ԵՖԿ կամ անոր համաչափական եղող ԵԿՖ եռանկեան վրայ մակարդակի եռանկեանց պէս (Գիրք Ա. Նախ. Ի.) եւ անոնք զուգընթաց պիտի ըլլան։


ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Թ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ ինքնուին գնդոյն կամ հաւասար գնդոց վրայ երկու եռանկեանց ներսը երկու անկիւնները ու անոնց ներընդել կողմը միւսին երկու անկիւնաց եւ անոնց ներընդել կողման հաւասար են, ասոնցմէ միւս մասերն ալ հաւասար են երկրորդին միւս մասերուն։

Քանզի եռանկեանց մէկը կամ անոր համաչափական եռանկիւնը միւսին վրայ կրնայ դրուիլ մակարդակի եռանկեանց պէս (Գիրք Ա. Նախ. Զ.), եւ անոնք պիտի զուգընթանան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ Ժ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ ինքնուին գնդոյն կամ հաւասար գնդոց վրայ երկու եռանկեանց փոխադարձաբար հաւասարաձիգ են, ասոնց փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են։




Այս նախադասութեան ճշմարտութիւնը յայտնի է։ Նախադասութենէն ուր ապացուցուած է թէ երեք ծանօթ կողմերէն, ինչպէս ԱԲ, ԱԳ եւ ԲԳ, միայն երկու իրարմէ տարբեր եռանկիւն, ԱԲԳ եւ ԱԲԴ, կրնան կազմուիլ, եւ թէ անոնք իրարու հաւասար են իրենց բոլոր մասանց նկատմամբ. ուրեմն փոխադարձաբար հաւասարակողմ եռանկիւնք փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են. եւ յայտնի է թէ հաւասար անկիւնները հաւասար կողմանց դէմառդէմ կ'ըլլան։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԱ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երկկողմնապտոյտ գնդական եռանկեան մը հաւասար կողքերուն դէմառդէմ անկիւնները իրարու հաւասար են. և հակառակաբար, երբ գնդական եռանկեան մը երկու անկիւնները իրարու հաւասար են, եռանկիւնը երկկողմնապտոյտ է։

Նախ. երբ ԱԲ=ԱԳ, Գ=Բ անկեան։ Քանզի, եթէ ԱԴ աղեղը քաշուի մինչեւ ԲԳ ին միջին կէտը, ԱԲԴ

եւ ԱԴԳ եռանկեանց մէջ կ'ունենանք ԱԲ=ԱԳ կողման , ԲԴ=ԴԳ կողման , եւ ԱԴ հասարակաց է . ուստի եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են . ուրեմն Բ=Գ անկեան :




Եզրակացք . երբ Բ=Գ անկեան , ԱԳ=ԱԲ կողման : Եթէ հաւասար չեն , ենթադրենք թէ ԱԲ մեծն է . ԱԲ էն ԲՈ կարէ ԱԳ ին հաւասար , եւ ՈԳ քաշէ : ԲՈ եւ ԲԳ երկու կողմերը հաւասար են ԱԳ եւ ԲԳ երկու կողմերուն , եւ ՈԲԳ=ԱԳԲ անկեան . ուստի ԲՈԳ եւ ԱԳԲ եռանկեանց միւս մասերը հաւասար են (Նախ . Ը.) . ուրեմն ՈԳԲ=ԱԲԳ անկեան : Բայց ենթադրութեամբ ԱԲԳ=ԱԳԲ անկեան . ուստի ՈԳԲ անկիւնը հաւասար է ԱԳԲ անկեան . այսինքն , մաս մը ամբողջին հաւասար է . բայց ասիկա անկարելի բան է . ուրեմն ԱԲ եւ ԱԳ իրարու հաւասար են :

Պոր . Որովհետեւ ԲԱԳ եռանկեան կողմերն ու անկիւնները հաւասար են ԴԱԳ եռանկեան կողմերուն ու անկիւններուն , ԱԴԲ=ԱԴԳ անկեան , եւ այս երկու անկիւններն ուղիղ են . ուրեմն այն ալեզուկ որ երկնցուած գնդական եռանկեան մը գագաթէն կը տարուի հիմնաթելին ուղիղ կիջնէ , երկրաչափ է , և գագաթանկիւնը երկու հաւասար մասանց կը բաժնէ :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԲ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ամէն գնդական եռանկեան ուղիղ կողմը ուղիղ անկեան դէմ կ'ընայ . և , հակադարձաբար , ուղիղ անկիւնը՝ ուղիղ ման դէմը :



Նախ . Եթէ Ա մեծ է Բ անկիւնէն , ԲԳ մեծ է ԱԳ կողմէն : ԲԱԴ անկիւնը գծէ ԱԲԳ անկեան հաւասար . անատեն ԱԴ=ԴԲ (Նախ . ԺԱ.) . բայց ԱԴ+ԴԳ>ԱԳ . ուրեմն ԲԴ+ԴԳ , կամ ԲԳ >ԱԳ :

Եզրակացք . Եթէ ԲԳ մեծ է ԱԳ կողմէն , ԲԱԳ մեծ է ԱԲԳ անկիւնէն : Քանզի , եթէ ԲԱԳ հաւասար ըլլար ԱԲԳ անկեան , ԲԳ հաւասար պիտի ըլլար ԱԳ կողման . եւ , եթէ ԲԱԳ փոքր ըլլար ԱԲԳ անկիւնէն , ԲԳ ալ փոքր կ'ըլլար ԱԳ կողմէն . բայց ԲԳ մեծ է ԱԳ էն . ուրեմն ԲԱԳ անկիւնը մեծ է ԱԲԳ անկիւնէն :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԳ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ գնդական եռանկեան մը կողմերէն երկուքը հաւասար գագաթներէն են , անոնց գծագրուած հաւասարաչափ են :

Եթէ Ա եւ Բ՝ փոխադարձաբար հաւասար եռանկիւնները ցուցընեն , եւ փ ու պ՝ անոնց բեւեռային եռանկիւնները , յայտնի է թէ փ եւ պ փոխադարձաբար հաւասարակողմ են (Նախ . Զ.) . ուստի փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են (Նախ . Ժ.) . եւ , որովհետեւ փ եւ պ փոխադարձաբար հաւասարանկիւն են , կը հետեւի թէ անոնց Ա եւ Բ բեւեռային եռանկիւնները փոխադարձաբար հաւասարակողմ են :

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԴ . ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ըլլաւ գնդական եռանկեան մը քովէքով անկեանց գումարը վեց ուղիղ անկեանէ գերդ , և երկուսէ ալ պակաս է :

Նախ . Որովհետեւ գնդական եռանկեան մը որեւէ մէկ անկիւնը երկու ուղիղ անկիւնէ փոքր է , յայտնի է թէ երեքին գումարը վեց ուղիղ անկիւնէ փոքր է :

Եզրակացք . Որովհետեւ գնդական եռանկեան մը որեւէ մէկ անկեան չափը հաւասար է մեծ բոլորակի մը կիսաշրջանակին , նուազ բեւեռային եռանկեան այն կողմը որ անոր դէմը կ'իյնայ (Նախ . Զ.) , յայտնի է թէ երեքին չափերը հաւասար են երեք կիսաշրջանակներու , նուազ բեւեռային եռանկեան երեք կողմերուն գումարը .

բայց այս գումարը մէկ չրջանակէն փոքր է (նախ. Բ.). ուստի երեք կիսաչրջանակներուն եւ այս գումարին տարբերութիւնը կիսաչրջանակ մը մեծ է. ուրեմն գնդական եռանկեան մը անկեանց գումարը երկու ուղիղ անկիւնէ մեծ է։




Պոր. Երբ գնդական եռանկեան մը մէջ, ինչպէս ԱԲԳ, երկու անկիւններ, ինչպէս Բ եւ Գ, ուղիղ են, Ա գագաթը ԲԳ խարսխին բեւեռն է. նաեւ ԱԲ ու ԱԳ կողմերը քառորդ են (նախ. Գ. Հետ. 2), եւ եռանկիւնը երկու-ողղանկիւնային կը կոչուի։

Երբ Ա ալ ուղիղ անկիւն է, բոլոր կողմերը քառորդ են, եւ եռանկիւնը եռ-ողղանկիւնային կը կոչուի։ Յայտնի է թէ գնդոյ մը վրայ ութ եռուղղանկիւնային եռանկիւն կրնան գծուիլ։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԵ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Մահիկ մը մակերեւոյթը գնդոյն մակերեւոյթին այնպէս կը հանդիպի, ինչպէս մահիկին անկիւնը՝ ըսբ ուղիղ անկեանց. կամ ինչպէս այն անկիւնը ըսփող ազդըբ՝ սբեղջ ըրջանակին։



Եթէ ԱՄԲՆ մահիկ է, անոր մակերեւոյթը գնդոյն մակերեւոյթին այնպէս կը համեմատի, ինչպէս ՆԳՄ անկիւնը՝ չորս ուղիղ անկեանց. կամ ինչպէս Մն աղեղը՝ մեծ բոլորակի մը չրջանակին։

Նախ. Ենթադրենք թէ Մն աղեղը եւ ՄՆՓՊ չրջանակը հասարակաց չափ ունին, եւ մէկը միւսին այնպէս կը համեմատի, զորօրինակ, ինչպէս 5ը՝ 48 ին։ Եթէ չրջանակը 48 հաւասար մասանց բաժնուի, Մն աղեղըասոնցմէ 5 հատը պիտի ունենայ.

եւ եթէ, Ա բեւեռէն քառորդներ քաշուին մինչեւ բաժանման այլեւայլ կէտերը, ԱՄՆՓՊ կիսագունդը 48 իրարու հաւասար եռանկեանց կը բաժնուի. ուստի ամբողջ գունդը 96 հատ կ'ունենայ որոնցմէ 10 հատը ԱՄԲՆ մահիկին վրայ կ'իյնան. ուրեմն մահիկը գնդոյն այնպէս կը համեմատի, ինչպէս 10ը՝ 96 ին, կամ ինչպէս 5ը՝ 48 ին. այսինքն, ինչպէս Մն աղեղը՝ ամբողջ չրջանակին։

Երկրորդ. Եթէ Մն աղեղը եւ չրջանակը հասարակաց չափ չունին, կրնայ ապացուցուիլ թէ մահիկը գնդոյն այնպէս կը համեմատի, ինչպէս աղեղը՝ չրջանակին (Գիրք Գ. Նախ. ժէ.)։


Հետ. 1. Նոյն գնդոյն կամ հաւասար գնդաց վրայ երկու մահիկ իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս անոնց անկիւնները։

Հետ. 2. Գնդոյ մը մակերեւոյթը հաւասար է ութ եռուղղանկիւնային եռանկեանց (Նախ. ԺԴ. Պար.). ուստի, եթէ ե ցուցընէ այն եռանկեանց մէկուն մակերեսը, 8 ե պիտի ցուցընէ գնդոյն մակերեւոյթը. ուրեմն, եթէ ուղիղ անկիւն մը միութիւն համարինք, Ա անկիւն ունեցող մահիկին մակերեսը կ'ըլլայ 2Ա×ե արտադրեալը. քանզի 4:Ա::8ե:2Ա×ե։ Այս համեմատութեան մէջ Ա՝ միութեան այնպէս կը համեմատի, ինչպէս մահիկին անկիւնը՝ ուղիղ անկեան մը։

Պոր. ԱՄԲ եւ ԱՆԲ մակարդակաց մէջտեղի գնդական սեպը ամբողջ գնդոյն այնպէս կը համեմատի, ինչպէս Ա անկիւնը՝ չորս ուղիղ անկեանց։ Քանզի գնդական սեպեր հաւասար են, երբ անոնց խարխիսները կազմող մահիկները հաւասար են. ուրեմն նոյն գնդոյն կամ հաւասար գնդերու վրայ եղող սեպեր իրարու այնպէս կը համեմատին, ինչպէս զանոնք սահմանող մակարդակաց կազմած անկիւնները։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԶ. ՀԱՑԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Համալսփական գնդական եռանկեանները համաղբ են։



Եթէ ԱԲԳ եւ ԴԵՑ համաչափական եռանկիւն են, այսինքն, եթէ ԱԲ=ԴԵ, ԱԳ=ԴՑ եւ ԳԲ=ԵՑ, ԱԲԳ ին մակերեսը հաւասար է ԴԵՑ ին մակերեսին։

Այս եռանկիւնաց հաւասար կողմերը նոյն դիրքը չունին, եւ անոր համար եռանկիւնները չեն կրնար մէկը միւսին վրայ այնպէս դրուիլ որ զուգընթաց ըլլան։ Ա, Բ ու Գ կէտերուն վրայէն անցնող փոքր բոլորակին փ բեւեռէն՝ փԱ, փԳ ու փԲ իրարու հաւասար աղեղները քաշէ (Նախ. Գ.)։ յետոյ ԴՑՊ անկիւնը գծէ ԱԳփ ին հաւասար, ՑՊ աղեղը՝ Գփ ին հաւասար, նաեւ գծէ ԴՊ եւ ՊԵ աղեղները։

ԴՑ եւ ՑՊ հաւասար են ԱԳ ու Գփ կողմերուն, եւ ԴՑՊ=ԱԳփ անկեան։ ուստի ԴՑՊ եւ ԱԳփ եռանկեանց բոլոր մասերը փոխադարձաբար հաւասար են (Նախ. Ը.)։ ուրեմն ԴՊ=Ափ կողման, եւ ԴՊՑ=ԱփԳ անկեան։


Որովհետեւ ԴՑԵ=ԱԳԲ անկեան (Նախ. ժ.), ԴՑԵ —ԴՑՊ կամ ՊՑԵ=ԱԳԲ—ԱԳփ կամ փԳԲ անկեան։ Նաեւ ՊՑ եւ ՑԵ հաւասար են փԳ ու ԳԲ անկեանց։ ուրեմն ՑՊԵ եւ ԳփԲ եռանկեանց միւս մասերը փոխադարձաբար հաւասար են (Նախ. Ը.)։ ուրեմն ՊԵ =փԲ կողման, եւ ՑՊԵ=ԳփԲ անկեան։

Որովհետեւ ԴՑՊ եւ ԱԳփ եռանկիւնները երկկողմանի նազոյգ են, եթէ մէկը միւսին վրայ դրուի, անոնք ալ իրարու զուգընթացան։ ուրեմն իրարու հաւասար են։ Նոյնպէս պատճառաւ ՑՊԵ=ԳփԲ, եւ ԴՊԵ=ԱփԲ եռանկեան։ ուստի ԴՊՑ+ՑՊԵ—ԴՊԵ=ԱփԳ+ԳփԲ—ԱփԲ, կամ ԴՑԵ=ԱԳԲ եռանկեան։ ուրեմն ԱԲԳ եւ ԴԵՑ համաչափական եռանկիւնները հաւասար մակերեսոյթներ ունին։

Պոր. Երբ փ եւ Պ բեւեռները եռանկեանց ներսը կ'իյնան, ԴԵՑ հաւասար կ'ըլլայ ԴՑՊ, ՑՊԵ եւ ԴՊԵ եռանկեանց գումարին։ Նաեւ ԱԲԳ եռանկիւնը հաւասար կ'ըլլայ ԱփԳ, ԳփԲ եւ ԱփԲ եռանկեանց գումարին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԷ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երբ երկու ծեծ բոլորակներու շրջանակները երբ կը կտրեն կէսէ աւելի մը վրայ, անոնց կազմած երկու եռանկեանց մակերեսաց գումարը հաւասար է այն մակերեսին, որուն անկիւնը շրջանակներուն կազմած անկիւնը հաւասար է։



Եթէ ՕԱԳԲԴ կիսագունդ է, եւ ԱՕԲ ու ԳՕԴ մեծ բոլորակի շրջանակ են, ԱՕԴ եւ ԲՕԴ եռանկեանց մակերեսաց գումարը հաւասար է ԲՕԴ անկիւնին ունեցող մահիկի մը մակերեսին։

Երկնցուր ՕԲ եւ ՕԴ աղեղները միւս կիսագնդոյն վրայ մինչեւ Ն կէտին վրայ իրար կտրեն. ՕԲՆ եւ ԱՕԲ կիսաշրջանակ են. ուստի ԱՕԲ—ՕԲ=ՕԲՆ —ՕԲ, կամ ԲՆ=ԱՕ։ Նմանապատճառաւ, ԴՆ=ԴՕ, եւ ԲԴ=ԱԴ. ուստի ԱՕԴ եւ ԲԴՆ եռանկիւնները համաչափական եռանկիւն են (Նախ. ժ.)։ ուրեմն համագոր են (Նախ. ԺԶ.)։ բայց ԲԴՆ եւ ԲՕԴ եռանկեանց մակերեսաց գումարը հաւասար է ԲՕԴ անկիւնն ունեցող ՕԲՆԴՕ մահիկին մակերեսին. ուրեմն ԱՕԳ+ ԲՕԴ համագոր է ԲՕԴ անկիւնն ունեցող մահիկին։

Պոր. Յայտնի է թէ ԱՕԳ եւ ԲՕԴ խարիսխներն ունեցող դնդական բուրգերուն գումարը հաւասար է ԲՕԴ անկիւնն ունեցող դնդական սեպին ծաւալին։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԸ. ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ոչ-ե՛ք գնդական եռանկեան մակերեսոյթը հաւասար է անոր անկեանց գումարին և երկու ուղիղ անկեանց տարբերութեանը, քանզի պարզապէս եռանկեանց եռանկիւնով։

ԱԲԳ գնդական եռանկեան կողմերը երկնցուր մինչեւ որ անոնք անկէ դուրս եղող որեւէ մեծ շրջանակ մը, ինչպէս ԴԵՖԿ, կարեն։ ԱԴԵ եւ ԱԿՀ եռանկեանց գումարը համազօր է Ա անկիւնն ունեցող մահիկին մակերեսին (Նախ. ԺԷ.)· ուստի հաւասար է 2Ա×ե (Նախ. ԺԵ. Հետ. 2)· նաեւ ԲԿՖ+ԲԻԴ=2Բ×ե, եւ ԳԻՀ+ԳՖԵ=2Գ×ե։ Բայց այս վեց եռանկեանց գումարը հաւասար է կիսագնդոյն մակերեսոյթին, առաւել երկու անգամ ԱԲԳ եռանկիւնը· եւ կիսագնդոյն մակերեսոյթը հաւասար է 4եի· ուստի երկու անգամ ԱԲԳ եռանկիւնը հաւասար է 2Ա×ե+2Բ×ե+2Գ×ե—4ե քանակութեան, կամ ԱԲԳ եռանկիւնը հաւասար է (Ա+Բ+Գ—2)ե քանակութեան· ուրեմն ամէն գնդական եռանկեան մակերեսոյթը հաւասար է անոր անկեանց գումարին եւ երկու ուղիղ անկեանց միջտեղի տարբերութեանը, բազմապատկեալ եռուղղանկիւնային եռանկիւնով։




Պոր· եթէ ուղիղ անկիւնը միութիւն համարինք, երբ անկեանց իւրաքանչիւրը $\frac{4}{3}$ է, երեք անկեանց գումարը կ'ըլլայ 4 ուղիղ անկիւն, եւ եռանկեան մակերեսը կ'ըլլայ 4—2 կամ 2 եռուղղանկիւնային եռանկիւն, այսինքն, գնդոյն ամբողջ մակերեսոյթին մէկ չորրորդ մասը։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԺԹ· ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ըսե՛ք գնդական բազմանկեան մակերեսոյթը հաւասար է այն ապացուցեալ օրէնքին բազմապատկեալ անոր բոլոր անկեանց գումարը նուազ երկու անգամ անոր կողմանց թիւը նուազ երկու, եւ եռուղղանկիւնային եռանկիւնը։

ԱԲԳԴԵ գնդական բազմանկեան մէկ գագաթէն, ինչպէս Ա, մինչեւ միւս գագաթները տրամանկիւններ քաշէ· բազմանկիւնը քանի մը եռանկեանց կը բաժնուի որոնց թիւը հաւասար է բազմանկեան կողմանց թուոյն նուազ երկու։ Բայց իւրաքանչիւր եռանկեան մակերեսոյթը հաւասար է անոր անկեանց գումարին եւ երկու ուղիղ անկեանց տարբերութեանը, բազմապատկեալ եռուղղանկիւնային եռանկիւնով· նաեւ բազմանկեան անկեանց գումարը հաւասար է բոլոր եռանկիւններուն անկեանց գումարին· ուրեմն բազմանկեան մակերեսոյթը հաւասար է այն արտադրելոյն որուն բազմապատկիչներն են անոր անկեանց գումարը նուազ երկու ուղիղ անկիւն, անոր կողմանց թիւը նուազ երկու, եւ եռուղղանկիւնային եռանկիւնը։



Պոր· եթէ Գ ցուցընէ գնդական եռանկեան մը բոլոր անկեանց գումարը, Թ անոր կողմանց թիւը, եւ Ե եռուղղանկիւնային եռանկիւնը, բազմանկեան մակերեսոյթը կ'ըլլայ (Գ—2(Թ—2))×Ե արտադրեալը։

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՔ

1· Եթէ ԱԲԳ ուղղանկիւն եռանկեան ԲԱ կողմը 3 է, եւ ԲԳ ու ԱԳ կողմանց գումարը՝ 9, ի՞նչ են ԲԳ բ եւ ԱԳ բ արժէքները։

Եթէ ⁺ ցուցընէ ԲԳ բ արժէքը, եւ Ե՝ ԱԳ բ-ինը, կ'ունենանք ⁺+Ե=9, եւ ⁺²=9+Ե² (Գիրք Դ· Նախ· ԺԱ.)։



Եթէ առաջին հաւասարութեան Ե քանակութիւնը երկրորդ անդամին փոխադրենք, եւ յետոյ երկու անդամները քառակուսենք, կ'ունենանք ⁺²=81—18 Ե+Ե²· այս հաւասարութիւնը երկրորդ հաւասարութենէն հանէ եւ կը մնայ 0=72—18Ե, ուրեմն 18Ե=72, եւ Ե=4։


Պ· ԱԳ=4, եւ ԲԳ=5։

2. Եթէ վերոյիշեալ եռանկեան ԲԳ հակուղիղն է 5, եւ ԱԲ ու ԱԳ կողմանց գումարը՝ 7, ի՞նչ են ԲԱ ի եւ ԱԳ ի արժէքները։

Եթէ + ցուցընէ ԱԲ ի արժէքը, եւ է՝ ԱԳ ինը, կ'ունենանք $+ + է = 7$, եւ $+^2 + է^2 = 25$։ Առաջին հաւասարութեան է քանակութիւնը փոխադրելով, եւ հաւասարութեան երկու անդամները քառակուսելով կ'ունենանք $+^2 = 49 - 14է + է^2$. ուստի $2է^2 - 14է = -24$, կամ $է^2 - 7է = -12$. ուրեմն $է = 4$ կամ 3։

Պ. ԱԲ՝ 3 կամ 4, եւ ԱԳ՝ 4 կամ 3։

3. Եթէ ԱԲԳԴ ուղղանկեան ԱԳ տրամանկիւնն է 10, եւ անոր չրջագիծը՝ 28, ի՞նչ են կողմանց արժէքները։



Եթէ բոլոր չրջագիծն է 28, անոր կէսը, այսինքն ԱԲ+ԲԳ, 14 է. ուրեմն, եթէ + ցուցընէ ԱԲ ի արժէքը, եւ է՝ ԱԳ ինը, կ'ունենանք $+ + է = 14$, եւ $+^2 + է^2 = 100$։

Պ. ԱԲ՝ 8 կամ 6, եւ ԲԳ՝ 6 կամ 8։


4. Եթէ ԱԲԳ եռանկեան խարսխին արժէքն է բ, եւ անոր ԳԴ բարձրութեան արժէքը՝ ա, ի՞նչ է ներքը գծուած հեՀեՀկ քառակուսւոյն մէկ կողման արժէքը։



Եթէ + ցուցընէ ԿՀ ի արժէքը, որովհետեւ ԱԳԲ եւ ԿԳՖ եռանկիւնները իրարու նման են, ԱԲ : ԳԴ :: ԿՖ : ԳԻ, կամ $բ : ա :: + : ա - +$. ուստի $աբ - բ+ = ա+$, կամ $+ = \frac{աբ}{ա+բ}$։

Պ. $\frac{աբ}{ա+բ}$։

5. Եթէ ԱԲԳ հաւասարակողմ եռանկեան մէջ Դ կէտէն քաշուած ԴԿ ուղղահայեացին արժէքն է ա, ԴԵինը՝ բ, եւ ԴՖ ինը՝ գ, ի՞նչ է եռանկեան մէկ կողման արժէքը։



ԱԲ խարսխին ուղղահայեաց ԳՀ քաշէ. եթէ $2+$ ցուցընէ ԱԲ ի արժէքը, ԱՀ ինը $+$ կ'ըլլայ, եւ $ԳՀ = \sqrt{ԱԳ^2 - ԱՀ^2} = \sqrt{4+^2 - +^2} = \sqrt{3+^2} = +\sqrt{3}$։

Բայց, որովհետեւ եռանկեան մը մակերեսը հաւասար է անոր խարսխին կիսոյն, բազմապատկեալ անոր բարձրութեամբը (Գիրք Դ. Նախ. Զ.),

ԱԳԲ եռանկիւնը $= \frac{1}{2} ԱԲ \times ԳՀ = + \times +\sqrt{3}$.

Նաեւ ԱԴԲ եռանկիւնը $= + \times ա = ա+$,

ԲԴԳ եռանկիւնը $= + \times բ = բ+$,

եւ ԱԴԳ եռանկիւնը $= + \times գ = գ+$։

Բայց վերջին երեք եռանկեանց գումարը հաւասար է ԱԳԲ եռանկեան. ուստի

$$+^2\sqrt{3} = ա+ + բ+ + գ+ = + (ա + բ + գ),$$

կամ $$+\sqrt{3} = ա + բ + գ. \text{ ուրեմն } + = \frac{ա+բ+գ}{\sqrt{3}}։$$

Պոր. Որովհետեւ $ԳՀ = +\sqrt{3}$, այն դիծը հաւասար է $ա+բ+գ$ քանակութեան. այսինքն հաւասարակողմ եռանկեան մը որեւէ մէկ գագաթէն դիմացի կողման ուղղահայեաց քաշուած դիծը հաւասար է այն երեք գծերուն գումարին որոնք եռանկեան մէջի որեւէ մէկ կէտէն եռանկեան կողմանց ուղղահայեաց կը քաշուին։

6. Եռանկեան մը գագաթէն խարսխին ուղղահայեաց քաշուած գծին երկայնութիւնն է 8 ոտք. եւ կողմանց մէկուն երկայնութիւնը՝ 10, ու միւսինը՝ 15 ոտք. ի՞նչ է խարսխին երկայնութիւնը։

Պ. 18.69 ոտք։

7. Եթէ բոլորակի մը տրամագիծն է 12, եւ անոր մէկ լարը՝ 4, ի՞նչ է կեդրոնէն լարին ուղղահայեաց քաշուած դիծը։ Պ. $4\sqrt{2}$։

8. Եթէ բոլորակի մը տրամագիծն է 4, ի՞նչ է ասոր ներսը գծուած հաւասարակողմ եռանկեան մակերեսը։

Պ. $3\sqrt{3}$։

9. Եթէ գնդոյ մը տրամագիծն է 12 ոտք, ի՞նչ է անոր ծաւալը։ Պ. 904.78 խոր. ոտք։

10. Եթէ գնդոյ մը տրամագիծն է 12 ոտք, ի՞նչ է մէկ խարիսխ ունեցող այն հատուածին ծաւալը որուն բարձրութիւնը 3 ոտք է։ Պ. 141.372 խոր. ոտք։

11. Եթէ գնդոյ մը մակերեւոյթն է 68 +ա. ոտք, ի՞նչ է անոր տրամագիծը։ Պ. 4.652 ոտք։

12. Եթէ գնդոյ մը մակերեւոյթն է 68 քառակուսի

ոտք, ի՞նչ է մէկ խարիսխ ունեցող այն հատուածին մակերեւոյթը, որուն բարձրութիւնն է 2 ոտք։

պ. 29·229+ոտ. ոտք։

13. Ի՞նչ է վերոյիշեալ գնդոյն ծաւալը. եւ ի՞նչ՝ այն հատուածին ծաւալը։

պ. { գնդոյն ծաւալը 52·71 խոր. ոտք։
{ հատուածին ծաւալը 20·83 » » ։

14. Եթէ մէկ խարիսխ ունեցող գնդական հատուածի մը խարսխի տրամագիծն է 16 ոտք, եւ հատուածին բարձրութիւնն է 4 ոտք, ի՞նչ է անոր ծաւալը։

պ. 435·6352 խոր. ոտք։

15. Եթէ գնդական հատուածի մը մէկ խարսխին տրամագիծն է 20 ոտք, միւս խարսխինը՝ 12 ոտք, եւ անոր բարձրութիւնը՝ 2 ոտք, ի՞նչ է հատուածին ծաւալը, եւ ի՞նչ՝ գնդոյն տրամագիծը։

պ. { հատուածին ծաւալը 431·45 խոր. ոտք
{ գնդոյն տրամագիծը 36·054 ոտք։

16. Երեք իրարու հաւասար բոլորակներ դրսէն իրար կը չօշափեն եւ այնպէս 160 քառակուսի ոտք անոնց մէջտեղը կ'ի[illegible]. ի՞նչ է իւրաքանչիւր բոլորակին տրամագիծը։

պ. 62·96+ոտ։

17. Եթէ հաւասարակողմ եռանկեան մէջի մէկ կէտէն մինչեւ եռանկեան այլեւայլ անկեանց գագաթները քաշուած գծերն են ա, բ եւ գ, ի՞նչ է եռանկեան իւրաքանչիւր կողմը։

պ. $\frac{2(ա+բ+գ)}{\sqrt{3}}$։

18. Եթէ ուղղանկիւն եռանկեան մը մէկ սուր անկեան գագաթէն մինչեւ անոր դիմացի կողման միջին կէտը քաշուած գիծը ա է, եւ միւս սուր անկեան գագաթէն մինչեւ անոր դիմացի կողման միջին կէտը քաշուած գիծը բ է, ի՞նչ են ուղիղ անկիւնը կազմող կողմերը։

պ. $2\sqrt{\frac{4}{15}ա^2-\frac{1}{15}բ^2}$, եւ $2\sqrt{\frac{4}{15}բ^2-\frac{1}{15}ա^2}$։

19. Բոլորակի մը մէջ երեք իրարու հաւասար բոլորակներ այնպէս գծուած են որ մեծ շրջանակը նե-

սէն կը չօշափեն, եւ իրար՝ դրսէն. եթէ մեծ բոլորակին տրամագիծն է 10, ի՞նչ է իւրաքանչիւր փոքր բոլորակին տրամագիծը։

պ. 10 $(2\sqrt{3}-3)=4·64+$։

20. Եթէ երկկողմնազոյգ եռանկեան մը հաւասար կողմանց իւրաքանչիւրն է ա, եւ խարիսխը՝ 2բ, ի՞նչ է ներսը գծուած բոլորակին շառաւիղը։

պ. $\frac{բ\sqrt{ա-բ}}{\sqrt{ա+բ}}$։

ՎԵՐՋ



ԳԼԽՈՑ ՅԱՆԿ

ԳԻՐՔ Ա.

Սկզբունք 5

ԳԻՐՔ Բ.

Համեմատություն 38

ԳԻՐՔ Գ.

Բոլորակ, և Անկեանց Չափոխը 46

ԳԻՐՔ Դ.

Զհոց Համեմատությունը և Մակերեսաց Չափոխը 78

ԳԻՐՔ Ե.

Կանոնաւոր Բազմանկիւն, և Բոլորակի Չափոխը 127

ԳԻՐՔ Զ.

Մակերպականը և Մարմնոյ Անկիւն 147

ԳԻՐՔ Է.

Բազմանիստ 165

ԳԻՐՔ Ը.

Գլան, Կոն և Գունդ 192

ԳԻՐՔ Թ.

Գնդական Եռկրաչափություն 216
Եռկրաչափական Խնդիրք 233

1879

2013

<< Ազգային գրադարան
NL0066270