

Հ Ս Խ Հ-Ի
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ

ԴԵՂԱՅՈՐՄՈՒԼԱՆԵՐԻ Ց Ո Ւ Ց Ա Կ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Հ Ս Խ Հ-Ի ԱՌԺՈՂԿՈՄԵ-
ՑԻՆ ԿԻՑ ԲԺՂԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ

1615

7-34

ՅԵՐԵՎԱՆ

„ՍԱՆ—ԼՈՒՍ ԳՐԱԴԱՐԱՆ“

408

Հ Ս Խ Հ-ի
Ժողովրդական առողջապահության կոմիտեի

պ.

ԳԵՂԱՅՈՐՄՈՒԼԱՆԵՐԻ

615

7-34

Յ Ո Ւ Յ Ա Կ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Հ Ս Խ Հ-Ի ԱՌԺՈՂԿՈՄԱՆ
ՏԻՆ ԿԻՅ ԲԺՁԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՅ

(1346)

1980 Յերեվան



ՍԱՆ-ԼՈՒՍ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

02 APR 2013

16376 4212

20 JUL 2010

ԴԵՂԱՖՈՐՄՈՒԼԱՆԵՐԻ ՑՈՒՅԱԿ

Հաստատված ՀՍԽՀ-ի Առժողկոմատին ԿԻԳ
Ռժեկական-Գիթական Խորհրդի կողմից

ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ՀՍԽՀ-ի Առողջապահության ժողովրդական
կոմիտեի ատեր լույս և ընծայում ստանդարտային
նկրկա դեղաֆորմուլաների ժողովածուն հաղա-
պումով:

Միութան շատ հանրապետություններ ար-
դեն ունեն իրենց սեփական դեղաֆորմուլաները,
վերսնք հրատարակել են ՌՍՖՐ-ի Առժողկոմատի
ժողովածուի լույս տեսնելուց շատ առաջ:

Հայաստանի Առժողկոմատը հաշվի առնելով իր
առողջապահական որդանների վերջը՝ անհրա-
ժեշտ և զանում լույս ընծայել ներկա ժողովա-
ծուն ՌՍՖՍՐ-ի հետևողություն:

Ստանդարտային ցուցակները քննարկված
են մեր լեկրի լավագույն մասնագետների կող-
մից և հաստատված ՀՍԽՀ-ի Առժողկոմատին
ստորնիկի Գիտական Բժշկական Խորհրդի կող-
մից:

Մի քանի տարի առաջ, ստանդարտային

Հայտարարում

Պատվեր 3255 Տիրած 1200

Գրատեղ. 5295 (Բ)

(2296.52)

22090-59

դեղաֆորմուլաները գործնականում կիրառելիս, բժշկները, մասնավորապես տերապևտները, զգոհութուն ելին հայտնում, վար ստանդարտային ձևերի կիրառումը զգալի չափով կրճատում և իրենց իրավունքները, դեղատոմսները պրելու հարցում. և դա, անուղղակի կերպով, անդրադառնում է հիվանդի շահերի վրա:

Նույն արտունջը կարող և տեղի ունենալ նաև մեր բուժհիմնարկների բժշկների կողմից: Սակայն այդ հարցի սրճեկալով մոտեցումը ցույց և տալիս, վոր ստանդարտային դեղաֆորմուլաները կիրառելիս, թե բժշկի նախաձեռնությունը և թե հիվանդի շահերը՝ չեն տուժում: Յեւ իրոք, լուրջ նձայնելով ստանդարտային դեղաֆորմուլաների ժողովածուն, Առժողկոմատը չի արգելում բուժող բժշկին, առանձին դեպքերում, գրել ցանկացած դեղատոմսը, վորը նա անհրաժեշտ կհամարի, և թե իհարկե, լուրջ հիմք ունի այդ անելու: Մեր կարծիքով դեղորայքի միջոցով բուժումը չպետք և առաջնակարգ տեղ բռնի, քանի վոր հիվանդությունը վերացնելու համար չափազանց կարևոր դեր են խաղում կենցաղային և սոցիալական պայմանները: Դեղորայքի միջոցով բուժումն ունի և պետք և ունենա միայն լրացուցիչ նշանակություն մեր բոլոր մյուս միջոցների հանդեպ: Այնինչ ստանդարտային դեղաֆորմուլաների կիրառումը մեծ ոգուտ և տալիս թե պետությունը և թե հիվանդին, զգալի չափով կրճատելով բժշկի ապարդյուն աշխատանքը:

Մի քանի խոսքով բացատրենք այդ:

Ստանդարտային ձևերին անցնելու պատճառներից մեկը չեղել և ներմուծվող դեղորայքի քանակը կրճատելու ձգտումը, վորի հետևանքով ստանդարտային ձևերի մեջ այդ դեղորայքի քանակն անհրաժեշտ-նվազագույն չափերի վե հասնում: Այդ հանգամանքը, ինչպես և աջն, վոր ստանդարտային ֆորմուլաների մեծագույն մասը պիտի պատրաստվի տարբերականների և հարերի (դեղահատի) ձևով, զգալի չափով կիջեցնի ներմուծվող դեղորայքի արժեքը:

Այդ բանը տեղի չի ունենալ, չիր մտցնում ենք ստանդարտային դեղաֆորմուլաները և մեքենայացնում նրանց արտադրությունը:

Մենք կարող ենք վերացնել հերթերը և բաց թողնել դեղորայք 15—20 բուլկում. մինչդեռ առաջներում դրա համար պահանջվում էին ժամեր: Չե՞ վոր հերթերի կրճատումն ամբողջատորիաներում և այլ բուժհիմնարկներում մեր մարտական խնդիրն և, քանի վոր ապահովագրված մասսան միանգամայն իրավացի պահանջ և դնում մեր՝ առողջապահությունն ասպարիզում աշխատողներին առաջ, աջպիտի միջոցառումներ անցկացնել, վոր հերթերը վերանան:

Այդ արդարացի պահանջը մենք պետք և աշխատենք կատարել: Կարող ենք արդյոք չվողջունել ստանդարտային դեղաֆորմուլաների հան-

զէս գալը, վորը ուսալ հնարավորութիւնն է տալիս ի կատար ածելու ազ խնդիրը:

Ստանդարտալին ֆորմուլաների կիրառումը հնարավորութիւնն է տալիս զեղորայքի վորակը բարձրացնելու՝ և ահա թե ինչու:

Գաղտնիք չէ, վոր շատ գնողական զեղատոներում (ինչպէս և մի քանի քաղաքալին զեղատոներում), վորպէս զեղազործ, աշխատում են բուժակներ, աչն ել «վաշտալին»: Պահանջել ազգային աշխատակցից մաքուր և կանոնավոր աշխատանք՝ հնարավոր չէ: Դեղորայքը պատրաստվում են առանց քաշի, ինչպէս պատահում է, տէքի չափով: Ստանդարտալին տարկետակների և հարերի մեծաքանակ պատրաստումն ազգ թերութիւնները կվերացնի, զեղորայքի պատրաստման վրա հսկողութիւնը կբարձրանա:

Ստանդարտալին ֆորմուլաների կիրառումը զգալի չափով կբճատում է մեր զեղազործական պերսոնալի պահպանման ծախսերը, վորովհետեւ պատրաստի զեղաֆորմուլաների բաց թողնելը չի պահանջում զեղազործ-պերսոնալի աչն քանակը, վորը կպահանջվի անհատական զեղատոմսեր բաց թողնելու ժամանակ: Առողջապահութեան սրգանները վորձը ցույց է տալիս, վոր չնայած ամբողջատորալին հաճախումների աճման, վորի հետեանքով ավելացել է նաեւ զեղատոմսերի քանակը, ստանդարտալին ֆորմուլաները կիրառելիս՝ հաջողվել է անվնաս կերպով կբճատել զե-

ղազգծական պերսոնալը: Շատ բնորոշ է, վոր աչն ժամանակ, չերբ հնդամշակում մենք ունենք բարձր և միջին բուժպերսոնալի շատ խոշոր պահատուղ, շնորհիվ ստանդարտալին ֆորմուլաների կիրառման, մեր միութիւնը զեղազործների շատ քիչ կարիք կունենա, աչն ել գոյութիւնն ունեցող կանախեղէնաթի բնական նվազացումը ծածկելու համար: Այս հանգամանքն ևժանացնում է բուժողնութիւնն արժեքը և հանգիստնում է խոշոր ապրիոնալացման միջոցառում:

Վերջապէս ստանդարտ զեղաֆորմուլաները զուրս զրելու համար, մեր բուժարանները, միութենական քաղաքների շատ ամբողջատորաների պէս, կտրող են ունենալ պատրաստի տպագրված զեղատոմսեր, վորպիսի հանգամանքը մեծապէս կկրճատի բուժող բժշկի աշխատանքը, վորն առանց աչն ել բավական ժամանակ է կորցնում զբոսնչակալին զանազան զործողութիւնները վրա և իր աշխատանքի ընթացքում:

Ի զեպ՝ ավելորդ չէր լինի կանգ տունել մի շատ կարեոր հարցի վրա. աչն է՝ ինչպէս են վերարկելում հիվանդները ստանդարտալին ձեւերին:

Անդրտակից հիվանդներից վոմանք, զեղորայքը զեղատնից շուտ ստանալու զեպքում, մտածում են, թե ինչպէս կարելի չէ զեպն ազգպէս շուտ պատրաստել, ուրեմն, չեղրակացնում է

աղբալիս հիվանդը, թե դա իսկական զեղ չէ, այլ հասարակ, վարովհետե հիվանդները սովոր են լեղել մինչև վերջին ժամանակներս՝ զեղորայքի պատրաստման համար ժամեր սպասել:

— «Յերկար ժամանակ պատրաստող, աչն ել թանգ զեղը՝ լավ զեղ է»: Այսպես են մտածում շատ հիվանդներ: Աղբալիս զնահատականները հետեանք են հին, մինչդասերադմական բժշկական աշխատանքի. և խորհրդալին առողջապահության աստղարկում աշխատողները պետք և լարեն իրենց բոլոր ուժերը «լատինական խոհանոցի ամենակարողութեան» հատկացողութեանը վերացնելու, լաչն չափով ժողովրդականացնելով ստանդարտ ձևերի առավելութունը. մանավանդ, ոչ ինչ են պահանջում թե բժիշկների և թե հիվանդների շահերը:

Դժբախտաբար «զեղի կարողութեան» հատկացողութեանը մինչև որս իշխում և վոչ միայն հիվանդների գլուխներում, այլև մի քանի բուժող-բժիշկների, վորոնք սկզբունքորեն համաձայնելով խորհրդալին բժշկական հիմունքների հետ՝ բուժ-բժշկականութեանը համակելով պրոֆիլակտիկայով, մատը մատին չեն զարկում այդ գաղափարը գործնականում իրականացնելու համար: Մի-թե շատ տեղերում ամբուլատորալին հաճախումների և զեղատոմսերի քանակի

փոխարարերութեանը շատ ցածր և (1:0,45): Այդ փոխարարերութեանը մեղ մոտ՝ հաստատնում, շատ ավելի բարձր և 1:0,83: Այսպես և Յերեանի կենտրոնական ամբուլատորիայում, ուր հիվանդները ստանում են ավելի վորակյալ բուժողութեան, քան մյուս փոքր ամբուլատորիաներում. ուստի պետք և չենթադրել, և համարեն այդպես և և, վոր փոքր և վոչ վարակյալ ամբուլատորիաներում մենք ունենանք շատ ավելի բարձր թիվ: Այդ հարարերականը պարզապես ցույց և տալիս, թե վորչափ պրոֆիլակտիկ թեքում և տրված ամբուլատորալին ողնութեանը, քանի վոր չուրաքանչյուր հիվանդ գնալով բժշկի մոտ, ինչպես հնումն եր, սպասում և մի կամ մի քանի զեղատոմս ստանալու: Բայց զեղ կան բժիշկների, վորոնք անցյալի նման հիվանդին տեղատոմս են տալիս մասամբ նրա համար, վորպիսով ազատվին հիվանդից, իսկ ավելի հաճախ աչն պատճառով, վոր չեն կամենում փոխել իրենց աշխատանքի բնույթը:

Ո՞վ չի տեսել հիվանդների տներում սրվակների շարաններ, աչն ևլ չբացված: Այդ հիվանդները սովորած են լեղել տարիներ շարունակ գնալ դանազան հոշակավոր բժիշկների մոտ: Միթե հայտնի չէ, վոր անցյալում հիվանդներից վամենք իրենց չեկամուտի 50%՝ը ծախսում էին դանազան ֆիրմաների թանկարժեք զեղորայքի վրա: Առաջ գատարկվում էին առան-

ձին քաղաքացիներն զրապանները, իսկ ալժմս, շնորհիվ նախելին մոտեցման, զատարելվում են տուղջապահութեան սրգաններն զրապանները:

Վարդեա աղաքուչի կարող ենք բերել ալն փառաբ, փոր ալն բոլոր զեղատներում, փորանո զեղորաւքը բաց են թողնվում առանց վճարի, բաղմաթիվ սրվակներ զեղորաւքով լի՝ չեն վերցվում և մնում են զեղատներում: Հասարակ զրուչի հիվանդի հետ, և ալն խորհուրդը, փոր տրվում և հիվանդին, հաշի առնելով նրա կենցաղալին, սոցիալական և նշոթական պայմանները, ալիկի եղուտ կրերի նրան, քան զեղատումը:

Այս, իհարկե, զեա բոլորը չե, սա միալն սկիզբն և, իսկ շատ տեղերում մենք սկիզբն եւ չաւեննք,

Առժողկոմտար համոզված և, փոր տուղջապահութեան սրգանները չեաւնդուն կերպով ձեռնամուխ կլինեն ստանդարտալին ձեւերն իրենց բոժհիմնաթկներում անցկացնելու, և, մոտ ապագայում, ցուչի կտան նրանց կիրառման բարձր 0/6-ը:

Մեր տուղջապահութեան սրգանները կիրառելով ստանդարտ ֆորմուլաները, պետք և իջեցնեն ամբուլատորիալին հաճախումների և զեղատումների քանակը և նրանց արժեքը: Մի շարք

Պալատորաթիւներում, մանաւանդ Տուլալի փորձը, փալլուն կերպով աղաքուչի և վերսիշալը զործնականում:

Վստահ և վճառականութեամբ սկսենք հիվանդին զեղորաւքով բոժոգնութեան սպասարկման զործի բացիտնալացումը:

Առժողկոմի սեղակալ՝ Ղեկնդյաւ

1/VI 30 Յերեան

—

ԲՆԱԳՐԻ ՀԱՌԱՋԱԲԱՆԸ

Բժշկական պրակտիկայի հակա փորձը, վոր կա մեզ մոտ և արտասահմանում, անկասկածելի չեզարձնում աչն փաստը, վոր չնայած դոգություն ունեցող բազմաթիվ գեղաֆորմուլներին, վորոնք հարկավոր են կանոնավոր բժշկության համար և ապահովում են հիվանդին և ասողջապահության շահերը, կարելի չե, առանց հատուկ աշխատանքի, վերածել ավելի նվազ թվով տիպական ֆորմուլներին:

Կրկնվող տիպական ֆորմուլներ կաղմելիս՝ կարելի չե նկատի ունենալ վաղ միայն գեղերի ձև-վերը (փոշի, միքստուրա, սրսիսմներ և այլն), այլ և նրանց բազադրիչ մասերը:

Յեղնելով վերահիշյալ նկատառումներից, ՀՄՍՀ-ի Ժողովրդական Ասողջապահական Կոմիսարիատը մտահոգված և մասնաշաղկապ գործածության համար գեղատոմսերի խոշորագույն մասը վերածել ստանդարտ ձևի և գեղերը պատրաստել տալ տեխնիքային բարձր գործարաններում ու լաբորատորիաներում:

Դրան կարելի չե հասնել աչն գեղպում, չեթե մեր բուժասողջապահական հիմնարկներում աշխատող բժիշկները խստիվ պահպանեն

ու գործադրեն ընդունված ու հաստատված տիպական ֆորմուլները: Սակայն տիպական ֆորմուլները ընավ արգելք չեն կարող լինել բժշկին գրկելու նոր գեղատոմսեր գրելու նախաձեռնությունից: Պայմանով, վոր տիպական ֆորմուլներից շեղումը լինի բացառիկ դեպքերում, չերաչե բանը պահանջում են հիվանդի շահերը:

Ընդունված նոր ձևը մեզ կտա հետևյալ առավելությունը:—

ա) Հիմք ունենալով քիմիապես հաստատուն տիպական ֆորմուլները՝ մենք հնարավորություն կունենանք գեղերը նախապես պատրաստել մեծ քանակությամբ և չձգձգել, բազադրյալ բավարարել մասսաների պահանջը: Ասել ե՝ այս ձեկով գեղորայքը մեքե մոսեցրած կլիքեքե հիվանդի:

բ) Տեխնիքային կատարելագործված գործարաններում ու լաբորատորիաներում մասնաշաղկապ մեծաքանակ գեղորայքի պատրաստման ժամանակ, մենք հնարավորություն կունենանք հատկությամբ բարձրորակ գեղեր մատակարարել աշխատավորության, քան թե լավագույն գեղատներում տնայնագործ միջոցներով պատրաստված գեղերը:

գ) Դերջապես մեծ քանակով պատրաստված գեղորայքն տնհամեմատ ավելի արժան կնստեն, քան թե տեհն տնգամ «ex tempore» պատրաստվածներն են:

Ներկա զբոսիչի նպատակն է՝ ոգնել մեր շրջանային բուժաօգնականական կազմակերպություններին, առավել նրանց օգնական, բնական մնացուցն գեղերի ֆորմուլները։ Ներկա գեղացուցակը կազմված է նախապես Արածիկ-ների կողմից մշակված ցուցակներով, վերոնցից բնորոշված են ավելի գործածականները, ավելի հիմնականները։ Այս ցուցակը մշակմանը մասնակցել են մեր անվանի պրոֆեսորները, վերջված բժիշկներն ու գեղագործները։ Սակայն, չնայած դրան, ներկա ցուցակը հավանություն չունի լրիվ և սպասված համարվելու։ Նա նկատվելու չէ վերջին մասնաաներին գեղորայք մաստա-կարարելու գլուխացի միջոց։

Բոլոր մասնագիտությունների վերաբերյալ արդական ֆորմուլների ստանտարդացումը գեղեցիկ և բացիտնալիզացիայի չենթարկել չի նշանակում, բնականապես, իրական բացիտնալիզացիան տեղի կունենա այն ժամանակ, չերբ գեղացուցակի մեջ կմտցվեն նվազագույն թվով ֆորմուլներ։

Փորձը հաստատում է, վոր պրակտիկայով աշարապող բժիշկների գործածական գեղատոմսերը մի քանի տասնյակից ավելի չեն։ Հետևապես մեր տիպական գեղաֆորմուլները կազմված են խիստ ընտրությունը և պարունակում են իրենց մեջ նվազագույնը, մեր բուժ-առողջապահական հիմնարկներում աշխատող բժիշկներին կողմից առաջադրված անհանդուրժելի ու գործածական ֆորմուլաներից։

Սույն զբոսիչը կունենա և այն աստիճան-թյունը, վոր ուղեցույց կձառայի մեր լերիտա-տարդ ու անտիորձ բժիշկներին, վորոնք հաճախ կարիք ունեն իրենց առողջա պրակտիկայի ժամանակ գիմել ալս կամ ալն, բացիտնալիզացիայի տեսակետից, անվստահելի ձևանարկին։ Մեր ցուցակում ընդունված ֆորմուլները կլինեն լույս միայն լավ պատրաստված, ալ և նրանք կարող են քաղաքարել «ex tempore» պատրաստված-ներին։

Բժշկական Գիտական Խորհուրդը ներկա ցուցակում նախատեսում ֆորմուլներին տալիս է նաև այն մեծ տեսակետությունը, վոր նրանցից ամենարարը կազմված է 3—4 բաղադրիչ մասերից, իսկ սա մեծ գլուխություն է ստանդարտ ձևով գեղապատրաստություն համար։ Նման տեղի-ներական պալմաններն են ավելի բարձրորակ կղարձենն գործարաններում ու լաբորատորիա-ներում պատրաստվող գեղերը և աբժեքով ևլ մատչելի կլինեն մասններին։

Կասկածից զուրս է, վոր բժիշկներն իրենք շահագրգռված կլինեն և կնպաստեն սույն գլուխի մեջ նախատեսված ստանդարտ ֆորմուլ-ների գործածություն տարածման և ալլ ձևով ուղնած կլինեն առողջապահություն գործին, ինչպես և խորհրդային բժշկականության առաջադրված նպատակին։

բաւճարակ, մասշէլի մասսաներին յե՛վ շատ
խրագործելի:

Առողջապահական մարմինները պիտի ձեռք
առնեն բոլոր հնարավոր միջոցները Վերականգնող
ապահովին ներկա ձեռնարկի հաջողութեանը,
լախտրեն կիրարկելով աչն կշանքում:

ԱՍԽՀ-ի Առողջապահական կից գործող բժշկա-
գիտական խորհրդի կազմը յե՛վ այն պրոֆեսոր-
ները, բժիշկները յե՛վ գեղագործները, վարճի-
մասնաճիւղի եւ սույն գեղագործութեան ցու-
ցակի կազմելուն:

Պրոֆ. Բէշէկ, Արխիպյան, Մելիք-Աղամյան,
Ոսիպյան, Արզումանյան, Արծրունի, Արեգյան,
Հովհաննիսյան, Գարդաշյան, Դեռնգյան, Կարա-
պետյան Գ., Բոնարյան, Ալեքսանյան Պ., Դադար-
յան Ա.:

Բժ. Հակոբյան Արշ., Փիլոսոփյան, Կանա-
յան, Միրզա-Ավագյան, Մաշուր, Մելիք-Փար-
սադանյան, Կարապետյան Յիւրմանգ, Մոսովյան Վ.,
Լադարյան Ա., Զիլմարյան Գ., Մեղնիկյան Ն.,
Մանջույան Ա. և Ավագյան Մ.:



Քաղվածք Բժշկա-Գիտական Խորհրդի

8/VI 1930 թ. արձանագրությունից

Լսեցին — Բժշկական Գիտական Խորհրդի հաշիվի
8-ի նիստում բժ. Ղազարյանի ղեկավարած
ղեկերի ստանդարտիզացիայի մասին:

Վստեցին — Առժողովման Բուժ-Բաժնի կողմից
կազմած ստանդարտ ղեկաֆորմուլաների
ցանկը, վորը քննության և ասել Բժշկական
Գիտական Խորհրդից ընտրված հանձնա-
ժողովի կողմը՝ Մելիք-Ալամյան, Հով-
հաննիսյան և Ոսիպյան — հաստատել:

ՍՏԱՆԳԱՐՏ ԴԵՂԱՓՈՐՄՈՒԼԱՆԵՐԻ ՅՈՒՅՆԿԸ *)

I. ՏԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԻՆ

ա) ԸՆԴՀԱՆ ՈՒՐ ՏԵՐԱՊԻԱ.

ա) Տաբլետներ լեվ փոփներ

№ 1.

Rp. Antipyrini 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 2.

◆ Rp. Aspirini 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 3*.

Rp. Atophani 0,5.

D. t. d. № 6.

№ 4*.

Rp. Calcii glycerophosphorici 0,3.

D. t. d. № 10.

*) Ծանոթություն. — Սույն զբոյսով սե կետերով
նշանակված ղեկաֆորմուլաները վաճառքի մեջ են և Հայ-
րուժպետաութ պահեստներում ա ղեկատաներում վաճառքի
համար կապված պատրաստ, իսկ աստղերով՝ պահանջված
կշռի քանակով:

№ 5*.

Rp. Chinini muriatici 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 6*.

Rp. Diuretini 0,25 - 0,5.

D. t. d. № 6 in tabulettis.

№ 7*

Rp. Ferri lactici 0,3.

D. t. d. № 10

№ 8*

Rp. Heroini muriatici 0,003.

Sacchari albi 0,2.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 9*.

Rp. Morphii muriatici 0,01.

Sacchari albi 0,2.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 10.

◆ Rp. Natrii salicylici № 0,5.

D. t. d. № 6.

№ 11*.

Rp. Natrii salicylici 0,5.

Coffeini puri 0,05.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 12*.

Rp. Phenacetini 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 13*.

Rp. Phenacetini 0,5.

Coffeini puri 0,05.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 14.

Rp. Pyramidoni 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 15.

Rp. Pyramidoni 0,25

Coffeini puri 0,05.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 16.

Rp. Salipyrini 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 17.

Rp. Saloli

Urotropini aa 0,25.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 18.

◆ Rp. Saloli 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 19*.

Rp. Saloli

Urotropini aa 0,25

Extracti belladonae 0,015.

M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 20*

Rp. Urotropini (hexamethylen tetramin) № 0,25

D. t. d. № 10

№ 21.

Rp. Véronali 0,25.

D. t. d. № 3.

Р. Лоплер

№ 22.

◆ Rp. Acidi arsenicosi 0,03

Ferri lactici 9,0

Extracti et pulveris liquiritiae q. s
ut fiant pilulae № 30.

№ 23.

◆ Rp. Pilularum Blandi № 30—60.

№ 24.

◆ Rp. Strychnini nitrici 0,02

Extracti et pulveris liquiritiae q. s.
ut fiant pilulae № 30.

q. Удугуцлер

№ 25.

◆ Rp. Solutionis Ergotini 20%—1,0 (ampula).

№ 26.

◆ Rp. Solutionis Morphii muriatici 1%—1,0
(ampula).

№ 27.

◆ Rp. Natrii arsenicici 0,01

Aquae destillatae 1,0 (ampula).

№ 28.

◆ Rp. Natri kakodylici 5%—1,0 (ampula).

№ 29.

Rp. Strychnini nitrici 0,1%—1,0 (ampula).

q. Удугуцлер

№ 30.

Rp. Extracti Belladonnae 0,015

Butyri Cacao 1,5.

M. f. Suppositorium. D. t. d. № 6.

№ 31.

Rp. Extracti Opii 0,015

Butyri Cacao 1,5.

M. f. Suppositorium. D. t. d. № 6.

№ 32.

Rp. Morphii muriatici 0,01

Butyri Cacao 1,5.

M. f. Suppositorium D. t. d. № 6.

h. Удугуцлер

№ 33.

Rp. Liquoris arsenicalis Fowleri 5,0

Aquae Menthae 25,0.

M. D. S.

№ 34.

◆ Rp. Liquoris Ferri albuminati 100,0.

№ 35.

Rp. Olei Jecoris Aselli 100,0.

№ 36.

Rp. Syrupi Ferri iodati 20,0.

- ◆ Rp. Tincturae Ferri pomati 30,0.
№ 37.
№ 38.
◆ Rp. Tincturae Jodi 10,0.
№ 39.
◆ Rp. Tincturae Opii simplicis 5,0.
№ 40.
Rp. Tincturae Valerianae aetherae
Liquoris Anodini Hoffmani aa 10,0.
M. D. S.

- № 41.
Rp. Tincturae Myrrhae
" Ratanhiae
" Gallarum aa 5,0.
M. D. S.

Գ. ԶԱՆՈՒՄ

- № 42.
Rp. Foliorum Uvae ursi 20,0.
№ 43.
Rp. Natrii Bicarbonici 30,0
Է. Ex tempore Պատրաստված զեղանորմա-
լաների ցուցակը

- № 44
Rp. Aspirini
Phenacetini aa 0,25
Coffeini puri 0,05.
M. f. p. D. t. d. 6.

- № 45.
Rp. Aspirini 0,5
Coffeini puri 0,05.
M. t. p. D. t. d. № 6.

- № 46.
Rp. Atropini sulfurici 0,01
Extracti Gentianae q. s.
ut fiant pilulae № 29.

- № 47.
Rp. Infusi Adonidis vernalis 6,0—200,0
Kali acetici 10,0
M. D. S.

- № 48.
Rp. Morphii muriatici 0,1
Aquae Amygdalarum amararum 10,0
M. D. S.

- № 49.
Rp. Pontoponi 0,1
Aquae Amygdalarum amararum 10,0
M. D. S.

- № 50.
Rp. Solutionis Kalii iodati 4,0 (6,0)-200,0.
D. S.

- № 51.
Rp. Solutionis Natrii iodati 4,0 (6,0) 200,0.
D. S.

բ. ԹՈՔԵՐԻ ՀԻԼԱՆԴՈՒԹՈՒՆՆԵՐ.

ա ՏԱՐԼԵՏՆԵՐ, ՓԱՇԻՏՆԵՐ յԵՎ ԽԱՐՔԵՐ

№ 52*.

Rp. Codeini puri 0,01
Sacchari albi 0,25.

M. f. p. D. t. d. № 10—20.

№ 53.

Rp. Codeini puri 0,01
Terpini hydrati 0,25.

M. f. p. D. t. d. № 6—10

№ 54*.

R. Guajacoli carbonici 0,5
Codeini puri 0,01.

M. f. p. D. t. d. № 10—20.

№ 55*.

Rp. Pulveris Doweri
Natrii bicarbonici aa 0,25.
M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 56*.

Rp. Thiocoli (Kalii sulfoguajacolic) 0,5.
D. t. d. № 10.

№ 57:

Rp. Kreosoti Fagi 3,0
Pulveris Liquiritiae q. s.
ut fiant pilul. № 30.

բ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ

№ 58.

◆ Rp. Elixiri pectoralis 20,0.

№ 59.

Rp. Kreosoti Fagi 4,0
Tincturae Gentianae 16,0.
M. D. S.

№ 60.

Rp. Creosotali 20,0.

№ 61.

◆ Rp. Liquoris Ammonii anisati 15,0.

գ. Ex tempore պատրաստած դեղաժամուռա-
ների ցուցակը

№ 62.

Rp. Codeini phosphorici 0,1
Aquae Amygdalarum amararum 10,0.
M. D. S

№ 63

Rp. Dionini 0,1
Aquae Amygdalarum amararum 10,0.
M. D. S.

№ 64.

Rp. Heroini hydrochlorici 0,05
Aquae Amygdalarum amararum 10,0.
M. D. S.

№ 65.

Rp. Infusi Ipecacuanhae e 0,5 200,0
Liquoris Ammonii anisati
Natrii bicarbonici aa 4,0.
M. D. S.

№ 66.

Rp. Solutionis Calcii chlorati
ex 8,0 — 20,0 — 200,0.

Գ. ՄՐՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (կարգիտողիս)

ա. Տաբլետներ, փոշիներ, կապսուլներ և խաբեր

№ 67.

Rp. Camphorae monobromatae 0,15.
D. t. d. № 6 in caps. gelatinos.

№ 68.

Rp. Camphorae monobromatae
Chinini bromati aa 3,0
ut fiant pilulae № 30 (seu tabulettae).

№ 69*.

Rp. Coffeini natrio-benzoici 0,15.
D. t. d. № 6.

№ 70*.

Rp. Coffeini natrio-salicylici 0,15.
D. t. d. № 6.

№ 71*.

Rp. Diuretini 0,25 0,5.
D. t. d. № 10 (in tabulettis).

№ 72.

Rp. Nitroglycerini 0,0005
in tabulettis № 6.

2*

բ. Օւսպուլներ

№ 73.

◆ Rp. Solutionis Coffeini natrio-benzoici 20%
(pro injectionibus) — 1,0 in ampulis.

№ 74

◆ Rp. Solutionis Coffeini natrio-benzoici 10%
(pro injectionibus) — 1,0 in ampulis.

№ 75.

◆ Rp. Olei Comphorae 20% — 1,0 (in ampul.).

գ. Հեղուկներ

№ 76.

Rp. Adonileni 10,0.

№ 77.

◆ Rp. Digaleni (Gitaleni) 5,0.

№ 78.

◆ Rp. Diginormi 5,0.

№ 79.

◆ Rp. Tincturae Convallariae majalis 10,0.

№ 80.

◆ Rp. Tincturae Strophanthi 5,0.

№ 81.

Rp Tincturae Convallariae majalis
" Valerianae aethereae aa 7,5.
M. D. S.

№ 82.

Rp. Tincturae Strophanti
" Nucis vomicae aa 5,0.
M. D. S.

№ 83.

Rp. Tincturae Strophanti 5,0
 " Valerianae 10,0.
 M. D. S.

№ 84.

◆ Rp. Tincturae Valerianae aethereae 15,0.

№ 85.

◆ Rp. Tincturae Valerianae simplicis 15,0.

7. Ex tempore Պատրաստված դեղաճորժուկա-
 ցների ցուցակը

№ 86.

Rp. Camphorae 0,1.
 D. t. d. № 6.

№ 87.

Rp. Infusi Adonidis vernalis e 6,0 (8,0) 200,0

№ 88.

Rp. Infusi Adonidis vernalis e 6,0—200,0
 Natrii bromati 8,0.
 M. D. S.

№ 89.

Rp. Infusi Foliorum Digitalis 0,5 (1,0)-200,0.

№ 90.

Rp. Pulveris Foliorum Digitalis 0,1
 Sacchari lactis 0,3.
 M. f. p. D. t. d. № 6.

7. ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒ-
 ԹՅՈՒՆՆԵՐ

ա. Տաբլետներ, փոշիներ լեզ կապսուլներ

№ 91*.

Rp. Benzonaphtholi 0,25.
 D. t. d. № 6.

№ 92*.

Rp. Bismuthi salicylici 0,5.
 D. t. d. № 6.

№ 93*.

Rp. Bismuthi subnitrici 0,5.
 d. t. d. № 6.

№ 94.

Rp. Bismuthi subnitrici 0,25.
 Magnesiae ustae 0,5

Extracti Belladonnae 0,01.
 M. f. p. D. t. d. № 6—10.

№ 95*.

Rp. Bismuthi subnitrici
 Saloli aa 0,25.
 M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 96*.

Rp. Bismuthi subnitrici
 Saloli aa 0,5.
 Extracti Opil 0,015
 M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 97*.

Rp. Bismuthi subnitrici
Tannalbin aa 0,5.
M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 98*.

Rp. Bismuthi subnitrici
Tannalbin aa 0,5
Extracti Opii 0,015.
M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 99.

Rp. Extracti Filicis maris 1,0
in capsulis gelatinosis.
D. t. d. № 6.

№ 100.

Rp. Magnesiae perhydrol 25⁰/₀ — 0,5.
D. t. d. № 6.

№ 101*.

Rp. Natrii bicarbonici 0,25
Extracti Belladonnae 0,015.
D. t. d. № 6.

№ 102.

Rp. Papaverini 0,02
Extracti Belladonnae 0,01
Sacchari albi 0,2.
D. t. d. № 6.

№ 103*.

Rp. Pulveris radiceis Rhei 0,5.
D. t. d. № 6.

№ 104*.

Rp. Radiceis Rhei pulveratae
Natrii bicarbonici 0,5.
M. f. p. D. t. d. № 6--10.

№ 105*.

Rp. Saloli 0,25
Extracti Belladonnae 0,015.
M. f. p. D. t. d. № 6.

№ 106*.

Rp. Santonini 0,02
Sacchari 0,25.
D. t. d. № 6 - 10 (in pulveribus seu trochiscis).

№ 107*.

Rp. Tannalbin 0,25.
D. t. d. № 6.

№ 108*.

Rp. Tannalbin 0,5.
D. t. d. № 6.

4. ԳԼՈՒԽԵՐ յԵՎ ԴՈՒՆԵՐ

№ 109*.

Rp. Extracti Belladonnae 0,015
Butyri Cacao 1,5.
D. t. d. № 6. Suppositoria.

№ 110*.

Rp. Dermatoli 0,25
Ichthyoli 0,1
Butyri Cacao 1,5.
D. t. d. № 6. Suppositoria.



№ 111*.

Rp. Ichthyoli 0,25

Extracti Belladonnae 0,015

Butyri Cacao 1,5.

D. t. d. № 6. Suppositoria.

№ 112*.

Rp. Extracti Hamamelidis virgin. 0,12

" Belladonnae 0,02

Dermatoli 0,25

Butyri Cacao 2,0

D. t. d. № 6.

Suppositoria.

գ. Հեղուկներ

№ 113.

◆ Rp. Acidi muriatici diluti 15,0.

№ 114.

◆ Aquae Amygdalarum amararum 10,0.

№ 115.

Rp. Extracti Condurango fluidi 15,0.

№ 116.

◆ Rp. Extracti Frangulae fluidi 15,0.

№ 117

◆ Rp. Guttarum Botkini 10,0.

№ 118.

◆ Rp. Guttarum Inosemzoff. 10,0.

№ 119.

Rp. Infusi Sennae compositi 25,0- 50,0.

№ 120.

◆ Rp. Olei Ricini 30,0.

№ 121.

◆ Rp. Tincturae amarae 10,0.

№ 122.

◆ Rp. Tincturae Belladonnae 5,0.

№ 123.

◆ Rp. Tincturae Menthae 10,0.

№ 124.

◆ Rp. Tincturae Opii simplicis 5,0

№ 125.

Rp. Tincturae Strychni 5,0.

Condurango 15,0.

M. D. S.

№ 126.

Rp. Tincturae Strychni 5,0.

" Valerianae aethereae 10,0

M. D. S.

դ. Ջուրներ

№ 127

Rp. Foliorum Sennae 15,0.

№ 128.

Rp. Magnesiae ustae 10,0 (банки с пробкой).

№ 129.

◆ Rp. Magnesiae sulfuricae 25,0.

№ 130.

◆ Rp. Natrii sulfurici 25,0.

№ 131.

◆ Rp. Pulveris Liquiritiae compositi 15,0 — 25,0.

№ 132.

◆ Rp. Salis Carolini facticii 25,0.

Է. Ex tempore պատրաստված դեղաժուրճուկա-
ցերի ցուցակը

№ 133.

Rp. Argenti nitrici 0,05.

Boli albi q. s., ut fiant pilul. № 30

№ 134.

Rp. Emulsionis Amygdalarum dulcium 200,0.

№ 135.

Rp. Emulsionis Amygdalarum dulcium 200,0.
Amygdalini 0,06. M. D. S.

№ 136.

Rp. Emulsionis Olei Ricini 10% — 200,0.

№ 137.

Rp. Emulsionis Olei Ricini 20% — 200,0.

№ 138.

Rp. Magnesiae ustae 0,5

Extracti Belladonnae 0,015.

M. f. p. D. t. d № 6—10.

2. ԱԿԱՆՁԻ, ՔՔԻ ՅԵՎ ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒ- ՔՅՈՒՆՆԵՐ

ա. Փոփոցներ

№ 139.

◆ Rp. Acidi borici 10,0.

№ 140.

◆ Rp. Foliorum Salviae 25,0.

№ 141.

Rp. Kali chlorici 10,0.

№ 142.

Rp. Acidi Borici 0,5

Spirit. Vini 12,0

Aq. destill. 3,0

№ 143.

Rp. Natrii sozodolici 2,0.

Mentholi 0,2

Acidi borici 15,0.

M. D. S. (в жест. коробке)

բ. Հեղուկներ

№ 144.

Rp. Acidi borici 0,25.

Spiritus vini rectificati

Glycerini aa 5,0.

M. D. S.

№ 145.

Rp. Acidi carbolici 0,5.

Glycerini 10,0.

M. D. S.

№ 146.

◆ Rp. Hydrogenii hyperoxydati
medicinalis 30,0.

№ 147.

Rp. Mentholi 0,1—2,0
Olei Vaselini 10,0.
M. D. S.

№ 148.

Rp. Natrii bicarbonici 0,5
Aquae destillatae
Glycerini aa 5,0.
M. D. S.

№ 149.

Rp. Jodi puri 0,25
Kalii jodati 0,5
Glycerini 25,0
Olei Menthae piperitae guttas 2 (duas).
M. D. S.

№ 150.

Rp. Thygenoli 0,25
Glicerini 15,0.
M. D. S.

դ. Ex tempore պատրաստված դեղաժուրմուկ-
ների ցուցակը

№ 151.

Rp. Hydrargyri praecipitati flavi 0,25
Olei Amygdalarum 2,0
Lanolini
Vaselini americani aa 5,0.
M. f. Unguentum.
D. S.

№ 152.

Rp. Hydrogenii hyperoxydati medicinalis
Spiritus Vini rectificati aa 5,0.
M. D. S.

№ 153.

Rp. Liquoris Aluminii aceticici 2,0
Aquae destillatae 10,0.
M. D. S.

№ 154

Rp. Solutionis Collargoli 3%—10,0.

3. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

ա. Հեղուկներ

№ 155.

Rp. Cupri sulfurici 0,05—0,1
Aquae destillatae
Glycerini aa 5,0.
M. D. S.

№ 156.

Rp. Solutionis Hydrargyri
oxycyanati 1 : 5000—200,0.

№ 157.

Rp. Kalii permanganici 3%—10,0
(մի բաժակ ջրին 10 կաթիլ):

№ 158.

Rp. Zinci sulfurici 0,025
Solutionis Acidi borici 2%—10,0.
M. D. S.

**բ. Ex tempore պատրաստված դեղաձուրմուկ-
ների ցուցակը**

1. Հեղուկներ

№ 159.

Rp. Eserini salicylici 0,01
Pilocarpini hydrochlorici 0,05
Aquae destillatae 5,0.
M. D. S.

№ 160

Rp. Solutionis Argenti nitrici 1⁰/₀—10,0.

№ 161.

Rp. Solutionis Argenti nitrici 1⁰/₄—10,0.

№ 162.

Rp. Solutionis Chinini hydrochlorici
sine Acido hydrochlorato paratae 1⁰/₀—5,0.

№ 163.

Rp. Solutionis Collargoli 3⁰/₀—5,0.

№ 164.

Rp. Solutionis Dionini 10⁰/₀—5,0.

№ 165.

Rp. Solutionis Dionini 5⁰/₀—5,0.

№ 166.

Rp. Solutionis Eserini salicylici 1⁰/₄—5,0.

№ 167.

Rp. Solutionis Optochini muriatici 1⁰/₀—5,0.

№ 168.

Rp. Solutionis Pilocarpini muriatici 1⁰/₀—5,0.

№ 169.

Rp. Solutionis Protargoli 5⁰/₀—5,0.

№ 170.

Rp. Solutionis Protargoli 3⁰/₀—5,0.

№ 171.

Rp. Solutionis Rivanoli 1 : 1000—5,0.

№ 172.

Rp. Solutionis Scopolamini
hydrobromati 0,025—10,0.

2. ՌՃԱՃԱԿՆԵՐ (мази)

№ 173.

Rp. Airoli 0,25
Vasellini americani albi 5,0.
M. f. Unguentum. D. S.

№ 174.

Rp. Atropini sulfurici 0,025
Xeroformii 0,25
Vasellini americani 5,0.
M. f. Unguentum. D. S.

№ 175

Rp. Cupri sitrici 0,5
Unguenti Glycerini 10,0.
M. D. S.

№ 176.

Rp. Unguenti praecipitati flavi 1⁰/₀—5,0.

№ 177.

Rp. Eserini sulfurici 0,01
Xeroformii 0,15
Vasellini 5,0.
M. D. S.

№ 178.

Rp Xeroformii 0,25
Vasellini flavi americani 5,0
M. f. Unguentum.
D. S.

4. ՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ա. Փոփոցներ յեկ խոփներ

№ 179.

◆ Rp. Dermatoli 2,0.

№ 180.

◆ Rp. Florum Chamomillae 10,0.

№ 181.

Rp. Kalii chlorici 10,0.

№ 182.

Rp. Kalii hypermanganici 2,0.

№ 183.

◆ Rp. Talci veneti 25,0.

№ 184.

◆ Rp. Xeroformii 2,0.

№ 185.

Rp. Zinci oxydati 2,0
Talci veneti 2,0.
M. f. pulv. D. S.

բ. Հեղուկներ յեկ յուղեր

№ 186.

Rp. Acidi carbolici liquefacti 2,0
Aquae destillatae 200,0.
M. D. S.

№ 187.

Rp. Acidi lactici
Acidi salicylici aa 1,0
Collodii elastici 10,0.
M. D. S.

№ 188.

Rp. Formalini 30,0.

№ 189.

◆ Rp. Hydrogenii hyperoxydati medicinalis 30,0.

№ 190.

◆ Rp. Liquoris Burowi 50,0 — 200,0,

№ 191.

◆ Rp. Spiritus saponati kalini Hebrae 50,0 — 100,0

№ 192.

◆ Rp. Tincturae Jodi 5,0, — 10,0.

գ. Ռծաճակներ յեկ սպեղանիներ

№ 193.

Rp. Acidi salicylici 0,5
Zinci oxydati
Amyli Triticac aa 6,25
Vasellini 12,0.
M. f. Pasta. D. S.
(Pasta Lassari):

№ 194.

Rp. Saponis viridis 30,0.

№ 195.

Rp. Unguenti Acidi borici 2⁰/₀—15,0.

№ 196.

Rp. Unguenti Bismuthi subnitrici 10⁰/₀—15,0.

№ 197.

Rp. Unguenti sulfurati 2⁰/₀—5⁰/₀—10⁰/₀—20,0.

№ 198.

◆ Rp. Unguenti Zinci 15,0.

№ 199.

◆ Rp. Unguenti Wilkinsoni 50,0.

№ 200.

Rp. Unguenti Xeroformii 2⁰/₀—10,0.

№ 201.

Rp. Vaselini americani 10,0.

№ 202.

Rc. Zinci oxydati

Amyli Triticæ aa 5,0

Vaselini 10,0.

M. f. Unguentum. D. S.

դ. Ex tempore պատրաստված գեղաճորմուկա-
նների ցուցակը

1. Հեղուկներ յեղ յուղեր

№ 203.

Rp. Aquæ Plumbi—200,0.

№ 204.

Rp. Linimenti calcarei 50,0—100,0.

2. ՈՑԱՆԱԿՆԵՐ

№ 205.

Rp. Argenti nitrici 0,2

Balsami Peruviani 2,0

Vaselini flavi 20,0.

M. f. Unguentum.

D. S.

№ 206.

ԽՐ. Unguenti Diachyloni 30,0.

№ 207.

Rp. Unguenti Diachyloni 2,0

Olei fagi 20,0.

M. f. Unguentum.

D. S.

№ 208.

Rp. Unguenti Hydrargyri præcipitati albi

1⁰/₀—2⁰/₀—3⁰/₀—10⁰/₀—15,0.

5. ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

ա. Փոփոխներ

№ 209.

Rp. Calomelanos 3,0.

№ 210.

Rp Calomelanos

Talcı veneti aa 3,0.

D. S.

№ 211.

◆ Rp. Jodoformii 2,0.

բ. Հեղուկներ

№ 212.

Rp. Balsami Copaivae 10,0.

№ 213.

Rp. Balsami Copaivae
Tincturae Cannabis Indicae aa 10,0.
M. D. S.

№ 214.

Rp. Solutionis Lugoli 10,0.

№ 215.

Rp. Olei santali 5,0.

գ. Ոձաճակերի լիկ սպեղանիներ

№ 216.

Rp. Unguenti Hydrargyri cinerei 2,0—4,0.
D. t. d. № 6.

№ 217.

Rp. Emplastri Hydrargyri extensi magnitudine
chartae luseriae.

**դ. Ex tempore պատրաստված դեղաճորժուկա-
ները ցուցակը**

№ 218.

Rp. Jodi puri 0,3
Kalii jodati 0,5
Astringuae porci 15,0.
M. f. Unguentum.
D. S.

№ 219.

Rp. Solutionis Argenti nitrici 1%—15,0.

№ 220.

Rp. Solutionis Argenti nitrici 1/2%—200,0.

№ 221.

Rp. Solutionis Argenti nitrici 1/4%—200,0. H

№ 222.

Rp. Solutionis Kalii hypermanganici 0,05%—200,0.

№ 223

Rp. Solutionis Protargoli 1/4%—200,0.

№ 224.

Rp. Solutionis Protargoli 1/2%—200,0.

6. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ՅԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ԲԱՐՃԻՆ

ա. Փոփներ, ռաբլետներ լիկ հաբեր

№ 225.

◆ Rp. Ergotini 2,0
Extracti Liquiritiae q. s , ut fiant pilul. № 20.

№ 226*.

Rp. Mammini 0,3.
D. t. d. № 10.

№ 227.

Rp. Stypticini 0,05.
D. t. d. № 6.

(В дражирован. таблетках с молочным сахаром).

բ. Հեղուկներ

№ 228.

Rp. Extracti Hamamelidis virgin. 15,0.

№ 229.

Rp. Extracti Hydrastis canadensis fluidi 10,0.

№ 230.

◆ Rp. Extracti Polygonii hydropiperis 20,0.

№ 231.

◆ Rp. Extracti Secalis Secalis cornuti fluidi 10,0.

№ 232.

◆ Rp. Extracti Viburni 10,0.

№ 233.

Rp. Tincturae Belladonnae 5,0

" Valerianae simplicis 10,0.

M. D. S.

№ 234

Rp. Tincturae Opii 5,0.

" Valerianae simplicis 10,0.

M. D. S.

դ. Արտաբից գործածութեան հիշուք

№ 235.

Rp. Aceti pyrolignosi crudi 200,0.

№ 236.

Rp. Solutionis Cupri sulfurici 2^o/₀—200,0.

№ 237.

Rp. Solutionis Formalini 8^o/₀ - 100,0.

№ 238.

Rp. Ichthyoli 2,0

Glycerini 20,0.

M. D. S.

№ 239.

◆ Rp. Lysoformii 50,0.

№ 240.

◆ Rp. Lysoli 30,0.

№ 241.

Rp. Zinci sulfurici

Aluminis aa 15,0.

M. f. pulvis D. S.

զ. Գլխավորներ

№ 242.

Rp. Extracti Belladonnae 0,01

Butyri Cacao 1,5

M. f. Globuli.

D. t. d № 6.

**Է. Ex tempore պատրաստված դեղաձուլու-
թիւնի ցուցակը**

№ 243

Rp. Secalis cornuti pulverati 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 244.

Rp. Secalis cornuti pulverati 0,5.

D. t. d. № 6.

№ 245

Rp. Ergotini Benjeani 2,0

Glycerini 5,0

Aquae Menthae pip. 15,0.

M. D. S.

7. ՆԵՐՎԱ-ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ա. Փոսթներ, ապրեսկաներ լեվ կապսուլներ

№ 246*.

Rp. Adalini 0,3.

D. t. d. № 6.

№ 247

Rp. Aspirini 0,25

Phenacetini 0,2

Coffeini 0,05.

M. f. pulv. D. t. d. № 6.

№ 248.

Rp. Camphrae monobromatae 0,15.

D. t. d. № 6 in capsulis gelatinosis.

№ 249.

Rp. Chinini bromati 0,1.

D. t. d. № 6.

№ 250*.

Rp. Luminali 0,05.

D. t. d. № 6.

№ 251*.

Rp. Luminali 0,15.

D. t. d. № 6.

№ 252.

Rp. Pyramidoni 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 253*.

Rp. Phenacetini 0,25.

D. t. d. № 6.

№ 254.

Rp. Sajodini 0,5.

D. t. d. № 6:

№ 255.

Rp. Trionali 0,5.

D. t. d. № 3.

№ 256.

Rp. Veronali 0,25.

D. t. d. № 3.

բ. Լեղուկներ

№ 257.

Rp. Solutionis Urotropini 40% sterilisatae 30,0.

№ 258.

Rp. Tincturae Valerianae aethereae 10,0.

№ 331.

Rp. Tincturae Valerianae simplicis 10,0.

Natrii bromati 4,0

№ 259.

Rp. Validoli 5,0.

դ. Ex tempore պատրաստված դեղաժուրմուկների ցուցակը

№ 260.

Rp. Ammonii bromati

Kalii bromati aa 4,0

Natrii bromati 2,0

Aquae destillatae 200,0.

M. D. S.

№ 261.

Rp. Infusi Adonidis vernalis 6,0 - 200,0

Natrii bromati 8,0

Dodeini 0,1.

M. D. S.

№ 262.

Rp. Infusi Valerianae 6,0 - 200,0

Natrii bromati 8,0:

M. D. S

№ 263.

Rp. Kalii jodati 6,0 - 200,0.

№ 264.

Rp. Solutionis Kalii bromati 4,0 - 6,0 - 8,0 - 200,0.

№ 265.

Rp. Solutionis Natrii bromati 4,0 - 8,0 - 200,0.

№ 266.

Rp. Solutionis Calcii bromati 6,0 - 200,0.

№ 267.

Rp. Solutionis Strontii bromati 6,0 - 200,0.

ՀԱՍՏԱՎԱԾՈՐՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻ ԱՆԳՍՍ ՅԵՎ ՈՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱԾՎԵԼԻՒՔ (գրամմերով) ՅՈՒՆԱԿՈՐ ՅԵՎ
ԽԵՍՆԵՐԳՈՐԾՈՂ-ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՈՋԱՆԵՐԸ

Դ Ե Ղ Ա Ն Յ Ո Ւ Ք Ե Ր Ի		Մ ի ա ն գ ա մ Գ ռ ա մ մ ե ռ յ ք Գ լ ե ղ ի բ ա ռ ճ ի Հ ա թ ի (գ ղ յ ա ն) Ո լ ա ն, ք ի- Գ ռ ա ն, Գ ղ յ ի Բ ա ռ ճ ի Հ ա թ ի (գ ղ յ ա ն)	
ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ			
Acetanilidum	0,5	1,5	
Acidum arsenicosum	0,005	0,01	
„ diaethylbarbituricum	0,75	1,5	
„ hydrochloratum pur. dilut	0,5	4,0	
„ nitricum pur. dilut	1,0	3,0	
„ phosphoricum pur. dilut	1,0	3,0	
„ sulfuricnm pur. dilut	1,0	3,0	
Adrenalin. hydrochl. solutum 1:1000	1,0	—	
„ „ „ подочно	1,0	—	
Aether purus	1,0	—	
Aethylum bromatum	0,6	—	
Aethylmorphinum hydrochloricum	0,03	0,1	
Amygdalinum	0,02	0,06	
Amylium nitrosum	0,2	—	
Antipyrinum	2,0	6,0	
„ salicylicum	1,0	4,0	
Apomorphinum hydrochloricum	0,01	0,05	
„ „ подочно	0,005	—	
Arecolinum hydrobromicum	0,0005	0,0015	
Aqua Amygdalarum amararum	2,0	6,0	
Argentum nitricum	0,03	0,1	
„ colloidalе (внутривенно)	0,25	0,5	
Atropinum sulfuricum	0,001	0,003	

Դ Ե Ղ Ա Ն Յ ՈՒ Թ Ե Ր Ի

ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Մի անգամ
ընդունելիք
դեղի բաժնի
չափը (գրգռն)

Որակ. բն-
դուն. դեղի
բաժնի չափը
(գրգռն)

Bismuthum salicylicum basicum	1,0	3,0
Cantharis	0,03	0,1
Chloralum hydratum	2,0	6,0
Chloroformium	0,5	1,0
Cocainum hydrochloricum	0,03	0,12
Codeinum	0,05	0,2
» phosphoricum	0,1	0,3
Coffeinum	0,5	1,5
» natrio-benzoicum	1,0	3,0
» natrio-salicylicum	1,0	3,0
Cuprum sulfuricum (как пвотное)	0,5	—
Diacetylmorphinum hydrochloricum	0,005	0,015
Diuretinum	1,0	6,0
Extractum Belladonnae	0,05	0,15
» Cannabis Indicae	0,1	0,3
» Filicis maris	8,0	—
» Hyoscyami	0,06	0,3
» Opii	0,05	0,03
» Secalis cornuti spissum	0,3	1,0
» » fluidum	1,0	3,0
» Strychni	0,03	0,1
Folium Belladonnae	0,2	0,6
» Digitalis	0,2	1,0
» Hyoscyami	0,4	1,2
» Stramonii	0,2	0,6
Hedonalum	1,5	3,0
Herba Adonidis vernalis	0,8	10,0

Դ Ե Ղ Ա Ն Յ ՈՒ Թ Ե Ր Ի

ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Մի անգամ
ընդունելիք
դեղի բաժնի
չափը (գրգռն)

Որակ. բն-
դուն. դեղի
բաժնի չափը
(գրգռն)

» Cannabis Indicae	0,2	0,6
Homatropinum hydrobromicum	0,001	0,003
Hydrargyrum bichloratum	0,02	0,6
» bijodatum	0,02	0,6
» chloratum mite	0,6	1,8
» » vapore parat	0,6	1,8
Hydrargyrum cyanatum	0,01	0,03
» oxycyanatum	0,01	0,03
» oxydatum rubrum	0,02	0,06
» » flavum	0,02	0,06
» salicylicum	0,02	0,06
Infusum Ipecacuanhae concentratum	2,0	4,0
Jodoformium	0,2	0,6
Jodum	0,02	0,06
Kreosotum	0,5	1,5
Liquor Kalii arsenicosi	0,2	0,6
Morphim hydrochloricum	0,03	0,1
Natrium arsenicum	0,003	0,01
» kakodylicum	0,06	0,2
Neosalvarsanum (внутривенно)	1,2	—
Nitroglycerinum solutum	0,1	0,3
Novocainum (подкожно)	0,3	—
Oleum Crotonis	0,05	1,0
Opium	0,1	0,3
Orthoformium	1,0	3,0
Paraldehydum	5,0	10,0
Phenacetinum	1,0	3,0

Այլ անգամ
ընդ չնկելիք
զեղելի բարձր
չափը (զոգան)
Արտիկ. բն-
դու. ն. զեղելի
բարձր չափը
(զոգան)

Phenolum purum	0,1	0,3
Phosphorus	0001	0,003
Physostigminum salicylicum	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum	00,2	0,04
Pituitrinum (подкожно)	1,0	—
Podophyllum	0,1	0,3
Pulvis Ipecacuanhae opiatum	1,0	4,0
Pyramidonum	0,5	1,5
Radix Ipecacuanhae (как рвотное)	1,0	—
Resina Jalapae	0,15	0,5
Santoninum	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromicum	0,0005	0,0015
Secale cornutum	1,0	5,0
Seuen Strychni	0,1	0,3
Stibio-Kalium tartaricum	0,1	0,3
Strychninum nitricum	0,003	0,01
Stypticinum	0,1	0,3
Sulfonalum	2,0	4,0
Tabulettae Nitroglycerini (à 0,0005)	2 шт.	6 шт.
Thyreoidinum	0,3	1,0
Tinctura Aconiti	0,5	1,5
» Belladonnae	0,5	1,5
» Cannabis Indicae	1,25	3,75
» Cantharidis	0,2	0,6
» Convallariae majalis	1,25	3,75
» Digitalis	1,0	3,0
» Ipecacuanhae	2,0	4,0

Այլ անգամ
ընդ չնկելիք
զեղելի բարձր
չափը (զոգան)
Արտիկ. բն-
դու. ն. զեղելի
բարձր չափը
(զոգան)

» Jodi	0,2	0,6
» Opi crocata	1,0	3,0
» Opi simplex	1,0	3,0
» Strophanti	0,5	1,5
» Strychni	1,0	3,0
» Veratri albi	1,0	3,0
Trochisci Santonini (à 0,03)	3 шт.	10шт.
Tuber Aconiti	0,1	0,3
Veratrinum	0,002	0,006
Zincum sulfuricum (как 1 рвотное)	1,0	—
Zincum valerianicum	0,1	0,3

ԾԱՌԱՅՐ. 1. — Գրքայի մեջ ցույց տված
թունավոր և խիստ ներգործող զեղանյութերի
բարձրագույն զոգանները նախատեսված են 25
տարեկանից բարձր հասակ ունեցողների համար:
Չափահասների և լեքիտանների զոգանները
պահանջում են համաձայն իրենց տարիքի հեռե-
լալ կերպով. —

Չափահասին՝ 18 տ. տալիս են հասակ. զոգայի	$\frac{3}{4}$
» 14 » » » » »	$\frac{1}{2}$
Յերեկաններին 7 » » » » »	$\frac{1}{3}$
» 6 » » » » »	$\frac{1}{4}$
» 4 » » » » »	$\frac{1}{6}$
» 2 » » » » »	$\frac{1}{8}$
» 1 » » » » »	$\frac{1}{12}$
» 1 կես » » » » »	$\frac{1}{24}$

Մանր. 2. — Բարձր գողաները պահատուկ են նաև ծերունիների համար: 60 տարեկանից բարձր տարիք ունեցողները կարող են բնգունել հասակավորների գողացի $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$ -ը:

Մանր. 3. — Յեթև թունավոր կամ խիստ ներգործող գեղանյութերը գեղատոմսում նշանակված են ավելի, քան նախատեսված են սույն ցուցակում այն ել առանց հարցախնդիր կամ ընդգծման, գեղատան վարիչը կամ նրա ոգնականը պարտավոր են հարցնել բժշկին (կարելի չե խոսել հեռախոսով), իսկ չեթե հարցումը գրավոր և (փակ ծրարով), պատասխանից հետո միայն կարող են բաց թողնել համապատասխան գողացով: Յեթև բժշկի հետ հնարավորություն չկա բացատրվելու, այն դեպքում գեղատան վարիչը կամ նրա ոգնականը կարող և բաց թողնել գեղատոմսում նշանակված գեղանյութը, ցուցակում նախատեսված բարձր գողացի կիսի համար:

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ԳՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Անսխալ ու սխալ գրված գեղատոմսերը հաճախ պատճառ են թյուրիմացությունների, սխալների, չեբրեման ել դժբախտ դեպքերի, այլև գեղի պատրաստման ձգձգման և գեղատնից բաց թողման:

Նման աննորմալ չեբրեմություններին վերջ տալու համար Առժողկոմատն առաջարկում է՝

1. Դեղատոմսերը գրել 7,5 × 15,5 սանտիմետր մեծություն թերթիկների վրա, վերոնց վերի մասերի վրա պարզ գրված կամ տպագրված են լինելու մասնավոր պրակտիկացով պարագույր բժշկի անունը, հայրանունը և ազգը, հասցեն և հեռախոսի համարը (չեթե ունի), իսկ բուժ-առողջապահական հիմնարկներինը կրելու չեն իրենց շտամպը:

2. Մի թերթիկի վրա կարելի չե գրել մի գեղատոմս, այդ բանը չի վերաբերվում բուժ-առողջապահական հիմնարկներին, վերոնք սպասարկում են ստացիոնար հիվանդներին:

3. Դեղատոմսերը գրվելու չեն **ըճճՈՃԵԼԻ, պարզ յեվ վորո:** Պրեպարատների անունները, համաձայն գեղագրքերի, պիտի այնպես գրվեն

դեղատոմսերում, վոր լինթադրությունների ու
գուշակությունների առիթ չտան: Որինակ՝ չպի-
տի գրել *Natr. arcticum*, *Bor. sulfur.*, այլ պիտի
լինեն՝ *Natr. arsenicum*, *Bor. sulfuricum* և այլն
Սինոնիմներից ոգավել կարելի չէ բացառիկ դեպ-
քերում:

4. Դեղատոմսերում պարզ ցուցմունքներ
են լինելու դեղերի նշանակման և նրանց դոր-
ծածության մասին: Որինակ՝ որական քանիք ան-
դամ պիտի ընդունել, ինչ չափով, ուտելուց ա-
ռաջ, թե հետո և այլն: Չպիտի գրել՝ «ինչպե-
սոված և» կամ «գործածությունը հայտնի չէ» և
այլն:

5. Այն դեղատոմսերը, ուր մանուկ են թույ-
ներ կամ խիստ ներգործող նյութեր, բժշկի
պարտավոր և առաջնորդվել սույն գրքում նա-
խատեսված մի անգամ չե՞վ որական գործածվե-
լիք բարձր գոգաներով, վորոնք հաստատված և
ընդունված են իՍՆՄ պաշտոնական ֆարմա-
կոպիլի մեջ: Այն դեպքում, չորր գրվում են
ընդունված նորմայից ավելի, բժշկը պարտա-
վոր և գրել բառերով չե՞վ մոտ և՛ հարցական
դրոշմ:

Այն դեղատոմսերը, վորոնց մեջ թույներ ու
խիստ ներգործող նյութեր կան և գրվում են
անչափաճանների, աչն և՛ մինչև 18 և 60 տա-
րեկանից ավելի հասակ ունեցողների համար,

դեղատոմսերի վրա պիտի նշանակել հիվանդի
տարիքը (հավելված 4-րդ ՀՍՈՆ-ի ֆարմակոպե-
լից):

6. Այն դեղատոմսերը, վորոնք խիստ ներ-
գործող նյութեր են պարունակում և բժշկի կար-
ծիքով պիտի կրկնվեն, դեղատոմսի վրա բժշկն
այդ մասին պիտի նշանակի:

Կրկնվող թունավոր և խիստ ներգործող
դեղանյութերն, առանց բժշկի ստորագրության,
բաց չեն թողնվում: (Հավելված 1—ՀՍՈՄ-ի
ֆարմակ):

7. Սույն կանոնների խախտման դեպքում,
չորր դեղատոմսը հնարավորութուն չունի բժշկի
հետ բացատրվելու, դեղատոմսը վերադարձնվում
և հիվանդին և հետևը մակագրում և՛ «դեղը
բաց չի թողնվում դեղատոմսերի կանոնները
չպահպանելու պատճառով»:

8. Շատադ դեպքերում, չորր բժշկը չի պահ-
պանել սույն կանոնների 5-րդ կետը, դեղատոմ-
սավորիչը կամ նրա ոգնականը, գրված դեղը բաց
և թողնում ֆարմակոպիլի մեջ նախատեսված
դրոշմի կիսի չափով:

9. Առաքելիներին առաջադրվում և միջոց-
ներ ձեռք առնել սույն կանոնները լաչնորեն
տեղեկացնելու բոլոր բժշկներին, նաև մասնա-
վոր պրակտիկայով պարապողներին. մշտա-
կան հսկողութուն ունենալու նրանց ճիշտ կա-
տարման վրա:

Յ Ո Ւ Յ Ա Կ

ԹՈՒՅՆԵՐԻ, ՀԱԿՍԹՈՒՅՆԵՐԻ ՅԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ

1. Азотносеребряная соль (Արծաթագուռա-
իհն աղ). — Ցալ ստամոքսում, փսխոց, լուծ:
Սկզբում սպիտակ, ապա սև կեղեր (струнья)
բերանում:

Ստամոքսը լվանալ 2 տոկոսանի աղաջրով:
Տալ 5 տոկոսանի աղջուր, 2 տոկ. կալիոդատի
լուծվածք, կաթ, սպիտակուցից պատրաստված
ջուր, սառցի կտորներ, լուծողական: Դնել չուլի
կլիզմաներ: Ուշագնացութան դեպքում սրտիկի
կափելին, կամֆորա:

2. Амилнитрит. (Ասլաբարիս, Ամիլի-
սիս). — Հիվանդն ունի կարմրած դեմք, սրտի
բաբախում, կորցնում է գիտակցությունը:

Անհրաժեշտ է թարմ սղ, արհեստական
շնչառություն Սրտիկի կափելին, կամֆորա: Ար-
յունն առնել և միաժամանակ ներարկել ֆիզիո-
լոգիական աղաջրի լուծույթ:

3. Анилин, анилиновые краски и т.п. (Անիլին,
անիլինի գույներ). — Կապտություն (ցիանոզ), բի-

բերի լաչնացում, փսխոց, գլխապտույտ. քնկոտու-
թյուն, ուշագնացություն, հեոց, ուժերի թուլա-
ցում, ցնցումներ, կումառող գրություն:

Հանել հիվանդի հագուստները և պառկե-
ցնել հորիզոնական գրություն:

Անիլինի գորշիով թուալորման դեպ-
քում հարկավոր է մաքուր սղ, արհեստական
շնչառություն, թթվածնի ներշնչում: Սրտիկի
կափելին, կամֆորա. մարմինը տաքացնել:

Թունավորումը չեթե տեղի ունի Անիլին
լնդունելով, տալ փսխեցնողիկ (Ապամորֆին):
Ստամոքսը և աղիքները լվանալ: Տալ ծծմբանա-
րիի կամ ծծմբամազնիի աղ, վորպես լուծողա-
կան, թունդ կոֆե: Սրտիկի կափելին, կամֆորա:
Տաքացնել մարմինը:

Արգելվում է՝ չուղեր, ալկահոլ և եֆիր:

4. Антипирин, антифебрин, фенацетин,
фенокол, пирамидон. (Անտիպիրին, Անտիֆերրին,
Ֆենացետին, Ֆենոկոլ, Պիրամիդոն). — Սրտի
խառնոց, փսխոց, կապտություն և քնկոտու-
թյուն, սրունքների մկանների կծկում, թույլ
պուլս, ջերմություն իջեցում, ուղեղային չերե-
վույթներ (мозговые явления), մեղի մեջ չերե-
վում են արյան բաղադրություններ:

Հիվանդին տալ փսխեցնողիկ դեղեր: Սառը
ջրով լվանալ ստամոքսը: Սրտիկի կափելին, կան-
ֆորա: Ցնցումների դեպքում ընդունել խլորհի-
րատ, բրոմնատար: Տաքացնել մարմինը և գոգուկ
մաշկը:

5. Аноморфин. (Այամորֆին).— Սրտի
խառնույթ, փսխոց, ուժերի թուլացում, ընդհա-
ն ցնցումն շնչառության, սրտի թուլ և անկա-
նոն գործունեություն, կուլցապա:

Փսխոցը շարունակել տաք կաթ և մածու-
ծիկ եփուկ տալով: Կրկնել կ իգմաները մածու-
ծիկ լիփուկներով (слизистый отвар): Տա-
թունդ թեյ, կոֆե և 1 տոկոսանի տանին: Սրտիկ
կաֆեյին, եֆիր, կանֆորա, սարխիսին (0,002
և կպցնել մանանիխ:

6. Атропин. тропиамин, красавка (бел а-
дона), белена, дурман. (Ատրոպին, Հիոսիամին
(խողի բակլա), Բելանդոն (շնախողող) Մահամորմ
(հարջընկույզ):

Հիվանդի բերանը և կոկորդը չորանում և
ալրվում և, ունի խոպոտություն, դժվար և կու-
տալիս, զգում և ուժեղ ծարավ, մաշկը լինում և
չոր, դեմքը կարմիր, նկատվում և ընդհանուր
գոգովածություն, բիրերի լայնացում և անշար-
ժություն, քնարեր զարկերակի ուժեղ զարկ,
տեսողության զգալի թուլություն, մինչև լուկ կու-
րություն, գլխապտույտ, չերերուն քալվածք,
մկանային կծկումներ, արագ պուլս, սրտախառ-
նուց և փսխոց, ուժերի անկում, շնչառության
դժվարություն, անցածալում գրություն:

Տալ փոխեցնողիկ (լավ և ծծմբաղղնալին
աղ): Լվանալ ստամոքսը և աղիքները. դնել
կլիզմա 0,2 տոկոս. տանինով: Ընդունել ամո-

խի փոշի, դինի, թունդ կոֆե: Կրկնել սրտիկ-
ները 1 տոկոս. մորֆինի, կանֆորալի լուծույթ:
Միգապարկը դատարկել կատետրով:

7. Барий и его соединения. (Բարիա և
նրա բաղադրությունները).— Փսխոց, լուծ,
սառն ու առատ քրտինք, գլխապտույտ, կրկնա-
տեսություն (դիպլոպիա), ցնցումներ, նախ
դանդաղ և լարված պուլս, ապա թուլ: Սրտի
չերեռլթներ, ինչպես տեղի ունեն դիգիտալիսով
թունավորման զեպքում:

Լվանալ ստամոքսը և աղիքները. դնել 1
տոկոս. ծծմբանատրիի աղաջրի կլիզմա: Տալ
կաթ, սպիտակուցից պատրաստած ջուր, ծծմբա-
նատրիի կամ ծծմբամագնիի աղ: Սրտիկ կաֆե-
յին, կամֆորա, ատրոպին: Հիդրատրերի կամ
բարիտի ածխածխով թունավորման զեպքում
ազնվելու էն փոխեցնողիկ դեպք (կատաղվի
ստամոքսի ճեղքվածք):

8. Безвременник (Colchicum autumnale) (Զըն-
ծաղիկ).— Կապտություն (ցիանոզ), ցնցումներ,
ստամոքսի ցավեր, փսխոց, լուծ, կենտրոնական
ներվային սխառմի լուծարք (паралич):

Ստամոքսը և աղիքները լվանալ. 2 տոկո-
սի տանինի լուծվածքի կլիզմա: Ներսն ընդունել
տանինի լուծվածք, լորձախմիչք, թեյ, թունդ
կոֆե: Սրտիկ կաֆեյին, կանֆորա:

9. Бензол (Բենզոլ).— Գլխապտույտ, գլխա-
ցավ, եղեգորիա, սրտախառնուցի և հազի ցան-

կուլթյուն, դեմքի կարմրութիւն, մկաններ
ցնցում՝ մինչև նրանց կրօնիկ և տոնիկ կծկում-
ները, գիտակցութեան խամրում, մաշկի գունա-
տութիւն, լորձաթաղանթը ստանում և մուգ
կարմիր գույն, զառանցանք և մահ:

Մաքուր ող. արհեստական շնչառութիւն,
փսխեցնողիկ. լվանալ ստամոքսը. աղիքները
մաքրել: Տալ լուծողական և ալրովանսի լուղ
Սրահել կաֆեյին, կամֆորա. փորին դնել զար-
չիչնիկ:

10. Бензин. (Բենզին).— Տես կեռոսի6:

11. Белена. (Հիոսիամին— մոլեխինդ).—
Տես Աարալին:

12. Белладонна. (Բելլադոնա).— Տես նույ-
նը:

13. Белильная известь. (Կիր).— Տես Բլոր

14. Берталетовая соль. (Բերտալետայա
աղ).— Մաշկի վրա կապուչտ—մանիշակագույն
բծեր, գլխացավ, սրտախառնոց, փսխոցը և
ղեղին գույնի կամ մուգ կանաչագույն նշու-
թերով, լուծ, ստամոքսի ցավեր, խիստ հե-
վոց, կապուլթիւն, սրտի թուլ զործունելու-
թիւն, ցնցումներ, զառանցանք, կոմա: Մեղ
քիչ և և ունի մուգ կարմիր կամ սե գույն:

Փսխեցնողիկ, լվանալ ստամոքսը և աղիք
ները. դնել կլիզմա. տալ լուծողական, քա-
ցախնատարի աղ: Առատութեամբ խմել ալկալի
բաղադրութեամբ ջուր: Արյուն առնել և ներար-

կել ֆիզիոլոգիական լուծուլթ: Դնել բանկաներ,
Աւրգելվուս Եճ՝ թթվաւաներ, ածխածթթվաւան
կամ թթու խմիչքներ

15. Бром. (Բրոմ).— Շնչառութեան դեպ-
քում՝ շնչափողի, նրա ճլուղալորութեան, ամբողջ
թոքերի, քթի և աչքի, խակ ներսն՝ ընդունված
դեպքում՝ ստամոքսի և աղիքների լորձաթաղան-
թի բորբոքում: Փսխոց, լուծ, շնչառութեան
դժվարութիւն:

Բրոմի գոլորշիով թունավորման դեպքում
հիվանդին շնչել տալ ջրի գոլորշի՝ նաշադերնի
սպիրտի քիչ խառնուրդով: Մաքուր ող: Թունա-
վորումը լեթե տեղի ունի բրոմ ընդունելով, աչն
մամանակ լվանալ ստամոքսը 5 տոկոսանի ծծմբա-
նատրի աղի լուծվածքով. հիվանդին տալ կաթ,
ոռլալին և սպիտակուցալին ջուր, ալկալին
խմիչք, սառցի կտորներ: Արտաքին ալրվածք-
ների քսել լանոլին, ցանկ ալրված մագնեզիւ
փոշի:

16. Вербатин, чемерица и семена сабадиллы.
(Վերատրին— ջոկին, Սարադելլա— ոջլաղեղ) —
Խիստ բորբոքում բերանի, կոկորդի, վորկորի,
քթի ներսը և աչքերում: Փոշոց, հազ, ծարավ,
փսխոց, ծակոցներ, լուծ, գլխապառւտ, շնչա-
ռութեան դժվարութիւն, կապուլթիւն, ցնցում-
ներ, կոլլապս:

Տալ փսխեցնողիկ, լվանալ ստամոքսը. կը-
լիզմա՝ 0,2 տոկոսանի տանինի լուծվածքով: Տալ

սպիտակուցային խմիչք, լոգով ջուր, ածուխ ջրով, կաֆեյին, գինի, եֆիր, կամֆորա: Կոլլապսի դեպքում՝ սպի, մորֆի, կոկաին քանի քթի, աչքի և կոկորդի լորձաթաղանթներին:

17. Веселящий газ. (Խնդացնող գազ).— Տես վնասակար գազերը:

18. Вада горьких миндалей. (Դառը նշի ջուր).— Տես Խաժաթթու:

19. Газы вредные. (Վնասակար գազեր).— Սկզբում դանդաղ, ապա արագացած պուլս, անդաշնություն (անեսթեզիա), գիտակցության խամրում, աննկատելի շնչառություն, ասֆիսիա, ջղաճգություններ, պարալիչ: Ֆոսգենից թունավորման դեպքում՝ լորձաթաղանթի բորբոքում, գլխացավ:

Մաքուր սդ, արհեստական շնչառություն և թթվածնի ներշնչում: Շնչել տալ նոշադիրների սպիրտ: Տալ ջրախառն սպիրտ, 38—40 տոկոսանի կոնյակ, կոֆե: Սրսկել կաֆեյին, կամֆորա: Վերջավորություններին դնել գարչիչնիկ: Անկողնում պառկեցնել և հանգիստ թողնել:

20. Гваякол. (Գվայակոլ).— Տես Կարբոլյան թթու:

21. Горький миндаль. (Դառը նշի ջուր).— Տես Խաժալին թթու:

22. Гиосциамин. (Հիոսցիամին).— Տես Ատրոպին:

23. Героин. (Հերոյին).— Տես Մորֆի:

24. Грибы ядовитые. (Թունավոր սունկեր).— Սրտախառնոց, փսխոց, ցավեր ստամոքսում, գլխացավ, խլություն, բիրերի սեզմում, ցնցումներ: Թունավոր գլխիկավոր սունկից թունավորման դեպքում՝ դեղնություն և ալյուրեամիզություն (հեմատուրիա).

Փսխեցնողիկ. լվանալ ստամոքսը և աղիքները 0,2 տոկոսանի տանինի լուծվածքով: Տալ լուծողական: Սրսկել կաֆեյին և կոմֆորա: Պուլսի դանդաղման դեպքում՝ սրսկել ատրոպին: Մաշկի վրա կպցնել գարչիչնիկներ: Խուսափել թթուներից:

25. Гашиш (Հաշիշ).— Թմրածություն, գլխապտույտ, ականջներում խշշոց, աչքերին բուրբուրները չերևում են մոխրագույն, վախի զգացում, սրտի բարախում, արագ ու անկանոն պուլս, դալուցրինացիա, զառանցանք, բիրերի լայնացում, քնկոտություն:

Ստամոքսը և աղիքները լվանալ 0,04%-ի մալգանկալիի աղով: Ընդունել խլորֆիլըրատ կամ նրանով անել կլիզմա: Սրսկել կաֆեյին, կամֆորա: Դիսին դնել սառը կոմպրեսներ: Տաք վանաններ: Արհեստական շնչառություն:

26. Змейный яд. (Ոձի թուն).— Տեղական ցավ, բորբոքում և ուռուցք, ջերմ, շնչառություն դժվարություն, սրտի գործունեություն թուլություն, թախիծ, դողոց, ուշադնացություն, փրսխոց, դիսֆագիա (վախ), լուծ, մաշկի սառնու-

թյուն, կոլլապս, մարմնի բնական անցքերի ա-
րյունահոսություն, արյունացան (պետեխիա),
ջլածագություն:

Մահացությունը վրտ և հասնում շնչառու-
թյան և սրտի պարալիզի հետևանքով:

Շտապ և սեղմ կապել վերջավորությունը
խալթած տեղից վեր: Աշխատել թույնը ծծել բե-
րանով, լեթե քերթվածք չսնի բերանում կամ
թե՛ չոր բանկաներ դնելով: Խալթած տեղը կըտր-
վածքներ բացել, ալրել տաք չերկաթով, սպիրտի
կամ յոդի լուծույթով: Վերքի մոտերը սրակել 1—2
% -ի մարգանիթի թափալու լուծվածք: Տալ նա-
սպիրտ: Բրանեցնողիկ: Սրակել կա-
նիթի:

27. Известь (Կիր).—Ստամոքսի ցավեր,
ծակոցներ, թքի հոսում, արագ պուլս:

Տալ չուղ, քացախի կամ շաքարաջուր, կաթ,
ձվի սպիրտալուց, լուծողական (կաստորկա):

28. Под, подная настойка (Յոդ, յոդի լու-
ծույթ).—Նույնը ինչ վոր բրոմի թունավորման
Ժամանակ. հաճախակի վոդոգել բերանը, կոկորդը
և քիթը 20% -ի սոդայի ջրով:

29. Иодоформ (Յոդոֆորմ).—Գլխացավ, փրս-
խոց, լուծ, պուլսի արագացում, հոգեկան խան-
գարում: Մեղի մեջ նկատվում և յոդ:

Վերքից հեռացնել յոդոֆորմը, տալ 100%
150% -ի սոդայի լուծվածք, գոպուից նյութեր և
նեքարակել ֆիզիոլոգիական լուծույթ:

30. Инекакван и ее препараты (Բրադիլին
մաղձագեղ, բուլսի արմատ).—Խիստ փախոց,
ծանր, խեղձուցիչ շնչառություն: Կոլլապս:

Ստամոքսը և աղիքները լվանալ, կլիզմա:
Տալ սառցի կտորներ, սոդայի կամ դեղտերի
ջուր, ուրի:

31. Каломель (Կալոմել).—Տես Սուլեյմա:

32. Камфора (Կամֆորա).—Ներվալին սիս-
տեմի խիստ լարվածություն, վորը հիվանդի մեջ
առաջ և բերում հոգեկան ճնշվածություն: Չա-
ռանցանք, գլխապառւլա, տեսողության և լսելի-
քի խանգարում, գաւաւիտ, ջլածագություններ,
կոմատոս գրություն:

Փոխեցնողիկ. ստամոքսը և աղիքները լվա-
նալ. դնել կլիզմա: Տալ կալոմել, ծծմբանատրի
կամ ծծմբամազնիի աղ: Ջլածագությունների դեմ՝
խլորհիլորտա: Կոմայի ժամանակ սրակել կաֆեյին:
Փոխառափոխ կրծքին տաք և սառը դուշ: Վերջա-
վորություններին դնել զարչիչնիկ: Խուսափել
յուղեր տալուց:

33. Карболовая эссенция, лизол, резорцин,
креозот (Կարբոլյան թթվուտ, լիզոլ, բեզորսին,
կրեյոզոտ).—Ուժեղ ցավեր կրծքի ստորին մա-
սում, փախոց, կոմատոս գրություն: Մեղը ստա-
նում և բաց կանաչ գույն, վորն ողի աղդեցու-
թյունից սեանում և:

Ստամոքսը լվանալ կրակաթով: Հինդ ըղպին
մեկ տալ մեկական գգալ շաքարաջրով պատ-

բաստված կրակաթ, սպիտակուցալին ջուր, լոր-
ձալին խմիչք, ծծմբառատրիի աղ, սառցի կտոր-
ներ: Սրակել կամֆորա, եթեր: Մարմինը տա-
քացնել: Փորին դնել գարշիչնիկ: Արհեստական
շնչառություն: Այրած մասերը լվանալ 20/0-ի
սոդայի լուծվածքով կամ թունդ սպիրտով, քսել
վազելին: Սուսափել սպիրտից և լուղերից:

34. Керосин (Նավթ).—Ստամոքսի ցավեր,
ընդհանուր գրգռվածություն, թուլւլ պուլս, բի-
բերի լայնացում, գաստրիա, ուշադնացություն,
ընդհանուր անզգայնություն, դժվար և անկանոն
շնչառություն, ծնոտների պիրքություն (ТРИЗМ),
փորի փքվածություն:

Թարմ ող, արհեստական շնչառություն,
փսխեցնողիկ, ստամոքսի և աղիքների լվացում,
կլիզմա: Տալ լուծողական (կաստորկա կամ պրո-
վանսի լուղ): Սրակել կաֆեյին, կամֆորա: Փորին
դնել գարշիչնիկներ:

35. Киноварь (Կինարորիս, դանջափիլ).—
Տես Սուլեյմա:

36. Кислоты—авотная, серная, соляная.
(Թթվուտներ—ազոտի, ծծմբի, աղի).—Ցավեր
բերանում, վորկորում, ստամոքսում և աղիքնե-
րում: Այրված են լեղվի, բերանի և կլանի հու-
ղաթաղանթը: Փսխոցը հաճախ արյունալից: Հի-
վանդը դժվարություններ և շնչում. ունի թուլւլ
պուլս, ջղաձգություններ. կորցնում և գիտակ-
ցությունը:

Տրվում է՝ լուղեր, կաթ, ձվի սպիտակուց:

լորձալեւիուկներ (слизистый отвар), մադնեղի,
մորֆի: Բերանի և կլանի հուղաթաղանթին քսել
20/0-ի աղաթթվուտային կոկային: Քլորաջրած-
նային և բորակտային գոլորշիով թունավորված
դեպքում՝ մաքուր ող, ներշնչել ջրագոլորշիներ՝
նաշադիրնի սպիրտի խառնուրդով:

37. Кислота пикриновая (Պիկրաթթու).—
Ցավեր ստամոքսում, փսխոց մալձանութիւրով,
մաշկի և մեղի դեղնություն, մեղի մեջ կա սպի-
տակուց և ալին: Տալ ձվի սպիտակուց, լուծողա-
կան լուղ. միզեցնող նյութեր՝ քացախառակալիտնի
աղ:

38. Кислота уксусная (Քուցտիաթթու).—
Ցավեր բերանում, վորկորում, ստամոքսում, ա-
ղիքներում, շրթունքների թաղանթը սպիտակ
դււն ունի, և բերանից զալիս և քացախի հոտ:

Տալ՝ լուղեր, կաթ, ձվի սպիտակուց, մաղ-
նեղի, լորձալեւիուկներ՝ 10/0-ի ալրված կալի
լորձեղուկով, սառցի կտորներ: Կլիզմաներ:
Սրակել մորֆի: Այրված մասերին քսել 20/0-ի
կոկային:

39. Кислота щавелевая (Թրթնջաթթու).—
Հիվանդի արամագորությունն ընկած է: Թուլու-
թուն և ուժերի անկում: Սրտի թուլւլ գործու-
նելություն: Ջղաձգություններ, բիրերի լայնա-
ցում, կուլապս:

Տալ կրակաթ, կավիճ, կրաջուր, կաստորկա,
ծծմբառատրիի և ծծմբամազնիի աղ, խափարժիլ

(ревень), քացախակալի աղ, միզացնողի: Արու-
հեղ կաֆեյին, կամֆորա:

40. Клешевина—семена и жмыхи (Գենա-
դերչակ—սերմեր և քուսպ).— Փսխոց, լուծ, գլխա-
խացավ, թուլութիւն, սրտի թուլ գործունեյու-
թիւն,

Ստամոքսը և աղիքները մի քանի անգամ
լվանալ, կլիզմա. փսխեցնողիկ: Տալ լորձանյութ-
եր: Սրսկել կաֆեյին: Փորին դնել տաք կոմ-
պրեսներ:

41. Клоачный газ (Կոլուզային գազ).— Տես
Ծծրաջրածին:

42. Кодзин (Կոդէյին).— Տես Մորֆին:

43. Калбасный яд. (Կալբասի թուէն).— Տես
դիաթուէն՝ պտոմալին:

44. Кокаин. (Կոկային).— Գլխապտուէա,
սփրթնեղ, դողոց, թուլ և արագ պուլս: Թուլու-
թիւն, դանդաղ շնչառութիւն, ցիանոզ, ցնցում-
ներ: Բիրերի լայնացում: Գիտակցութեան խամ-
րում, կոլլապս:

Արհեստական շնչառութիւն, ներշնչել Ա-
միլնիտրիտ: Խիստ ցնցումների ժամանակ գգու-
շութեամբ ներշնչել խլորոփորմ: Շփել ձեռքերը
և վոտքերը: Տալ թելի գգալներով կոնյակ, կամ
70 օ/0-ի սպիրտ: Սրսկել կաֆեյին, կամֆորա:
Մարմինը տաքացնել: Կոկայինով թունավորման
դեպքում (ներս ընդունված), բացի վերը հիշա-
տակված միջոցներից, տալ նաև 2 օ/0-ի տանինի

լուծվածք: Ստամոքսը լվանալ 0,03 օ/0 մարդան-
կալիի աղի լուծվածքով: Առաջ բերել փրս-
խոց:

45. Кофеин, чай. кофе. (Կաֆեյին, թեյ, կո-
ֆե).— Ներվային գրգռվածութիւն, դեմքի կարմ-
րութիւն, սրտի լարված և արագ գործունեյու-
թիւն, շնչառութեան դժվարութիւն. մկանների
պրիքութիւն և գոգոց: Մահն առաջանում և
սրտի պարալիչից:

Կլանալ ստամոքսը և աղիքները: Կլիզմա:
Տալ խլորհիլրատ: Փսխեցնողիկ: Ներշնչել ամիլ-
հիդրատ: Գրգռել մաշկը: Սրսկել մորֆին: Ար-
հեստական շնչառութիւն:

46. Красавка.— Տես Ատրոպին:

47. Креозот (Կրեոզոտ).— Տես Կարբոլան
թթու:

48. Кротонное масло. (Կրոտոնի ձեթ).—
Ստամոքսի ցավեր, խիստ արյունախառն լուծ.
սրտի խառնոց: Ընդհանուր թուլութիւն:

Տալ փոքր դոզաներով սպի, սառուցի կը-
տորներ, նշի կաթ, լորձախմիչքներ: Մաշկի
յուղը լվանալ եթերով և ցանել տալի: Տաք վան-
նաներ: Զգուշանալ ամյակի պրեպարատներից:

49. Медный купарос и другие соли
меди. Иодные краски: (Արջասպ և պղնձի ալ
աղեր).— Ցավեր ստամոքսում, աղիքներում, փրս-
խոց կանաչագուշն նշութերի. արյունախառն
լուծ, շնչառութեան դժվարութիւն, անկանոն

պուլս: Փոխոցը չերկարելու համար տալ ձվի դեղնոցով պատրաստված տաք կաթ: Ստամոքսը լվանալ 1 0/0-ի արյունի դեղին փոշու լուծվածքով: Տալ ծծմբամազնիի աղ և կենդանու ածուխ: Սրահել մարֆի: Փորին դնել տաքացնող նյութերով փաթեթներ (припарки): Խուսափել չուղերից և թթուներից:

50. Морфий и его соли (Մորֆի և նրա աղերը). — Սկզբում քնկոտություն, ապա խորը քուն: Դանդաղ և խալոտ շնչառություն, ցիանոզ, ցնցումներ, բիբրի փոքրանալ, սառը և խոնավ մաշկ:

Ստամոքսը լվանալ 0,04 0/0-ի մարգանկալիի աղի լուծվածքով: Կլիզմա: Ամեն 15 րոպե նախ մեկ թեչի գդուլ 0,04 0/0 մարգանկալիի աղի լուծվածք: Սրահել ատրոպին, կամֆորա, կաֆեյին: Արհեստական շնչառություն: Ներշնչել թթվածին: Տաք վանաններ: Տաքացնել հիվանդին և դատարկել միզապարկը: **266** արգում փախեցնողիկներ, չեթե անհայտացել են բեֆեկաները:

51. Мухомор, мукарин (Թունավոր սուճիկ, կարմիր ճանճապառն, մուսկարին). — Փոխոց, լուծ, ցավեր ստամոքսում, թքահոսություն, դանդաղ պուլս, բիբրի սեղմում:

Փսխեցնողիկ, ստամոքսը և աղիքները լվանալ 0,2 0/0-ի տանինի լուծվածքով: Տալ լուծող դակտն չուր: Սրահել կաֆեյին, կամֆորա, իսկ

դանդաղ պուլսի ժամանակ՝ ատրոպին: Մաշկին կպցնել դարչինիկներ: Խուսափել թթուներից:

52. Мышьяк, швейнфуртская зелень и другие его соединения. (Մկնդեղ, շվեյնֆուրտի կանաչ և նրա ալ բաղադրությունները): Խիստ ցավեր ստամոքսում և աղիքներում, փսխոց և լուծ: Արտաթորությունը բրնձագույն: Սառը քրտինք, թուլ և արագ պուլս: Յերբմն ջրդաճություն: Կոլլապս: Մշակաջրածնով թունավորման դեպքում՝ հիվանդն ունենում է արյունախառն մեզ: Սալվարսանի դասին պատկանող մշակը (Salvarsan, Arsaectin, Atoxyl) առաջացնում է ախտոլության թուլություն, կուրություն և խուլթյուն:

Տալ ամեն 5 րոպե նախ թեչի գդալ հակաթույն (Antidofum arsenici): 15 րոպե նախ մեկ անգամ ջրով ուտել մեկական հացի գդալ մազնեղի: Ստամոքսը և աղիքները լվանալ ջրի մեջ ալրված մագնեզիի լուծվածքով (1000-ին վերցնել 20.0 ալրված մագնեզի): Սրահել կաֆեյին, կամֆորա: Փորին դնել տաքացնողիկներ (припарки): Զրաճությունների ժամանակ մաշկ վերջավորությունները: Տաք վանաններ:

53. Наперстянка, горипвет, строфант и их препараты: (Մատնուկ-մատնածաղիկ, աղոնխաշողավարդ, Ստրոֆանտ և նրա պրեպարատները). — Փոխոց, լուծ, աղիքային ցավեր, սկզբում դանդաղ ու անկանոն պուլս, իսկ հետո արագ և

թուլլ: Ընդհանուր թուլութիւն, հեղոց, ցիանոզ, թախիժ, քնկոտութիւն, ջղաձգութիւններ, կոմա, սառը վերջավորութիւն, գալլուցնացիւ, դառանցանք, միզակապութիւն, բերերի լաչ-նացում:

Լվանալ ստամոքսը և աղիքները տանին 0,02 օ/օ-ի լուծվածքով: Սրահել կաֆեյին, կամ ֆորա, եթեր: Տաք վաննաներ: Հանդիսա: Փսիկեց-նողիկներ չտալ: Մկանային լարումներից խուսափել:

54. Нашатырный спирт. (Նաշատիրն սպիրտ).— Հազ, բերանից ամչակի հոտ, բերանի շնչափողի, վարկորի և ստամոքսի երոցք և ցավեր: Հաճախ արշուձախառն փսխոց: Գլխապտուտ, ձաշնի անհատացում, թուլ պուլս, ուժերի անկում, ամբողջ մարմնի սառում և ջղաձգութիւններ:

Տալ ջրախառն քաջախ, 1 օ/օ-ի լիմոն կամ գինեքարի թթվուտ: Լորձախմիչքներ: Ներշնչել ջրի կամ ֆիզոլոգիական լուծույթի գոլորշի: Արհեստական շնչառութիւն: Արշուն առնել և ներարկել ֆիզիոլոգիական լուծույթ:

55. Ошій. (Ույի).— Տես Մորֆի:

56. Пантопон. (Պանտապոն).— Տես Նուլնը:

57. Пилокарпин. (Պիլոկարպին).— Թքահոսութիւն, առատ քրտինք, սրտախառնոց, փրկոց, լուծ, անկանոն ու դանդաղ պուլս, ընդհանուր լարվածութիւն, ապա ուժերի անկում:

ցիանոզ, թոքերի ալտում (отек), բիրերի սեղմում:

Լվանալ ստամոքսը և աղիքները. կլիզմա տանին 2 օ/օ-ի լուծվածքով: Սրահել ստորագին: Ընդունել զոգոնչ նյութեր:

58. Погомаины. (Պոսմայիններ— կալրասի, ձկան և պանրի թուլներ).— Սրտախառնոց, փրկոց, ծակոցներ, բերերի լաչնացում, տեսողութիւն թուլացում, կուրութիւն, ջղաձգութիւններ, թուլ պուլս, դանդաղ և անկանոն շնչառութիւն, աճող պարալիչ:

Փսիկեցնողիկ, ստամոքսը և աղիքները լվանալ 0,4 օ/օ-ի մարգանկալիի աղիղի լուծվածքով: Կլիզմա: Տալ լուծողական լուղ, տանին, թուլ կոֆե. ամեն 20-30 րոպեն 3-5 կաթիլ նաշատիրնի սպիրտ՝ ջրով: Սրահել կաֆեյին:

59. Рвотный камень и другие препараты сурьмы. (Շարիր և այլ պրեպարատներ, ծարաքար, անտիմոնի).— Շարունակական փսխոց, լուծ, ցավեր բերանում և ստամոքսում, գլխապտուտ, ուժերի անկում, սառը քրտինք, ցիանոզ, թուլ և արագ պուլս, կոլլապս, կոմա:

Լվանալ ստամոքսը և աղիքները: Տալ 2 օ/օ-ի տանին, սոդային լուծվածք, կաթ, սպիտակուցային ջուր, լորձախմիչքներ, սառցի կտորներ: Սրահել կամֆորա: Լորձալեփուկներից կլիզմա՝ 10 կաթիլ ուլի լուծույթով:

60. Салициловая кислота, аспирин, салол,

салирин и ее производные. (Սալիցիլաթթու, Ասպիրին, Սալիլ, Սալիլրին և նրա ալլ պրեպարատները).— Արտախտոնոց և փսխոց, առատ քրտինք, տեսողության և լսողության թուլություն: Արտի և տեսողության թուլլ զործողություն: Լվանալ ստամոքսը, ջրի կլիզմա: Լավ և տալ ապամորֆին, սոդա: Արսկեկ կամֆորա և կաֆեյին: Տաքացնել մարմինը:

61. Сантоян. (Սանտոնին).— Առտրկանի-րըն աչքին չերեվում են դեղնադուլն և մանիշա-կազուլն: Թքահոսություն, փսխոց, լուծ, գլխացավ, բերերի լայնացում, ջղաձգություններ, մարմնի դողոց: Մեղը դեղին և և մեծ քանա-կությամբ:

62. Свинец и его соединения. (Արճիճ և նրա միացումները).— Ցավեր կրծոսկրի՝ գդալի տակ, սպիտակամոխրագուլն նյութերի փսխոց, ծակոցներ, արյունախառն արտաթորություն, լուծ կամ փարկապուլթյուն: Դանդաղ պուլս: Արտի դործունեյության թուլություն: Դիտակ-ցության խամրում:

Փսխեցնողիկ (լավ և ապամորֆին): Տալ ծծմբանատրիի կամ ծծմբամազնիի աղ, կաթ, սպիտակուցալին ջուր, լորձալիփուկներ: Ծակոց-ների դեպքում՝ տալ բելադոնի կամ ոպիի եկստ-րակա: Արսկեկ ատրոպին, մորֆի: Լվանալ ստա-մոքսը և աղիքները, կլիզմա: Տաք վաննաներ:

63 Светильный газ. (Լույսի գազ).— Տես Ու-

գարի գազը:

64. Сероводород. (Ծծմբաջրածին) Տես վր-նատակար դազեր:

65. Сероуглерод. (Ծծմծաածխածին).— Ներշնչման ժամանակ՝ հարբած դրություն, գլխացավ, քնկոտություն, գիտակցության ժա-մանակավոր խամրում, փսխոց:

Ներս ընդունված ժամանակ՝ գլխապտուլտ, սփրթնած դեմք, շրթունքների կապտություն, բերերի լայնացում, խլություն, անզգայնու-թյուն, (անեսթեզի), տաքության իջեցում, բե-րանի շատ ծանր հոտ: Առաջին դեպքում՝ մաքուր "դ, գոգոնիչ նյութեր— կամֆորա, ստրիխնին: Յեկորոգ դեպքում՝ փսխեցնողիկ և լվանալ ստա-մոքսը:

66. Сильная кислота и ее препараты— цианистый калий, водогорьких миндалей (Խա-ժաթթու և նրա պրեպարատները, ցիանկալի, դառը նշի ջուր).— Գլխապտուլտ, գլխացավ, սրտի թռթոց, հազ, սրտախառնոց, գիտակցության խամրում. շնչառության պարալիչ, բերանից դառը նշի ուժեղ թթվածության հոտ, մաշկը կեռասա-կաւմրագուլն է:

Լվանալ ստամոքսը 0,04 օ/°-ի մարգանկալիի աղի լուծվածքով, կամ 1 օ/°-ի ջրածնավերաթթվու-տով: Փսխեցնողիկ, լավ և ապամորֆին, սոդա: Արսկեկ կաֆեյին, կամֆորա:

Ներշնչել թթվածին. արհեստական շնչա-ռություն: Արյուն առնել և ներարկել ֆիզիոլո-գիական լուծույթ:

67. Скипидар (Սկիպիդար).— Ստամոքսի ցավեր, արագ պուլս, ուժերի անկում, առատ մեղձ մանիշակի հոտով. մեղր պարուհաղում և սպիտակուց և արյուն: Լվանալ ստամոքսը, փրփրեցնողիկ, լավ և ապամորֆին: Տալ ամուխի փոշի, լորձախմիչքներ, սառցի կտորներ: Ուշագնացութեան դեպքում՝ սրկել կաֆեյին, կամֆորա:

68. Спирт—этиловый, амиловый, метиловый, сивушное масло. (Եթիլ, Ամիլ, Մեթիլ-ալկոհոլ, ցքի յուղ, սևալուղ).— Գիտակցութեան խամրում, բիրբրի սեղմում, խորը քուն, անըզ-դալութիւն, փսխոց, սպիրտի հոտ բերանից, դանդաղ պուլս, խոպոտ ու հազվագլուտ շնչառութիւն, կապտութիւն: Անկամ արտաթորութիւն և միզում: Յնցումներ:

Թարմ ող. ստամոքսը և աղիքները լվանալ. կլիզմա: Տալ թունդ կոֆե, 3—5 կաթիլ նաշատիր-նի սպիրտ՝ ջրով: Վերջինս կրկնել մի քանի անգամ: Սրկել կաֆեյին, կամֆորա, ստրիխ-նին: Հոտ քաշել առ նաշատիրնի սպիրտ: Գլխին սառը ջուր ածել և մարմինը տաքացնել: Տալ թե ներսը և թե կլիզմայով խորհրդատու:

69. Спорынья и ее препараты. (Մրիկ, գլուխուլ).— Գլխացավ, սրտախառնոց և խիստ թքահոսութիւն, փսխոց, լուծ: Թախիծ, դող՝ Յերբեմն բիրբրի լացնացում, յերբեմն ել սեղմում: Դանդաղ և թուլ պուլս: Դանդաղ շնչա-

ռութիւն: Մեղի խիստ սակավութիւն: Զառան-ցանք, կոմա: Վերջավորութիւնների վրա մուգ կետեր (անկենդանութեան նշաններ):

Փսխեցնողիկ (լավ և ապամորֆին): Լվա-նալ ստամոքսը և աղիքները. կլիզմա տանինի 0, 2 0/10 լուծվածքով: Տալ ծծմբապղնձա աղ, կա-լումել, տանին: Սրկել կամֆորա, կաֆեյին, ե-թեր: Չղաձգութիւնների ժամանակ տաք վա-նաներ, խորոֆորմի կամ ամիլհիդրատի ներշնչում:

70. Стрихнин, его соли, препараты рвотного ореха (Nux vomica) Ստրիխնին և նրա աղերը, ծարիր կամ փսխեցնողիկ ընկուղի պրե-պարատներ).— Յերբեմն փսխոց, բարձր ռեֆլեքս, ուժեղ շղաձգութիւններ. տրիզմը (ծնոտների կպչում, պիրքութիւն), կապտութիւն, շնչառու-թեան և սրտի պարալիչ:

Փսխեցնողիկ (լավ և ապամորֆին): Ստա-մոքսը լվանալ: Տալ տանին, ամուխ. մեծ գողա-ներով (2,0—5,0) խորոհրդատու կամ կլիզմա, մածուցիկ նյութերի հետ: Բացախակալիի աղ (уксусно-калиевая соль), առատորեն խմել ածխա-թըթուի խմիչքներ: Չղաձգութիւնների ժամա-նակ ներշնչել խորհրդատու: Արհեստական շնչառութիւն և թթվածնի ներշնչում: Չգուշա-նալ արտաքին զրգուկները:

71. Сума. (Սուլեմա).— Յավեր կրծոսկրի դալի առակ և ստամոքսում, յերբեմն արյունա-

խառն փսխոց: Հաճախ արյունալից լուծ: Մետաղի համ և ծանր հոտ բերանից: Ուժերի անկում, սրտի թուլլ գործունեություն, դարդացող պարալիչ. սակավ մեզ և մեջը սպիտակուց ու արյուն:

Փսխեցնողիկ (լավ և ապամորֆին): Տալ մեծ քանակով տաք կաթ, սպիտակուցալին ջուր, լորձալեփուկներ, ամեն 5 բուպեն մեկ հացի գդալ ջրով ուտել մազնեզի (10,0—200,0), սառցի կտորներ: Բերանը վողողել ջրի մեջ լուծված բերտալիտի աղով: Շարունակաբար աղիքները լվանալ լորձալեփուկներով: Զոնդ դնելը թույլատրվում և, սակայն մեծ զգուշութամբ: Հետույսից ներարկել $10\frac{0}{10}$ -ի— $20\frac{0}{10}$ -ի պլուկոզ, 200—400 խոր. սանտիմետր, մինչև մեզի բացվելը:

72. Угарный газ, светильный газ. Окись углерода. (Ուգարի, լուսի գազ, Ածխածխածին).— Տես վնասակար գազեր:

73. Физостигмин (Эсерин). (Ֆիզոստիգմին—Նեյերին).— Գլխապտույտ, թքահոսություն, առատ քրտինք, փսխոց, լուծ, դանդաղ և թուլլ պուլս, դանդաղ շնչառություն: Զղածգութուններ, մկանային թեւերի կծկում: Ասֆինքսի, կոլչապ: Լվանալ ստամոքսը տանինի $0,2 \frac{0}{10}$ լուծվածքով: Փսխեցնողիկ, (լավ և ապամորֆին): Տալ կալոմել, վորպես լուծողական: Սրսկել ատրոպին, կամֆորա, եթեր: Արհեստական շնչառություն: Զղածգութունների դեպքում ներշնչել խլորաֆորմ:

74. Фосфор (Փոսֆոր).— Սրտխառնայնացվեր ստամոքսում և աղիքներում, փսխոց՝ հաճախ արյունալից, ֆոսֆորի հոտով և խավարի մեջ փալլ ունեցող նյութեր, գրգռվածություն և ապա ճնշվածություն, քնկոտություն, թուլլ պուլս, դեղնություն, գիտակցության խամրում:

Ստամոքսը լվանալ $0,4\frac{0}{10}$ -ի մարգան—կալիի աղերով: Տալ ամեն 15 բուպեն մի հացի գդալ ծծմբապղնձի աղերի լուծվածք (1,0: 60,0): Որը մի քանի անգամ 5-ական կաթիլ տերաբենթինի յուղ լորձալեփուկով. ծծմբանաշորի կամ ծծմբամաշնիի աղ, լորձալեփուկներ, ալկալին ջրեր: Պրոզեկտում ե՛՛՛՛՛ կաստորկա և այլ յուղեր. կաթ, ձու:

75. Французская зелень. (Ֆրանսական կանաչ).— Տես Մշակ:

76. Хлор, хлорная, белымная известь. (Խլոր, քլորի ջուր, կիր).— Թքահոսություն, փուրջոց, թարրուխ, կոկորդի ձանկղվածք, հազ, կրծքի ցավեր, արյունաթքություն, հեվոց, կապություն, արագ և թուլլ պուլս, կոմա, շնչառության դադարում:

Փսխեցնողիկ: Յեթե հնարավոր և լվանալ ստամոքսը $0,4 \frac{0}{10}$ -ի լեյթամծմբանաարի լուծվածքով, ապա ջրով: Տալ ջրախառն 5—15 կաթիլ նաշատիրների սպիրտ, սպիտակուցալին ջուր, լորձախմբք, սառցաջուր, սոդալի լուծվածք, կաթ: Քլորի գոլորշիով թունավորման դեպքում

Թարմ ող, ներշնչել ջրի դուրշիների՝ նաշատիրների սպիրտի խառնուրդով: Սրակել և թեր, կանֆորա:

77. Хлороформ. (Խլորոֆորմ).— Արտաշնչումը բուրում և խլորոֆորմի հոտ. լրիվ նարկոզ, խորը քուն, լրիվ անեսթեզի: Դանդաղ շնչառություն, հազվադյուրա և լիքը պուլս: Վտանգավոր նշաններ են՝ թուլլ և արագ պուլս, ասֆիքսի, շնչառության դադարում:

Թարմ ող, արհեստական շնչառություն, թթվածնի ներշնչում, մաշկի շփում: Սրակել կամֆորա, ստրիխնին: Յեթե հիվանդը թուրավորվել և խլորոֆորմ ընդունելով՝ բացի վերև հիշատակված միջոցներից, լվանալ նաև ըստամոքսը:

78. Цинк и его соли. (Ցինկ և նրա աղերը):— Փսխոց, լեզվի և բերանի հուզաթաղանթի ցավեր և ուռուցք, ձեռքերի և վուքերի սառնություն, սառը քրտինք. պուլսը հազվիվ և շոշափվում, չերբեմն արունախառը լուծ, կոլլապս:

Փսխոցը չերկարել՝ տալով հիվանդին առատ տաք կաթ և սպիտակուցային ջուր: Ստամոքսը լվանալ 10⁰-ի սոդայի կամ 0,20⁰-ի տանինի լուծվածքով: Տալ ալկալի ջրեր, լորձալեկուկներ:

79. Цитварное семя. (Ոշինդրի սերմեր).— Տես Սանտոնին:

80. Пшанские мушки, Кантаридин. (Կանտարիդին).— Ստամոքսի խիստ ցավեր, ծակոցներ

փորում, փսխոց, տնքոց, արյունալից լուծ, սեռական գործարանների հիպերեմիա, նվազ մեղ և մեջն արյուն:

Լվանալ ստամոքսը: Փսխեցնողիկ, (լավ և սպամոռֆին): Տալ կալոմել, վորպես լուծողական, լորձալեկուկներ, սպիտակուցային ջուր. ցավերի դեպքում սպի, սառցի կտորներ: Գիտակցության խամրման ժամանակ սրակել կաֆեյին, կամֆորա: Ֆեգելվուս են՝ չուղեր, թթուներ, եթեր:

81. Щелочи едкие (едкий натр, едкое кали, поташ). (Ալկալիներ).— Ալրոց և ցավեր բերանում, կլանում, վորկորում և ստամոքսում: Սրտախառնոց և արյունախառն փսխոց. արյունալից լուծ, հոգ, գլխապտուտ, թուլլ պուլս, ուժերի անկում, մարմնի սառչում, նվաղում, գիտակցության խամրում: Ֆեգելվուս են՝ զոնդ մտցնել ստամոքսը և տալ լուծողական: Տալ քացախի, լիմոնի, խաղողաքարի կամ աղթթվուտի 1 0⁰-ի լուծվածք, լորձախմիչքներ՝ վրան ավելացրած հիշատակված թթուները, կաթ, սպիտակուցային ջուր, չուղի եմուլսիաներ, սառցի կտորներ: Արտաքին ալրվածքները լվանալ ջրով և վրան դնել 5 0⁰-ի վերը հիշատակված թթվուտներով թրջված շոր կամ պատրաստել թթվաջրից վանաններ:

82. Эвэрия (Եգերին).— Տես ֆիզոստիգմին:

83. Эметин. (Եմետին).— Տես Իպեկակուան:

84. Эфвр. (Եթեր).— Տես խլորոֆորմ:

85. Antidotum arsenici (Արսենիկի հակա-
թուէն). — 100 մաս ծծմբալերկաթային աղերի
լուծվածքի վրա ավելացնել (տեսակարար կշիռը
1428) 300 մաս սառը ջուր: Լուծվածքին քիչ-
քիչ ավելացնել 20 մաս ալրված և 300 մաս
ջուր, ապա խառնուրդը լավ թափահարել, խու-
սափելով խիստ տաքանալուց: Պատրաստվում է
ex tempore:

86. Antidotum duflos. Վերցնում են նաշա-
տիրնի սպիրտի 6 մասը և հազեցնում են ծծըմ-
բաջրածնով, ապա ավելացնում են նաշատիրնի
սպիրտի 4 մասը և բացում են 60,0 ջրով: Ստաց-
ված հեղուկի վրա ավելացնում են յերկաթա-
ջապի լուծվածք 8, 0—40,0. ստացվում է ծծըմ-
բային կաթ, վորը լվացվում է ջրով և պահվում
ջրով լի շերտում: Բաց թողնելու ժամանակ՝ սրա
վրան ավելացնում են 2 մաս ալրված մազնեղի
խառնուրդ, լուծված 4 մաս ջրի մեջ և ուժեղ
թափահարում են:

87. Mixtura magnesia. — Վերցնում են 7
մաս ալրված մազնեղի, 4 մաս ջուր և իրար
խառնում:

88. Calcaria saccharata. Վերցնում են 1
մաս հանգած կիր, 2 մաս շաքար, 12 մաս ջուր
և խառնում իրար:

89. Слизистое питье (Հորձախմիչքներ). —
Mucilago Lini, Decoctum Amyli, Decoctum Salep,
Decoctum Althaeae:

ԳՈՐԾԱԾԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏ ՁԵՎԵՐԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Aa	Ana — Հավասար, հավասար մասեր:
Add	Adde — Ավելացրու:
Ad ch. cer.	Ad chartam ceratam — Մոմաթղթի մեջ:
Ab us. ext.	Ab usum externum — Արտաքին գործածության համար:
Ad us. int.	Ad usum internum — Ներքին. գոր- ծածության համար:
Aeq.	Aequalis — Հավասար:
Caps. amyl.	Capsulae amyloaceae — Տարեխ:
» gel. el.	Capsulae gelatinosae elasticae — Խեթի կակուղ կապսուլներ:
» » op.	Capsulae gelatinosae operculatae — Խե- թի պինդ կապսուլներ:
Conc.	Concide — Մանր կտորներ կամ con- cisis — մանր կտրված:
Cont.	Contunde — Մանրուք, contusus — ման- րացնել:
Consp.	Consperge — Փռչի:
Col.	Colatura — Քամած հեղուկ:
Coq.	Coque — Ցեփի:
D. t. d.	Dentur tales doses — Բաց թողնել նույն քանակով:
D. S.	Detur signetur — Բաց թող, նշանակիր:

Dep.	Depuratus — Մաքրված, զտված:
Dil.	Dilutus — Հուժված:
Disp.	Dispensa, dispensetur — Կշռիր:
Div. in p. aeq.	Divide in partes aequales — Բաժա- նիր հավասար մասերի:
Ext. s. lint	Extende supra linteam — Քսիր կտա- վի վրա:
F.	Fiat, fiant — Կատարել:
F. l. a.	Fiat lege artis — Կատարել ըստ պա- հանջվող կանոնների:
Filtr.	Filtra — Քամիր:
Fol.	Folia — Թերթիկներ:
Fl.	Flores — Գուլներ:
G.	Gramma — Գրամ:
Gtt.	Gutta — Կաթիլ:
Inf.	Infunde, infusum — Հուժուլթ (Ին- ֆուզում):
L. a.	Lege artis — Ըստ պահանջվող կանոն- ների:
M. D. S.	Misce, Detur, Signetur — Խառնիր, բաց թող, ստորագրիր:
M. f. pulv.	Misce fiat pulvis — Խառնիր, պատ- րաստիր փոշի:
M. f. suppos.	Misce, fiat suppositorium — Խառնիր, պատրաստիր մոմ:
M. pil.	Massa pilularum — Պիլուլի (հաբերի) վանդված:
Min.	Minutim — Մանր:
Mixt.	Mixtura — Միքստուրա:

Obd.	Obduce, obducantur — Զդիր, ծածկիր:
Ov.	Ovum — Զու:
P.	Pars — Մաս:
Pp.	Praecipitatus — Նոսովածք:
Pr.	Praeparatus — Պատրաստած:
Q. s	Quantum satis — Բավարար քանակով:
Rp. rec.	Recipe — Վերցրու:
Reit.	Reiteretum — Կրկնել:
Rep.	Repetatur — Կրկնել:
S.	Signa — signetur — Նշանակել:
T-ra, tinct.	Tinctura — Տինկտուրա:
Ung.	Unguetum — Ոճանակ (мазь).

ԿԱՐԵՎՈՐ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1

ՄԵՏՐ = Պարիզի վրայով անցնող միջուկականի մի քառորդի մեկ տասներորդական միլիոն մասին:

ԼԻՏՐԸ = խորանարդի ծավալի, վորի կողը հավասար է $\frac{1}{10}$ -րորդ մետրի. այն է՝ դեցիմետր խորանարդի ծավալին:

ԳՐԱՄԸ = մի խորանարդ սանտիմետր թորած $\frac{4}{10}$ ջրի ծանրութիւն:

Վերը հիշատակված չափերը չեթե մեծացնենք 10, 100 կամ 1000 անգամ, կստանանք՝ դեկա (10,0), հեկտո (100,0), կիլո (1000,0), իսկ չեթե փոքրացնենք նույնքան անգամ, կստանանք՝ դեցի (0,1), սանտի (0,01) և միլի (0,001):

ԿԻԼՈԳՐԱՄԸ = մի լիտր թորած $\frac{4}{10}$ ջրի ծանրութիւն:

2

Շիշը պարունակում է մոտ 600,0—750,0 գր. ջուր՝
 Բաժակը պարունակ. է մոտ 180,0—200,0 » »
 Գինու բաժակը » » 100,0 » »
 Հացի գդալը » » 15,0 » »
 Դեմեքտի գդալը » » 7,5 » »
 Թեյի գդալը » » 4,0 » »

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՅԵՐԵՍ

1. Բժիշկների ուշադրութիւն	3
2. Բնագրի հառաջաբանը	12
3. ՀՍԽՀ-ի Առժողովմատին կից գործող բժշկա-գիտական խորհրդի կազմը	17
4. Քաղվածք բժշկա-գիտական խորհրդի 8 VI 1930 թ. արձանագրութիւնից	18
5. Ստանդարդ դեղագիտականների ցուցակը	19
I Ֆերագիվիկ բաժին	19
ա) Ընդհանուր տերապիա	19
բ) Թոքերի հիվանդութիւններ	26
գ) Սրտի հիվանդութիւններ	28
դ) Մարսողութիւն գործարանների հիվանդութիւններ	31
II Ա.կանչի, քի յիվ կոկորդի եի- վանգուրյուցներ	36
III Ա.կնաբուժական բաժին	39
IV Մաւկի հիվանգուրյուցներ	42
V Վեներական բաժին	45
VI Մանկաբարձական յիվ գիներկո- լոգիական բաժին	47
VII Ներվանագեկան հիվանգու- րյուցներ	57

6. Դեղերի բարձրագույն գոյաները . . .	53
7. Դեղատոմսեր գրելու կանոնները . . .	59
8. Յուցակ թուլների, հակաթուլների և միջոցներ թունավորման դեմ . . .	62
9. Գործնական տերմինների կրճատ ձևերը և նրանց նշանակությունը . . .	89
10. Դեղագործական հափիրի մասին . . .	92
11. Բովանդակություն	93
12. Հաշտարարություններ	95

Վ Ր Ի Պ Ա Կ Ն Ե Ր

ՏՊՎԱԾ Ե

ՊԻՏԻ ԼԻՆԻ

Աբեղյան . . . չերես	17	Արեշյան
Ալեքսանյան Պ. . . »	»	Ալեքսանյան Ա.
Bor. Sulfur. . . »	60	Bar. Sulfir.
Bor. . . »	»	Bar. . . »
Անաիֆերրին . . . »	63	Անաիֆերրին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՍՈՈՂՋ ԿԵՆՑԱՂ»

ՀՄԽՀ Առողկոմատի յեկ Ֆիզկուլտ Կերագույն
Խորհրդի

Միամսյա հանրամատչելի պատկերագրագ հանգես

Բաժանորդագրությունը

12 ամիսը	3	ա. 60 կոպ.
6 »	1	ա. 90 կոպ.
3 »	1	ա. 20 կոպ.

Առանձին համարը՝ 30 կոպ.

«Առողջ Կենցաղի» սովորական համարը բաղկացած է 24 չերեսից:

Медицинский Журнал Армении
научный орган НКЗдрава ССРА и Эри-
ванского Медицинского Инстута

№ 1

Հոդվածներն ու պահանջներն ուղղել՝
Ֆեհվաճ, Առողկոմատ, փող. Գնունի № 46

«ՍԱՆ-ԼՈՒՍ» ԳՐԱԴԱՐԱՆ

1. Գաղափարացի Գ. — Առողջապահության 5-ամ-
յակը Սորհրդ. Հայաստանում . 8 կոպ.
2. Բժ. Ղազարյան Ա. — Բնակարանները
և մեր առողջությունը 10 »
3. Բժ. Նավասարդյան Ա. — Տրախոմա 3 »
4. Բժ. Ղազարյան Ա. — Բուժեղ . 5 »
5. » » » — Բուս 7 »
6. » » » — Ինչ է արել գի-
տությունը վարակիչ հիվանդու-
թյունների բնագավառում . . . 4 »
7. Բժ Սյանաբյան Ա. — Վերականգնա-
տեր 5 »
8. Գրոճ. Սարխիզյան Խ. — Մարդկային
աղբի ոգտագործումը վերպես
պարարտանյութ 3 »

Պ Լ Ա Կ Ա Տ Ն Ե Ր

1. Մալրեր ղեպի կոնսուլտացիա 50 »
2. Պալքար Մալրի ղեպ 60 »
3. Հաղթահարենք տուբերկուլոզը . . . 60 »
4. Կոտորենք ճանճերին 20 »
5. Սորհրդ. Հայաստանի առողջապահու-
թյան բնագավառում 1 ռ.
- Բոլոր հրատարակությունների համար դիմել՝
Զեքեվան. Առօրյա համար 46



<< Ազգային գրադարան



NL0267267

ԳԻՆՆ-Ե՛ 50 ԿՊՊ.

4213

649