

30 JUL 2010



Ռ. ԱՐՄԵՆՅԱՆ

—== ԽՈՇՈՐ ՅԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ
ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԸ ==—

Յ Ե Ր Ե Վ Ա Ն
1 9 2 5

619.2
Ա-91

ՀԱՌՅՍ Ե՛Ն ՏԵՍԵԼ

- | | |
|--|-------|
| 1. Պ. Շագունց — Մեր անելիքները | 20 կ. |
| 2. Հ. Փիւռումյան յեմ Ս. Մելիքեան. — Ինչո՞ւ ձեռնառու յի գործարանում յուզ և պանիր պատրաստելը | 3 » |
| 3. Հ. Փիւռումյան. — Խոտաբույսերը և նրանց մշակութան յիշատակները | 10 » |
| 4. Խ. Ավդալբեգյան. — Հ. Ս. Խ. Հ. Հողային Որենսդիրքը, բացատրական հարց ու պատասխաններով, մասն առաջին, աշխատավորական հողագտագործություն | 40 » |
| 5. Պ. Հեֆիմյան. — Թթենու մշակությունը | 10 » |
| 6. Պ. Հեֆիմյան. — Շերամի վորդը, նրա կերակրելն ու խնամքը | 10 » |
| 7. Կ. Մելիք-Շահնազարյան. — Ծխախոտի մշակությունը | 20 » |
| 8. Ս. Քրիզոլին. — Տասը պատգամ անասնապահին | 20 » |
| 9. Խ. Յերիցյան. — Անհատական, թե՛ կոոպ. կաթնատնտեսություն | 10 » |
| 10. Հ. Հարություն. — Բատրակ, կնքիր պայմանագիր (չափածո) | 5 » |
| 11. Մ. Թումանյան. — Շարքացանի և նրա նշանակությունը | 15 » |
| 12. Խս. Տեր-Ներսիսյան. — Ինչպե՞ս պետք և մշակել խաղողի այգիները (28 նկարով) | 35 » |
| 13. Մերեմեմեմ զեպի գյուղ. — Անդրկովկասյան Յերկրային Կոմիտեյի բանաձևը գյուղացիական հարցի մասին ընկ. Ս. Շագունցի նախաբանով | 15 » |
| 14. Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեյի չորրորդ պլենումի բանաձեւերը | 15 » |
| 15. Ռ. Արմենյան. — Խոշոր յեղջուրավոր անասունների ժանտախտը | 15 » |

1. **Հ. Ս. Գաթախյան** — Դյուղատնտեսական բանվորությունը և միջազգային կրճատման շարժումը:
2. **Խ. ՅԵ. Իսկան** — Կաթնատնտեսության գործնական ձեռնարկ, մասն առաջին, (64 նկարով):
3. **Հ. Փիքուլյան** — Դեմի հողերի մշակությունը.

ՀԲԱՅՏԱՐԱԿԱՆ ԹՅՈՒՆ

619.2

4x-91

Ռ. ԱՐՄԵՆՅԱՆ

ԽՈՇՈՐ ՅԵՂԶՅՈՒՐԱՎՈՐ
 ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԸ



8 6 7 6 7 U 2
1 9 2 5

26 FEB 2013

8977

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
ՀԱՂԺՈՂԿՈՄՍՑ ԽՄԲ. ԿՈՂԵԴԻԱՅԻ



ՏՐԵՍԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՐԱՆ

Դրատ. 151բ.

Պատ. 4916

Տիրած 2500

32882-41

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

	Եջ
1. Յերկու խոսք մեր ընթերցողներին	5
2. Ինչ է խոշոր յեղջուրավոր անասունների ժանտախտը	7
3. Ժանտախտի պատմությունը	7
4. Ժանտախտի պատճառած վնասները	8
5. Ժանտախտի տարածման պատճառները	9
6. Ժանտախտի պատճառը	10
7. Ժանտախտի վիրուսի գտնված տեղը յեղ անասունների վարակումը	10
8. Վարակվող անասունները	12
9. Կորուստի չափը	13
10. Հիվանդության նշանները	13
11. Բժշկություն	17
12. Հակաժանտախտային շինուկը	18
13. Հակաժանտախտային շինուկի ազդեցությունը	18
14. Պատվաստում	18
15. Կարանտինային հսկողությունը	20
16. Ինչ պետք է անել մինչեղ անասնաբույժի գալը	21
17. Վարակված գոմերի յեղ այլ վայրերի ախտահանումը	22

ՅԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻՆ

Խորհրդային Հայաստանի Հողագործության Ժողովրդական
Կոմիտեի անունից «Գյուղացու Գրադարան» ընդհանուր վերնագրի
առաջ ձեռնարկել և գյուղատնտեսության զանազան ճյուղերին
և վիթրած մի շարք գործույկների հրատարակության: Նախատա-
րած այդ գործույկների միջոցով զարկ տալ գյուղական տնտե-
սության բարձրացման յեղ նպատակահարմար ձեովով տնտեսու-
թյունը վարելու գործում՝ պարզ ու ըմբռնելի ցուցմունքնե-
րով աջակցել գյուղացուն: Այս հիմնական նպատակն իրագոր-
ծելու համար գործույկների նյութը հարմարեցված և միջին զրա-
գետ գյուղացու պահանջներին:

Լավ գիտակցելով ձեռնարկած գործի լրջությունն ու կա-
րեվորությունը, Հողժողովմատի Խմբագրական-Հրատարակչա-
կան Կոլլեգիան համոզված և, վոր այս գրքույկը, ինչպես յեղ
մինչեղ որս իր հրատարակությամբ լույս տեսած մյուս գրքույկ-
ները նյութի յեղ լեզվի տեսակետից վորոշ թերություններ կա-
րող են ունենալ:

Թե՛ այս յեղ թե՛ այլ հնարավոր թերությունները վերա-
ցնելու, հրատարակության գործը կանոնավորելու յեղ գյուղացու
պահանջները քավարարելու համար Հողժողովմատի Խմբագրա-
կան-Հրատարակչական Կոլլեգիան խնդրում և ընթերցողներին
յեղ գյուղատնտեսության աշխատավորներին իրենց դիտողու-
թյուններն ուղարկել Յերեվան, Հողժողովմատ:

Ամեն մի արժեքավոր դիտողություն կընդունվի մեծ շնոր-
հակալությամբ:

Ծրարները կարելի յե ուղարկել առանց նամակադրոշմի:

ՀՈՂԺՈՂԿՈՄՍԱՏԻ ԽՄԲ.-ՀՐԱՏ. ԿՈՂԼԵԳԻԱ

ԽՈՇՈՐ ՅԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽԱՏԸ

1. ԻՆՉ Ե ԽՈՇՈՐ ՅԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽԱՏԸ

Այս հիվանդութիւնը խոշոր յեղջուրավոր անասուններին (տավարին) և գոմեշներին հատուկ խիստ վարակիչ և համաճարակային մի հիվանդութիւն է: Յերբ անասնապահական մի շրջանում այդ հիվանդութիւնը յերևում է, այնտեղ անասունների մեծ մասը կոտորվում է, իսկ այդ հիվանդութիւնից առողջացած անասուններն այնքան են նիհարում, վոր յերկար ժամանակվա համար անպետք են դառնում:

2. ԺԱՆՏԱԽԱՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս հիվանդութիւնը հայտնի յե հին ժամանակներից: Այն ժամանակ, յերբ գոյութիւն չունէր անասնաբուժական դիտութիւնը և հայտնի չէր վարակիչ համաճարակային հիվանդութիւնների բնույթն ու տարածման պատճառները, ժանտախտը թէ Յեփրոպայում, թէ Ասիայում և թէ Աֆրիկայում առաջ եր գալիս յերբեմն, մանավանդ պատերազմների ժամանակ, հսկայական վնասներ պատճառելով:

Ժանտախտի ամենամեծ համաճարակը պատահել է 1709—1717 թվականներին: Այդ թվականներին ժանտախտըն սկսվում է Ռուսաստանի սահմաններում, Թուրքեստանում, Դոն և Վոլգա գետերի ուղղութիւնը տարածվում է մինչև Մոսկվա, անցնում է Լեհաստան, Հունդարիս, Գերմանիայի արևելյան և հարավային մասերը, Շվեյցարիա,

Իտալիա, Ֆրանսիա, Հոլլանդիա և Անգլիա: Ժանտախտից ազատ են մնում միայն Շվեդիան և Սպանիան չնորհիվ այն հանգամանքի, վոր դրսից բոլորովին տավար չեն ստանում: Միայն Անգլիայում յերեք տարվա ընթացքում (1711—1714 թ. թ.) կոտորվում են մեկ ու կես միլիոն տավար:

Այն ժամանակ այսպիսի հսկայական ծավալումը և պատճառած տհույսի ավերումներն են պատճառ դառնում, վոր հետզհետե լույս են տեսնում այդ համաճարակը նրկարագրող գրքեր և շատանում են անասնաբուժական դպրոցները:

3. ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՊՍՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՄՆԵՐԸ

Թե ինչպիսի սոսկալի փառներ և տալիս ժանտախտը, կարելի չե տեսնել հետևյալ թվերից.

1740—1750 թ. թ. ամբողջ Յեվրոպայում կոտորվել են 3,000,000 տավար

1745—1752 » » միայն Դանիայում կոտորվել են 2,000,000 տավար

1746 թ. Անգլիայում սպանված են*) 80,000 »

19-րդ դարու սկզբներին ամբողջ Յեվրոպայում կոտորվել և յեկու հաշվու միլիոն տավար, վորից միայն իսկ միլիոնը Դանիայում.

1841 թ. Յեվրոպայում կոտորվել են 500,000 տավար

1844—1845 թ. թ. Ռուսաստանում կոտորվել են 1,000,000 »

1865 թ. Անգլիայում կոտորվել են 138,578 »

և հիվանդության պատճառով սպանվել են 100,180 »

1865 թ. Հոլլանդիայում կոտորվել են 68,550 »
և սպանվել են 36,485 »

*) Սպանված են ժանտախտի տարածման առաջն առնելու համար: Ռ. Ա.

1870—1871 թ. թ. Ֆրանսիայում կոտորվել են 100,000 տավար

Յեվրոպական Ռուսաստանում կոտորվել են՝

1885 թ. 350,000 »

1886 թ. » » 264,000 »

1887 թ. » » 76,000 »

1889 թ. » » 37,000 »

1889—1893 թ. թ. » 1 062,032 »

1897—1898 թ. թ. Հարավային Աֆրիկայում կոտորվել են 2,280,000 տավար

1903—1906 թ. թ. Ստորին Յեվրոպայում կոտորվել են 500 000 տավար

Ներկայումս Յեվրոպայում ժանտախտը չնորհիվ ձեռք առած ահեղախառն և կտրուկ միջոցների, բոլորովին արմատախիլ և արված, սա այն Անդրկովկասում, Տաճկաստանում և Ռուսաստանի մի քանի ծայրամասերում նա շարունակում և իր ավերումները:

Հայաստանում միայն վերջին չորս տարիների ընթացքում սպանվել և 15,378 գլուխ անասուն:

4. ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՊՍՏՃԱՌՆԵՐԸ

Անդրկովկասում ընդհանրապես և Հայաստանում մասնավորապես, ժանտախտի վերացման խանգարող պատճառները բազմազան են:

Ժանտախտի տարածմանը նպաստող պատճառների մեջ ավելի հիմնական նշանակություն ունեն քոչվորների ամառային արոտատեղ բարձրանալը, Հայաստանի և հարևան Տաճկաստանի ու Պարսկաստանի սահմանների վրա անասնաբուժական հսկողության բացակայությունը: Դրա համար միշտ Հայաստանում ժանտախտը տարածվում և քոչվորական շարժման միջոցին և կամ Տաճկաստանից ու Պարսկաստանից բերված անասունների միջոցով:

Ե. ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՊԱՏՃԱՌԸ

Համարյա բոլոր հիվանդություններն առաջ են գալիս անասունի որգանիղմի մեջ հատուկ մանրէների (միկրոօրգանիզմներ) բազմանալուց:

Մանրե յեն կոչվում (ինչպես իրենց անունն է ցույց տալիս) այն ամենափոքր եյակները, վորոնք հասարակ աչքով անտեսանելի յեն և վորոնց կարելի չէ տեսնել մանրադիտակի ոգնությամբ: Կան մանրեններ, վորոնք անփնաս են և, նույնիսկ, ոգտակար. բայց կան նաև մանրեններ, վորոնք մահացու թշնամի յեն մարդկանց և անասունների համար:

Վարակիչ հիվանդությունների մեծ մասի մանրենները գտնված են, բայց կան նաև մի շարք վարակիչ հիվանդություններ, վորոնց մանրենները մինչև այժմ չեն գտնված: Ահա այդ տեսակ վարակիչ հիվանդությունների շարքին է պատկանում յեղջյուրավոր անասունների ժանտախտը:

Չնայած, վոր բազմաթիվ գիտական փորձեր են արվել, սակայն մինչև որս հնարավոր չի յեղել գտնել ժանտախտի մանրեն, բայց ի նկատի ունենալով այդ հիվանդության առաջ գալու, զարգանալու և վարակելու պայմաններն ու մի շարք ուրիշ տվյալներ, հաստատ կարելի չէ ասել, վոր ժանտախտն առաջ է գալիս մի առաձին մանրելից, վորը բազմանում է անասունների արյան և աղիքների մեջ. բայց վորովհետև այդ մանրեն դեռևս չի գտնված, մենք այստեղ փոխանակ ժանտախտի մանրե ասելու, պիտի գործածենք ժանտախտի վիրուս անունը:

Զ. ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՎԻՐՈՒՍԻ ԳՏՆՎԱԾ ՏԵՂԸ ՅԵՎ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿՆՈՒՄԸ

Ժանտախտի վիրուսը գտնվում է հիվանդ անասունների բերանում, ստամոքսում, աղիքում, արյան, ար-

ցունքի, խնքի, լորձուկների, հեղուկ և պինդ արտթորության, մսի, ինչպես և կաշվի մեջ: Մի խոսքով՝ վիրուսը գտնվում է անասունի բոլոր մասերում: Միևնույն ժամանակ վիրուսը գտնվում է հիվանդի արյան, պինդ և հեղուկ արտաթորության և այլ մասերի հետ շփում ունեցող դարմանի, խոտի, աղբի, ջրի, ողի մեջ և այլն, ինչպես նաև հիվանդ անասունի գտնված տեղում, պատերի, առաստաղի, հատակի և այնտեղ գտնված բոլոր իրերի վրա:

Հիվանդությունն առողջ անասուններին անցնում է ժանտախտի վիրուսով վարակված վերահիշյալ իրերի, կերի, ջրի, և այլնի հետ շփվելու միջոցով: Հիվանդ անասուններին նայողներն իրենց վարակված ձեռքերով, հագուստով և վոտնամաններով հիվանդությունը տալիս են առողջներին: Հիվանդների համար գործածված չուլերը, պարանները, կապերը ջրելու համար գործածված դուլերը, յեթե առողջ անասունների համար գործածվեն, վարակում են նրանց: Հավերը, աղափնները և այլ թռչունները, մանավանդ ագլավները նույնպես պատճառ են լինում հիվանդության տարածման: Նրանք վարակված աղբի կամ սատկածների լեշերի վրա ման գալուց հետո, ման են գալիս առողջ անասունների խոտի, դարմանի վրա, իրենց վարակված վոտներով վարակում են կերը և պատճառ լինում առողջ անասունների հիվանդանալուն: Հիվանդ անասունները յեթե ուղարկվեն արածելու, կը վարակեն արոտավայրը, վորտեղից ել կը վարակվեն առողջ անասունները: Սատկած անասունները յեթե բոլորովին չեն թաղվում, կամ լավ չեն թաղվում, ջները նրանց միսը, վոսկորները բերում են արոտավայրերը կամ բակերը, վորտեղից և վարակվում են առողջ անասունները: Սատկած տավարի կաշվից պատրաստում են տրեխ և մոտենալով անասունին, վարակում են նրան: Յեթե մի քա-

նի գյուղի անասունները ջուր են խմում միևնույն առվից և յեթե վերելի գյուղում ժանտախտ կա ու հիվանդները նույն առվից են ջուր խմում, նրանով վարակում են ներքևի գյուղի անասուններին:

Բացի վերոհիշյալ միջոցներից, ժանտախտը կարող է մեծ ծավալ ստանալ նաև ժանտախտով հիվանդ կամ նոր առողջացած անասուններին մի տեղից մյուսը տեղափոխելով, առևտրականների և քոչվորների անասունների անց ու դարձով: Նրանք հիվանդությունը ցանում են իրենց անցած ճանապարհի վրա: Վերոհիշյալ տեղեկությունները ցույց են տալիս, թե ինչքան հեշտ է վարակվում առողջ անասունը, այն ել ամեն մի մի քայլափոխում—արոտավայրում, բակում և ջուր խմելու վայրում. մի խոսքով՝ այն բոլոր տեղերում, վորտեղ յեղել են հիվանդ անասուններ կամ լեշեր ու նրանց մասերը և կամ վորևե ձեվով ժանտախտի վիրուսով վարակված նյութերն ու առարկաները շփումն են ունեցել առողջ անասունների հետ:

7. ՎԱՐԱԿՎՈՂ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ

Յեղջյուրավոր անասունների ժանտախտով վարակվում են խոշոր յեղջյուրավոր անասունները (տավարը), գոմշները և ուղտերը: Վոչխարներն ու այծերն ել հիվանդանում են ժանտախտով, բայց մինչև այժմ Հայաստանում չի նկատվել նրանց վարակումը:

Բայի վերոհիշյալ անասուններից, մնացած բոլոր անասունները միանգամայն ազատ են յեղջյուրավոր անասունների ժանտախտից: Ձիերը, ջորիները, խոզերը, շները յերբեք չեն վարակվում այդ հիվանդությամբ: Մաքդիկ սույնաես չեն վարակվում: Անհրաժեշտ է շեշտել մի հանգամանք, վոր ազնվացեղ (զորայուն), խառնուրդ (կիսարյուն) և ազնվացրած տավարը շատ ավելի զգայուն է, ավելի շուտ է հիվանդանում ժանտախտով,

քան տեղական անասունները և ազնվացեղ տավարի մեջ կորուստն ավելի մեծ է լինում:

8. ԿՈՐՄՏԻ ՉԱՓԸ

Կորստի տոկոսը տարբեր է լինում, նայած այն հանգամանքին, թե ժանտախտ գտնված տեղում անասունն ինչ ցեղի յե պատկանում. զտարյուն, կիսարյուն և ազնվացրած անասունների մեջ կորստի տոկոսը լինում է 70—90, իսկ տեղական հասարակ անասունների մեջ՝ 30—60: Հայաստանում վերջին չորս տարվա ընթացքում կորստի տոկոսը յեղել է 45—72, իսկ միջին տոկոսը՝ 66, այսինքն՝ հիվանդացած 100 զուլա տավարից սատկել են 66-ը:

Կորստի տոկոսն զգալի չափով պակասում է, յեթե մի վայրում առաջ ժանտախտի համաճարակ է յեղել, յեթե կատարվել են պատվաստումներ բաղադրյալ (կոմբինացիոն) յեղանակով. իսկ յեթե մի վայրում ժանտախտը յերևացել է առաջին անգամ, կորուստը չափազանց մեծ է լինում: Այս յերևույթը բացատրվում է նրանով, վոր ժանտախտով հիվանդացած և առողջացած տավարը համարյա իր կյանքի ամբողջ տեվողության ընթացքում ալևս չի հիվանդանում ժանտախտով, այսինքն ստանում է ախտազերծություն (իմունիտետ): Այդ տեսակ անասունների հորթերն ու ձագերն ել ստանում են վորոշ չափով ախտազերծություն. նրանք կամ բոլորովին չեն հիվանդանում և կամ հիվանդանում են ավելի թեթև կերպով: Ուրեմն հասկանալի յե, վոր յեթե մի վայրում առաջուց յեղել են հիվանդացածներ ու առողջացածներ, նրանք յերկրորդ անգամ չեն վարակվում ժանտախտով:

9. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ

Յերբ ժանտախտի վիրուսը մտնում է անասունի մարմնի մեջ, նրան անմիջապես չի հիվանդացնում. անցնում է 3—9, բացառիկ դեպքերում մինչև 19 օր, վորի

ընթացքում վերուստ ամենայն հավանականությամբ բազմաանում է և հետո հիվանդացնում անասունին: Այդ ժամանակամիջոցը կոչվում է խմորման (ինկուբացիոն) շրջան: Հասկանալի չէ ուրեմն, վոր շատ անգամ առողջ համարված անասունն իր մեջ ունի հիվանդության վիրուս, այսինքն նա վարակված է և վորոշ ժամանակ անցնելուց հետո պետք է հիվանդանա: Ահա թե ինչու հիվանդություն յեղած վայրից չի կարելի անասուն գնել, նույնիսկ առողջ անասուն, և բերել, խառնել այն վայրի անասունների հետ, վորտեղ բոլորովին հիվանդություն չկա:

Առհասարակ մի տնտեսության համար նոր տավար գնելուց հետո չպետք է խառնել տնտեսության հին անասուններին հետ, այլ պետք է այդ նոր անասունները 21 օր մի առանձին տեղ պահել և բոլորովին ապահով լինելուց հետո միայն խառնել ուրիշ անասունների հետ:

Ժանտախտով հիվանդացած անասունների առաջին նշանը տաքությունը բարձրանալն է: Առողջ տավարի տաքությունը 38 - 39,5 աստիճան է (Ցելս), մինչդեռ հիվանդացածների տաքությունը բարձրանում է մինչև 41 - 42 աստիճան: Ժանտախտ յեղած վայրում 40 աստիճանից ավելի տաքություն ունեցող անասունները յեթե ժանտախտի ուրիշ նշաններ ցույց չեն տալիս, համարվում են ժանտախտով հիվանդանալու կողմից կասկածելի:

Բացի տաքությունից, հիվանդի ականջները կախ, մազերը ցցված են (փուշ-փուշ յեղած) լինում, ախորժակ չի ունենում, չի վարձում, ատամները կրճտացնում է, սաստիկ դողում, հեմալով արագ-արագ շունչ է քաշում, թեթև հագում է, քթից թարախի նման խլինք առատ է հոսում, համարյա շարունակ տնքում է, աչքերը նախ կարմրում են, հետո առատ արցունք է հոսում, վորն իր անցած ճանապարհի վրա գտնված մազերը համարյա այրում, նրանց տեղը փոսացնում է (Տես նկ. 1):



Նկար 1.

Ցեթե հիվանդ անասունի բերանը բաց արվի ու քննվի, կը նկատվի, վոր ատամների շուրջը կապտել է, շրթունքների ներսի կողմը և լինդերի վրա նախ մի շարք փոքրիկ բշտիկներ (պզուկ) են յերվում: հետո իրենք ծակվում են ու նրանց տեղը փոքր վերքեր են մնում: Բերանը, ավելի ճիշտ՝ շրթունքների ներսի կողմը թեփով ծածկվածի պես է լինում: Բերանից առատ լորձունք է թափվում (Տես նկ. 2):

Հիվանդության սկզբնական շրջանում անասունների փորը կապ է լինում, իսկ հետո սկսում են լուծել, դարձափոխ, արյունախառն, սևագույն և ջրոտ:

Հիվանդները կարճ ժամանակի ընթացքում նիհարում են, ուժասպառ են լինում, պառկած տեղից չեն կարողանում բարձրանալ և յեթե վտաքի վրա յեն, շարժվելու կարողություն չեն ունենում, աչքերն ընկնում են փոսի մեջ (Տես նկ. 3):

Հիվանդ կովերի կաթը հետզհետե պակասում և վերջապես բոլորովին կտրվում է: Հղի կովերը հորթատում են: Այս հիվանդությունը միշտ չի լինում այնպես



Նկար 2.



Նկար 3.

ծանր, ինչպես նկարագրված է: Այն վայրերում, վորտեղ առաջուց ժանտախտը գոյություն է ունեցել, անա-

սուանները ընչ թե շատ հիվանդության դիմանում են, դրա համար էլ նրանց հիվանդությունը թեթեւ է անցնում, բայց տաքություն անալալման լինում է, աչքերից արցունք է հոսում, լուծում են, միևնույն ժամանակ անասունները շարունակում են ուտել:

Ժանտախտը հինգ որից մինչև 15 որ կարող է տեւել. թեթեւ հիվանդացածների վրա 5-6 որից հետո լավանալու նշանները յերևում են. սկսում են լավ ախորժակով ուտել, վորոճում են, բայց առհասարակ հիվանդությունը 4 որից մինչև 7 որ է տեւում: Հիվանդները յերբեմն յերկրորդ կամ յերրորդ որն են սատկում, առկա յառհասարակ սատկում են 5-6 որից հետո, յերբ լուծելն արդեն սկսված է լինում:

Հիվանդությունից ազատվող անասունները 3-4 շաբաթ մնում են սատախիկ նիհարած, հետո սկսում են առիճանաբար գլխանալ ու կազդուրվել:

10 ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ժանտախտից ազատվելու համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է անմիջապես, առանց մի րոպե ժամանակ կորցնելու, հայտնել անասնաբույժին՝ ուղղակի իրեն և կամ տեղական իշխանության միջոցով, իսկ մինչև անասնաբույժի գալը պետք է ձեռք առնել այն անասնաբուժա-սանիտարական միջոցները, վորոնցով հնարավոր կլինի արգելել և կամ սահմանափակել անասունների վարակման և ժանտախտի ծավալման հնարավորությունները: Այդ միջոցները, վորոնց ժամին կը խոսենք հետո, արենքավ պարտադիր են: Հիվանդ անասուններին բժշկելու համար արմատական միջոց չկա. իսկ առողջ անասուններին վարակումից և կորստից փրկելու համար կա մի հրաշալի միջոց, դա հակաժանտախտային շիճուկով պատվաստումն է:



11. ՀԱԿԱԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿԸ

Այս շիճուկը պատրաստվում է հակաժանտախտային հայաններում՝ ժանտախտով հիվանդացած և առողջացած անասունների արյունից: Հակաժանտախտային շիճուկը ներկայումս ստացվում է Ռուսաստանից: Հայաստանում չորս տարվա ընթացքում (1921-1924 թ. թ.) գործածված է մոտավորապես 12.000 լիտր (750 փութ) շիճուկ, 120.000 բուբուռ արժողությամբ:

12. ՀԱԿԱԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հակաժանտախտային շիճուկի մեջ կան ախտաբանական, վորոնք վոչնչացնում են ժանտախտի վիրուսը: Յեթե այդ շիճուկը սրսկվում է առողջ անասնի կաշվի առի, պատվաստված անասունը վորոշ ժամանակ, այսինքն մինչև այն ժամանակ, յերբ շիճուկը պահում է իր ազդեցությունը, ժանտախտին դիմանում է, վոչնչացնելով մարմնի մեջ մտած ժանտախտի վիրուսը. բայց այդ ժամանակամիջոցը 15 օրից ավելի չի տեւում. բացի դրանից, յերբ ժանտախտի վիրուսն անասնի մարմնի մեջ մտնելուց հետո (խմորման շրջանում) շիճուկ է սրսկվում, այդ դեպքում նա քիչ է ոգնում:

13. ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ

Պատվաստումը կարելի չէ կատարել յերկու յեղանակով—պարզ և բաղադրյալ: Պարզ յեղանակով պատվաստում կատարելու համար միայն հակաժանտախտային շիճուկ է սրսկվում. այդ դեպքում անասունը 15 օր ազատվում է հիվանդանալու վտանգից, բայց այդ ժամանակամիջոցն անցնելուց հետո նորից յենթակա յե հիվանդանալու վտանգին: Բաղադրյալ յեղանակով պատվաստում կատարելու համար միևնույն ժամանակ սրսկվում է թե հակաժանտախտային շիճուկ և թե ժանտախտով հիվանդ

անասունից վերցրած արյուն. այդ դեպքում պատվաստած անասունները, վորոշ ժամանակ անցնելու հետո, հիվանդանում են ու հետո առողջանում և համարյա մինչև իրենց կյանքի վերջն ազատվում են ժանտախտով հիվանդանալու վտանգից:

Հայաստանում ընդունված է առհասարակ բաղադրյալ յեղանակով պատվաստումը: Իրա համար անհրաժեշտ է գտնել ժանտախտով հիվանդ մի անասուն, վորն անասնաբույժի կողմից ընկելուց հետո, յեթե հարմար է ձանաչվում, դնատվում է հակաժանտախտային գործադիր հանձնաժողովի միջոցով, անասնաբույժը նրանից արյուն է վերցնում, հետո անասունը մորթվում է և անասնաբույժը ըննում է ներքին գործարանները իմանալու, թե բացի ժանտախտից՝ ուրիշ հիվանդությունով ել վարակված չէ արդյոք: Քննությունից հետո, յեթե արյունը հարմար է գտնվում, գործածվում է պատվաստումների համար:

Պատվաստման ժամանակ մեծ ուշադրությամբ պետք է հետևել, վոր անասուններին սրսկվի թե շիճուկ և թե արյուն. յեթե միայն մեկը սրսկվի, անասունը կարող է հետո սատկել, վորովհետև, յեթե միայն շիճուկ է սրսկվում, նրա ազդեցությունը 15 օրից հետո անցնում է (ինչպես վերև ասեցինք), և անասունը պատվաստումից 15 օր հետո կրկին կարող է վարակվել ու սատկել, իսկ յեթե սրսկվում է միայն արյուն, անասունները շատ ծանր են հիվանդանում և նրա հետևանքով մեծ մասամբ սատկում են: Բացի դրանից, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, վոր դյուրի բոլոր անասունները պատվաստվեն, վորովհետև չպատաստված անասունները հետո կվարակվեն ու նրանց մեծ մասը կկոտորվի:

Պատվաստումից 4—10 օր հետո, միջին հաշվով 7 օր հետո, համարյա բոլոր պատվաստված անասունները հիվանդանում են. մի փոքր մասը բուրբուխ չի հիվանդա-

նում. մի մասը հիվանդացած լինելու արտաքին նշաններ բալորովին ցույց չի տալիս, բայց միայն 1—2 որ տա-
լությունը բանձրանում է, վորը համարյա աննկատելի յե
անցնում. անասունների մեծ մասը հիվանդանում է թեթև
կերպով, հիվանդության նշանները ցույց է տալիս և 3-4
որ հետո առողջանում, իսկ մի փոքր մասն ել հիվան-
դանում է ծանր կերպով. այս վերջինների մեջ պատա-
հում են և սառնկողներ. սակայն պատվաստումներից հե-
տո սառնկածների տոկոսը մեր անդական անասունների
մեջ պատվաստված անասունների քնդհանուր թվի 1—3
տոկոսից (100-ից 1-3-ը) չի անցնում, հաշվելով նաև այն
սառնկածները, վորոնք պատվաստման ժամանակ հիվանդ
են լինում:

Պատվաստման հետևանքով առաջացած հիվանդու-
թյունը տևում է 7—10 որ: Այդ ժամանակաշրջանում
անհրաժեշտ է խնամքով և զգուշ վարվել անասունների
հետ: Ավելի լավ է մինչև հիվանդության վերացումը լրծ-
կաններին չսոչնառեցնել, իսկ առհասարակ պետք է զգու-
շանալ, վոր անասունները չմրսեն, և սառը ջուր չը-
թան:

Հիվանդացածներից սառնելու կամ առողջանալու
վերջին դեպքից հաշված՝ գյուղը մնում է կարանտինային
հսկողության տակ 21 որ ևս և այդ հսկողությունը վե-
րացվում է անհրաժեշտ ախտահանումը կատարելուց հետո:

14. ԿԱՐԱՆՏԻՆԱՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ժանտախտի տարածման առաջն առնելուն պատակով
կատարված հակաժանտախտային պատվաստումները, ժա-
նտվանդ բաղադրյալ յեղանակով կատարված պատվաս-
տումները, կարող են ժանտախտի տարածման գլխավոր
պատճառը դառնալ, յեթե չգործադրվեն կարանտինային
միջոցներ: Ճիշտ է, պատվաստված անասունները կործա-
նից ազդեցվում են, բայց նրանց մեծ մասը (ինչպես

վերև տեսանք) պատվաստման հետևանքով հիվանդանում
և դառնում է վտանգավոր հարեվան գյուղերի առողջ
անասունների համար, նույնպես հիվանդ անասունի հե-
շտում ունեցող բոլոր առարկաներն ու տեղերը կրում են
ժանտախտի վիրուս և վարակման աղբյուր են առողջ ա-
նասունների համար: Հետևաբար ժանտախտի տարածման
առաջն առնելու համար բավական չէ անասունները պատ-
վաստել, այլ նաև հարևան գյուղերի անասունների վա-
րակման և հիվանդության տարածման պատճառ չլինելու
համար անհրաժեշտ է պահպանել խիստ կարանտինային
հսկողություն, համաձայն անասնաբույժի ցուցմունքի և
անասնաբույժի կանոնադրեր:

Կարանտինային հսկողության ամենաեական կետն
է՝ արգելիլ յեղջուրավոր անասունների, մսի, կաթի,
կաշվի, յեղջուրի, սմբակի, քակորի (թրիք), դարմանի և
խոտի դուրս տանելը վարակված վայրերից, նույնպես
արգելիլ դրսից վարակված վայրը բերել յեղջուրավոր
անասուններ և գոմեշներ:

15. ԻՆՉ ՊԵՏՔ Ե ԱՆԵՆ ՄԻՆՉԵՎ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻ ԳԱՂԸ

Համաձայն անասնաբույժական կանոնադրերի՝ «կենդա-
նիների վրա վարակիչ կամ համաճարակ ախտով հիվան-
դանալու նշաններ յերևալու, առանց տեսանելի պատճառ-
ների հանկարծամահ լինելու կամ միաժամանակ մի քա-
նի միատեսակ հիվանդությունների լերևան գալու դեպքե-
րում կենդանիների տերերը կամ նրանց փոխարինող ան-
ձինք պարտավոր են անհապաղ այդ մասին պատշաճ հայ-
տարարություն տալու» (Հոդ. 84): Այդ պարտավորու-
թյունը տարածվում է նաև այն անձանց վրա, վորոնք
իրենց զբաղմունքի հետևանքով շփումն ունեն կենդանի-
ների, նրանց լեշերի, ամսամթերքների և այլ հում անաս-
նամթերքի հետ:

Հայտարարություններն ուղարկվում են այդ վայրի

անասնաբույժին կամ անասնաբուժակին ուղղակի և կամ տեղական իշխանության մարմինների միջոցով:

«Վարակիչ լինելու կոդից կասկածելի հիվանդություն յերևալու դեպքում՝ հիվանդ կենդարիների տերերը կամ նրանց փոխարինողները, այլ և հիվանդության մասին ծանուցումն ստացած տեղական իշխանության ներկայացուցիչները մինչև անասնաբույժի կամ բուժակի գալը պարտավոր են առանձնացնել հիվանդացած կենդանիներին, թույլ չտալ մսի համար մորթելը, թույլ չտալ, փոր տնտեսությունից դուրս տարվեն թե հիվանդ և թե առողջ կենդանիները և հուժ անասնամթերքներն ու կերը» (Հոդ. 86):

«Տեղական իշխանության մարմինների կարգադրությամբ յուրաքանչյուր գյուղում անասունների գերեզմանանոցներ են սարքվում ու պահպանվում են անասնաբուժա-սանիտարական պահանջների համաձայն... դիակները թաղելու համար» (հոդ. 94):

Վերոհիշյալ միջոցները չգործադրող անասնատերերը, նրանց փոխարինողները և կամ պաշտոնական անձինք յենթարկում են պատասխանավորության, համաձայն բրեական Որենսգրքի համապատասխան հոդվածների:

16. ՎԱՐԱԿՎԱԾ ԳՈՄԵՐԻ ՅԵՎ ԱՅԼ ՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

Ախտահանումը կատարվում է մի վայրում գտնված մանրենները, վիրուսը, այսինքն հիվանդության բույնը վոչրնչացնելու նպատակով: Ժանտախտի վիրուսն ուրիշ մանրենների, վիրուսների նման հոդի մեջ յերկար ժամանակ չի կարող ապրել, չոր տեղերում մի քանի որմիայն, իսկ խոնավ վայրերում ու գոմերում 3-4 ամիս կարող է ապրել, իսկ ախտահանիչ (հականեխիչ) նյութերի միջոցով շատ հեշտ կերպով վաճառում է:

Ախտահանման համար նպատակահարմար են հետևյալ յեղանակները. —

1. Գոմի մեջ գտնվող քակորը (թրիքը), խոտը, հարդը, (դարման) պետք է հավաքել և այրել կամ թափել անասունների համար պատրաստված գերեզմանանոցների մեջ բացված խոր փոսերի մեջ:

2. Մուրը և հատակը յեթե քարով, ցեմենտով կամ աղյուսով են շինված, պետք է մաքրել 25 տոկոս լվացքի սոդայի (նատրիում կարբոնատ) յեռացած ջրով և կամ մոխրաջրով, իսկ հետո պետք է յերեք տոկոս կարբոնկայի կամ կրեոլինի ջրով լավ լվանալ:

Մոխրաջուրը պատրաստելու համար հարկավոր է մի դույլ ջրի մեջ յերեք ֆունտ փայտի մոխիր ածել, կես ժամի չափ յեռացնել և հետո ջուրը բամել:

3. Գոմերի պատերը պետք է նորից սվաղել կրով. դրա համար կարելի յե 3—4 ֆունտ կիրը մի դույլ տաք ջրի մեջ խառնել և քսել գոմերի պատերին:

4. Փայտից, յերկաթից շինված իրերը կարելի յե ախտահանել 3 տոկոս կարբոնկայի կամ կրեոլինի ջրով, իսկ յեթե հնարավոր չլինի զեղորայքը ձեռք բերել, պետք է այդ իրերը թրջել թաց ջրով և պահել արևի տակ մի ցերեկ:

Այնուամենայնիվ ախտահանումը պետք է կատարել միշտ անասնաբույժի խորհրդով և նրա ցույց տված հատուկ յեղանակով, իսկ յերեք այդ հնարավոր չե, այն ժամանակ միայն դիմել վերոհիշյալ միջոցներին:

ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ ԵՆ ՅԵՎ ՀԵՏՁՀԵՏԵ ԿՀԱՆՁՆՎԵՆ
ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

1. Գենադերչակ
2. Հողի ոգտագործման ընկերական ձևերը
3. Մեղունների խնամքը
4. Խոզաբուծություն
5. Հողի պարարտացումը
6. Ինչպես են ցանում բամբակը շարքացանով:

ԴԻՄԵՆ՝ ՅԵՐԵՎԱՆ, Հողօգտագործման, Հրատարակչության, Պետհրատի
կենտրոնական յեվ գավառական գրախանութ-
ներին, Գավհողբաժիններին:



<< Ազգային գրադարան



NL0266894

8977

ԳԻՆՆ Ե 15 ԿՈՊ.

Գրք