

30 JUL 2010

Ա. Ս. Խ. Հ. Հ. ՈՂԺ ՈՂԿՈՄԱՏ

836.04

848

ՀՂԻ ԿՈՎԻ

ԿԵՐԱԿՐԵԼՆ ՈՒ ԽՆԱՄՔԸ

636.04

Ա-21

Ա. Զ. ԵՐՆԵՐ
Դյուղանոց. բաժին
Բագու—1935

36.04
21.03.2014
4-21

ՀՂԻ ԿՈՎԻ ԿԵՐԱԿՐԵԼՆ ՈՒ ԽՆԱՄՔԸ!

Կաթնատու անասունները ճիշտ զարգացման գործում բացի մատղաշները մեծացնելու, կաթնատու անասունները կերակրելու և խնամքի հիմնական խնդիրներին՝ անհրաժեշտ և հատուկ ուշադրություն դարձնել հղի կովի կերակրելու և խնամքի վրա:

Այս վերջին մոմենտի ճիշտ մոտենալուց և կախված հետագա կաթ տալու (լակտացի) շրջանի նորմալ ընթացքը և վորոշ չափով նորածին հորթի առողջ դրությունը:

Հղի կենդանու ստացած սննդատու նյութերը գործադրվում են հորթի արգանդի շրջանի զարգացման համար: Այդ պատճառով ել բացի այն կերից, վոր ստանում և կովը իր գոյություն և կաթ արտադրելու համար, անհրաժեշտ և տալ նրան նաև լրացուցիչ կեր արգանդի պտուղի համար:

Իր գոյության վեց ամսվա ընթացքում, սաղմը չափազանց դանդաղ և զարգանում և մեծ մասամբ նա ջրից և գոյացած լինում: Արագ աճումը և զարգացումը նկատվում և միայն արգանդային շրջանի վերջին յեռամսյակում. դրա համար ել կովի հղիության առաջին շրջանը հաշվի չի առնվում խարաբածինը—(որաբածինը) հատկապես սկսում են ավելացնել միայն ծնելուց 100—120 ուր առաջ:

Կաթ տալու վերջին շրջանը կարելի չե համարել վորպես ինտենսիվ աշխատանքի շրջան, վորը պա-

21.3

Խմբագիր Լ. Դանիելյան
Թողարկու և սրբագրիչ Ա. Արևան

Baş Mətbuat mədirliyi Məvəkilligi № 2718. Sifariş № 447. Tirəz 2500.
stehsalata verilmiş 13/V—35. Capa imzalanmış 21/V—35. Cap listi 1/4.
Çapqız formatı 82×110. Azərənşr mətbəəsində basıldı. 26-lar adına
„Kitab Sarajı“ Bakı, Əli Bəjramov kycəsi.

հանջում ե կսթնատու կովի ամբողջ որդանիզմի լարվածություն: Դրա համար ել ծնելու ժամանակ կովը իր որդանիզմի մեջ պետք ե բավականաչափ սննդատու նյութեր: ի պաշար ունենա:

Յեթե կովը կաթ տալու շրջանում գործադրի իր մարմնի սննդատու նյութերի մեծ մասը, և ծնելու համար չստանա համապատասխան նախապատրաստում, ապա կաթ տալու նոր շրջանում նա կազդուրված չի լինի: Իսկ հետեվանքը այն կլինի, վոր կենդանին կքայքայվի և կզակասացնի կաթնատվությունը:

Աշխատանքի փորձը և գործնական դիտումները — ցույց են տվել, վոր այն կովը, վոր ամբողջ հղիության շրջանում մինչև հորթի ծնելը նորմալ ե կերակրված լինում, կարող ե տալ շատ առատ կաթ և կաթնառատությունը տեվում ե մինչև կաթ տալու շրջանը: Այստեղից կարելի յե յեզրակացնել, վոր հղի կովը պետք ե վերջին յեռամսյակում ոգտագործի հղիության համար վերջին յեռամսյակում տված լըրացուցիչ կերի մի մասը՝ պահելով իր մարմնում վորպես սննդատու նյութ: Հղի կովի որական ընդհանուր խառաբաժինը, բացի այն կերից, վոր նա ստանում ե իր գոյությունը պահպանելու համար՝ յուրաքանչյուր կերային միավորի մեջ պետք ե լինի 100 գրամ սպիտակուց: Նայած կովի լավ սնվածության, այդ թիվը կարող ե փոփոխվել:

Հղի կովը կերակրելու կարեվոր մոմենտներից մեկն ե հանդիսանում նաև նրա որդանիզմը բավականին քանակությամբ հանքային նյութերով ապահովելը: Հորթի վոսկորներն ամրանալու համար մեծ քանակությամբ կալցի և ֆոսֆոր ե պահանջվում և յեթե այս նյութեր բացակայում են խառաբաժնում ապա կովի որդանիզմը խիստ կերպով քայքայվում

ե և իր հերթին թուլացնում ե հորթի կազմվածքը: Հանքային նյութերի բացակայությունը անդրադառնում ե նաև հետագա կաթ տալու շրջանի վրա: Դրա համար ել հղի կովի համար կեր ընտրելիս, առավելությունը պիտի տալ այն կերին, վորի մեջ հանքային նյութեր: ավելի շատ կան

Այսպիսի կեր ե համարվում բակլային խոտը, ուր շատ կա կալցի, քուսպը, վորը իր մեջ պարունակում ե մեծ քանակությամբ ֆոսֆոր, թեփը և այլն: Այն դեպքում, յեթե այս կերը հնարավոր չե ձեռք բերել, իսկ յեթե կա ել բայց վոչ բավարար քանակությամբ, արհեստական կերպով խառաբաժնի մեջ պետք ե ավելացնել հանքային նյութեր, այն ե կավիճ և վոսկրային ալյուր: Յուրաքանչյուր որաբաժնի մեջ կարելի ե խառնել 30—40 գրամի չափ կավիճ:

Վոսկրային ալյուր կարելի յե տալ միայն որվա ամբողջ խառաբաժնի մի տասերորդ մասի չափ: Հղի կովի համար կեր ընտրելու ընդհանուր կանոնը կայանում ե նրանում, վոր առանձնապես ուշադիր վերաբերվել կերի վորակին:

Անպայման պետք ե խուսափել հղի կովին անվորակ կեր տալուց, այլապես նա առաջացնում ե ըստամոքսի խանգարում, կապություն և ի վերջո կարող ե առաջանալ վիժում: Նույնը պետք ե ասել և սիլոսի, վերաբերմամբ վորովհետեվ վերջինիս վորակը նույնպես յենթակա յե առատամեծներե, դրա համար ել ավելի լավ ե ծնից 30—35 որ առաջ չտալ այդ կերը:

Կովի ծնելուց 10—12 որ առաջ անհրաժեշտ ե ուժեղ խառաբաժին չտալ, այլ տալ կովին կոշտ և ջրալի կեր վորպեսզի կովի մկանները և փորի հոդակապերը թուլանան, վորը զգալի կերպով կհեշտացնի կովի ծինը:

Վորպեսզի կովը ծնելուց հետո չհիվանդանա՝ հարկավոր է զգուշությամբ մոտենալ նրան կերակրելու խնդրին. կովին սառը ջուր չի կարելի տալ, անհրաժեշտ է քիչ տաքացնել ջուրը տալ ծնից 2-3 ժամ անցնելուց հետո, վոչ ավել քան $1\frac{1}{2}$ վեդրո:

Ծնելու առաջին օրերը կովի կերակրելը վոչնչով չի տարբերվում մինչև նրա ծինը: Յեթե կովի կուրծքը ամրանում, կոշտանում է, պետք է նվազացնել կովի խառաքաժինը: 3—4 օր անցնելուց հետո, կարելի չէ ավելացնել որական 300 գրամ մի չափ ուժեղ կեր: Կթան կովի հանքային նյութեր ստանալու պահանջը կաթ արտադրելու համար զուգադիպում է հորթի զարգացման համար նույն նյութերը ստանալու պահանջին հետ դրա համար ել խառաքաժինից չը պետք է պակասացնել հանքային նյութերի ընդհանուր քանակը:

Հղի կովի խնամքի համար պետք է ասել հետեվ յալը. 8—10 օր առաջ մինչեվ ծինը՝ կովին պետք է տեղափոխել ծննդարան: Անհրաժեշտ է առանձին ուղադրուկյուն դալ ձևել մաքրության վրա՝ հաճախ փոխելով կովի տակը:

Ծնից հետո կովի ազդերը և կուրծքը պետք է լվանալ գոլ ջրով: Ամեն օր հղի կովին պետք է ուղարկել ման գալու:

Հղի կենդանին պետք է մշտական հսկողության տակ լինի, դրա համար ել ծննդարանում պետք է մշտական հերթապահություն նշանակել:

Նկատի ունենալով, վոր հղի կովը պահանջում է առանձին հոգատար խնամք, դրա համար ել հղի կովին սպասարկող պերսոնալը պետք է ընտրել հուսալի և փորձված աշխատողներից:

« Ազգային գրադարան



NL0282928

21.724

Գինը 5 կոպ.

21.724

21.724

ASSC XTK
Boqaz inəjin saxlanılmasъ və
jəmlənilməsi

AZƏRNƏŞR
Kənt-təsərrüfat şöbəsi
Bakı — 1935