

1548

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՄՍՈՒՐԱՅԻՆ ՅԵՎ ԱՐՈՏԱՅԻՆ ԸՐՋԱՆՈՒՄ
ԽՈՋԵՐԻ ԾԻՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐԴԵԼՈՒ
ՅԵՎ ՄԱՏՂԱԾՆԵՐԻՆ ԱՃԵՑՆԵԼՈՒ
ՈՒ ՊԱՅԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

636

Հ-99

ԳՅՈՒՂԶՐԱՏ

1937

ՅԵՐԵՎԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խոզանոցներ	3
Խոզերի մաքրումը	4
Խոզերի ցամաքը	5
1. Մերունների զրոսանքը	6
2. Հղի մերունների կերակրումը	7
3. Ծնունդն ընդունելը	9
4. Ծծմայր մերունների և խոճկորների կերակրումն ու խնամքը	13
5. Խոճկորների լրացուցիչ կերակրումը	14
6. Խոճկորներին պահելն ու խնամելը	19
7. Անասնաբուժա-սանիտարական միջոցառումներ	20

636 այ
2-99

30 JUL 2010

ՀՐԱՀԱՆԳ՝

ՄՍՈՒՐԱՅԻՆ ՅԵՎ ԱՐՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
ԽՈՋԵՐԻ ԾԻՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ
ՅԵՎ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻՆ ԱՃԹՑՆԵԼՈՒ
ՈՒ ՊԱՇԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

501
82

17.06.2013

Инструкция

по организации опороса свиней в
стойлово-пастбищный период, выращиванию
и содержанию свиней

462
38

Կազմեցին և խմբագրեցին Մ. Սիմոնյան և Ն. Մալաթյան
ՏԵԽՆ. խմբագիր և սրբագրիչ՝ Խ. Այվազյան
Գլավ. լիազոր № 1167

Հրատար. 415, տիրաժ 1500, պատվեր 307
Հանձնված է արտադրության 1937 թ. մարտի 27-ին
Ստորագրված է տպագրելու 1937 թ. ապրիլի 15-ին

Գյուղատնտեսական տպարան, Յերևան, Նալբանդյան 11

ԽՈՋԱՆՈՑՆԵՐ

1. Խոզանոցը պետք է լինի չոր և լուսավոր։
Սա առաջին կարևորագույն պահանջն է, վորովհե-
տև խոնավ և մութ խոզանոցը խոզերի համար
չափազանց վտանգավոր է։ Խոզանոցում մի-
ջանցքների և կացոցների հատակը, ինչպես և
պատերն ու առաստաղը, պետք է լինեն չոր և
մաքուր։

2. Ծծմայր մերունների և խոճկորների խոզա-
նոցը պետք է լինի տաք։ Այնտեղ պետք է լինի
համաչափ ջերմաստիճան, անկախ դրսի ջերմաստի-
ճանից։ Հատակից մեկ մետր բարձրության վրա
տաքությունը պետք է լինի 10—12 աստիճան
Ցելսիուսի։

3. Խոզանոցում ողը միշտ պետք է լինի

մաքուր և թարմ: Տօթը և փչացած ողբ խոզանոցում թուլացնում և թունավորում է խոզերին:

Խոզանոցի ողբ թարմ և մաքուր պահպանելու համար պետք է շարունակ հսկել ողբափոխիչ խողովակների աշխատանքին և դրանք բաց անել ու փակել անհրաժեշտության դեպքում: Բացի դրանից, խոզերին և խոճկորներին դբոսանքի հանելու ժամանակ պետք է ողբափոխել խոզանոցը՝ լուսամուտները կամ դռները բաց անելով: Առանձնապես ոգտակար է բաց անել արեվահայաց լուսամուտները խաղաղ, պարզ լեզանակներին:

ԽՈԶԵՐԻ ՄԱԳՐՈՒՄԸ

4. Անհրաժեշտ է ժամանակ առժամանակ խոզերին մաքրել խոզանակով կամ վոլորած ծղոտով: Խոզերի և խոճկորների վրա պարագիտներ (վոշիլներ) լերևան գալուց պետք է խոզերի մաշկին քսել նավթ, ոլեոնավթ, մազուլթ, վերամշակված աֆտոլ՝ նավթի հետ խառնած (մի մաս նավթին 10 մաս մազուլթ, ոլեոնավթ կամ անմշակ նավթ և ալյն): Յեթե խոզերը վարակված են պարագիտներով շատ ուժեղ չափով, քսելը պետք է կրկնել յուրաքանչյուր 10—15 օրը մեկ անգամ, վորովհետև այդ ժամանակամիջոցում խոզի մազերի վրա գտնվող պարագիտների ձվաներից դուրս են գալիս մանր վոշիլներ:

ԽՈԶԵՐԻ ՑԱՄԳԱՐԸ

5. Խոզերը պետք է ապահովված լինեն չոր ցամքարով: չոր, փափուկ և տաք կացոցը խոշոր նշանակություն ունի կենդանիների առողջության պահպանման և կերը տնտեսելու տեսակետից: Թաց, խոնավ ցամքարի վրա և ցուրտ հատակին (բետոնից, քարից, ասֆալտից) պառկելը խոզերի համար շատ վնասակար է: Ուստի անհրաժեշտ է սառը հատակ ունեցող կացոցների հատակը կիսով չափ ծածկել տախտակով: Կացոցները մաքրելիս պետք է դուրս թափել միայն թաց և կեղտոտ ցամքարն ու գոմաղբը: Հին չոր ցամքարը պետք է կողքերից հավաքել և նրան ավելացնել չոր թարմ ցամքար այնքան, վոր խոզի տակը լինի փափուկ և տաք: Հիվանդություն առաջ գալու դեպքում պետք է ամբողջ ցամքարը փոխել: Ծղոտը քիչ լինելու դեպքում դրանով առաջին հերթին պետք է ապահովել ծնելու մոտ և խոճկորներ ունեցող ծծմայր մերուններին: Հղի և ցամաք մերունների համար պետք է ոգտագործել այլ տեսակի ցամքար (տերև, տորֆ, լեզեզ, փայտի թեփ և այլն):

1. ՄԵՐՈՒՆՆԵՐԻ ԶՐՈՍԱՆՔԸ

Թարմ մաքուր ոգում, արեվի ճառագայթների տակ, նույնիսկ ձմեռ ժամանակ, իսկ առավել ևս ձմեռվա վերջերին, յերբ վրա լին հասնում պայծառ արևոտ օրերը, զբոսանքը մեծ նշանակություն ունի խոզերի առողջության ամրապնդման համար:

Առանց զբոսանքի հնարավոր չե մերուկներից ամուր յեվ առողջ խոնկորմեք ստանալ:

Զբոսանքի տևողությունը պետք է լինի կես ժամից մինչև 2 ժամ և ավելին՝ նայած չեղանակին: Խոզանոցից զբոսանքի դուրս բերելու և խոզանոցը ներս տանելու ժամանակ, ինչպես նաև զբոսավայրում, պետք է պաշտպանել հղի խոզերին ամեն տեսակի հարվածներից, սայթաքելուց և այլ մեխանիկական վնասվածքներից: Ճանապարհներն անանցանելի դառնալիս, յերբ բակերում (աղաներում) ցեխ է լինում, խոզերին պետք է ման ածել դաշտում, բարձր, ձյունից ազատված և չորացած տեղերում: Մառած և սլկուն ճանապարհներով խոզերին չպետք է քշել: Ամառը թե խոզերին (հղի և ծծմայր) և թե խոնկորներին պետք է պահել արոտում: Խոնկորներին արոտի պետք է սովորեցնել աստիճանաբար՝ սկսած 10 որական հասակից՝ դուրս թողնելով նրանց տաք ժամանակը, առաջին օրերին

10—15 բուլեյից վոչ ավելի: Խոզերի համար ամենալավ արոտն են հանդիսանում առվույտի, յերեքնուկի ցանքսերը, բայց հաջողութամբ կարող են ոգտագործվել նաև ուրիշ թիթեռնածաղկավոր բույսերի ցանքսերը, ինչպես և բնական արոտները:

2. ՀՂԻ ՄԵՐՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. Կերակրելու ժամանակ պետք է խիստ հետևել, վոր մերուկները լինեն միջակ գիրուկյան, վոչ շատ ճարպակալած և վոչ ել նիհար: Ճարպակալած և նիհար մերուկները տալիս են թույլ խոնկորներ և նրանց վատ են կերակրում:

Հղի մերուկների կերաբաժինը պետք է բաղկացած լինի բազմաեստակ յեվ ցնեստությամբ համար ամենամասշտի կերերից:

1. Ճիշտ կերակրման դեպքում կերաբաժնի անհրաժեշտ բաղադրիչ մասերը պետք է կազմեն թիթեռնածաղիկ բույսերի խոտերը (առվույտ, յերեքնուկ, վիկա՝ վարսակի հետ և այլն), կամ մարգագետնային լավ խոտերը, արմատապտուղներ և կարտոֆիլ, քիչ քանակով խտացրած կեբեր (Չարդած հատիկ, մնացորդներ, ալյուրի փոշի, թեփեր, քուսպեր) և հանքային խառնուրդ:

Վորպեսզի խոզերը լավ ուտեն, անհրաժեշտ է խոտը (առվուլյտը, յերեքնուկը, վիկան) մանր աղալ — դարձնել ալյուր. այդ կարելի չէ կատարել հասարակ յերկանքի միջոցով, միայն անհրաժեշտ է վոր խոտը չոր լինի:

2. Մերունների հղիության առաջին 3 ամիսը նրանց կերաբաժինը կաբող է կազմված լինել 70% կոպիտ և հյութալի կերերից և 30% խտացրած կերերից (ըստ կերի միավորների): 3 ամսից հետո կոպիտ կերի քանակն աստիճանաբար պակասեցվում է և ծնելուց 15 որ առաջ կոպիտ և հյութալի կերերի քանակը հասցվում է $25-50\%$ -ի, իսկ խտացրած կերերի բաժինը հասցվում է $70-75\%$ -ի: Այդ ժամանակ կերաբաժինը պետք է կազմել այնպիսի կերերից, վորոնցով մերունները պետք է կերակրվեն նաև ծնելուց հետո:

3. Հյութալի և կոպիտ կերերը տրվում են խտացրած կերերի հետ միասին, թանձր շփոթի ձևով (արմատապտուղները նախորոք կտրատում են, կարտոֆիլը յեփում են կամ խաշում):

4. Լավ վորակի սիլոս կարելի չէ տալ յուրաքանչյուր մերունին որական 3—4 կիլոգր. ծնելուց մեկ ամիս առաջ և հետո պետք է սիլոսը հանել կերաբաժնից:

5. Չի կարելի մերունին կերցնել նեխած և բորբոսնած կեր:

6. Հանքային նյութերը տրվում են հետևյալ խառնուրդի ձևով.

- ա) աղացած կրաքար կամ կավիճ 8 մաս
կերակրի աղ 2 »
բ) աղացած կրաքար կամ կավիճ . . 4 մաս
վոսկրի ալյուր (ալրված վոսկոր) 4 »
կերակրի աղ 2 »

Յուրաքանչյուր մերունին այս կամ այն խառնուրդից կերերի հետ միասին որական տրվում է 30—40 գրամ:

Ծնելուց 2—3 որ առաջ մերունների կերաբաժինը վորոշ չափով պակասեցվում է և նրանց տրվում է խտացրած կեր՝ ջրիկ վիճակում, քիչ քանակով (մանրացած արմատապտուղների հետ միասին):

Յրտահարված արմատապտուղները նախքան կերցնելը մանրացնում են և ապա յեփում կամ խաշում:

8) Հղի մերուններին պետք է կերակրել որական յերկու անգամ:

3. ԾՆՈՒՆՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ

1. Ծնելուց 10—15 որ առաջ մերունին տեղավորում են առանձին կացոցի մեջ, վորը

պետք է նախապես խնամքով մաքրված լինի: Կացոցի պատերը և հատակը պետք է լվանալ յեռման ջրով՝ մոխրաջրի հետ միասին և սպիտակեցնել թարմ հանգած կրով: Մերունին նույնպես փոխադրելուց առաջ պետք է մաքրել և սրբել — չորացնել կրեոլինի մեկ տոկոսային լուծույթի մեջ թաթախած շորով: Յեթե մերունների վրա վոշիլ կա, այդ դեպքում փոխադրելուց առաջ նրանց պետք է մաքրել այդ պարազիտներից վերևում ցույց տրված ձևով:

2. Մերունի հետ պետք է վարվել մեղմ և սիրալիր, վորպեսզի նա ընտելանա և խնամողից չվախենա: Կուրծը չմըսեցնելու համար անհրաժեշտ է, վոր մերունը պառկի չոր և փափուկ ցամաքի վրա: Պետք է գնեն և մերունի պտուկներն ու կուրծը և բուժել ամեն տեսակի վերքերն ու քերծված տեղերը:

3. Ծնելուց առաջ պետք է հետեւել, վոր մերունները փորկապուծվուն չունենան:

Յեթե մերունի կղկղանքը չափազանց պինդ է, պետք է նրան տալ լուծողական: Ծնելուց 5—6 ժամ առաջ մերունին չպետք է կերակրել: Այդ ժամանակ նրան պետք է տալ միայն խմելու ջուր:

4. Ծնելուց 2—3 օր առաջ և 5 օր հետո

անհրաժեշտ է խոզանոցում սահմանել ցերեկվա և գիշերվա հերթապահութիւն, ընդվորում հերթապահը պետք է ճանաչի այն բոլոր մերուններին, վորոնք այդ ժամանակամիջոցում պետք է ծնեն:

5. Ծնելու ժամանակ մերունը պետք է պառկի փափուկ և չոր ցամաքի վրա: Ծնելուց հետո այդ ցամաքը փոխարինվում է թարմով: Ծնված խոճկորներին խոզապահը վերցնում է մորից և սրբում չոր և մաքուր շորով, սկսելով գլխից: Պորը կտրելու համար չպետք է գործածել վորևէ գործիք, այլ թողնել վոր նա ինքնաբերաբար կտրվի: Զեռք չտալ պորտին, այլ ախտահանելու համար զգուշութամբ սուղել մի բաժակ կրեոլինի լուծույթի մեջ: Պորտն ինքնիրեն չկտրվելու դեպքում պետք է մաքուր ախտահանված մկրատով կտրել այն՝ փորից 4—5 սանտիմ. հեռավորության վրա և ծալը սուղել մի բաժակ կրեոլինի լուծույթի մեջ: Ընկերքը և սատկած խոճկորները պետք է դուրս տանել կացոցից և և վոջնչացնել:

Բոլոր ընդունված խոճկորներին տեղավորում են արկղի մեջ՝ չոր փափուկ ցամաքի վրա և վերևից ծածկում շորով ափսոս, վոր արկղի մեջ մի փոքր անցք մնա թարմ ոդ անցնելու համար:

6. Ծննդաբերութիւնը վերջանալուց հետո, սակայն նրա սկզբից հաշված 2 ժամից վոչ ուշ, իսկ յեթե խոճկորները թույլ են, ապա ավելի շուտ, մոտավորապես ծնելուց մեկ ժամ հետո, խոճկորներին ծծեցնում են: Յեթե խոճկորներն սկսում են լավ ծծել, ապա նրանց ամբողջ ժամանակ թողնում են մոր տակ, իսկ յեթե խոճկորները թույլ են, ապա նրանց հավաքում են արկղի մեջ և բաց են թողնում մոր մոտ յուրաքանչյուր 1—2 ժամից հետո՝ գիշեր յեղ ցերեկ:

Այսպես վարվում են մինչև խոճկորների ամրապնդվելը (2—3 օր):

Առաջին անգամ ծծեցնելուց առաջ մոր կուրծն ու պտուկները լվանում են կրեոլինի մեկ տոկոսային գոլ լուծուլթով: Հատուկ ուշադրութիւն պիտի դարձնել այն բանի վրա, թե արդո՞ք բոլոր խոճկորներն ել լավ են ծծում են մորը: Անհրաժեշտ ե ոգնել թույլ խոճկորներին հասնելու պտկին և անպայման հետևել, վորպեսզի նրանք ծծեն կշտանալու չափ: Մերունի տակ պետք ե թողնել այնքան խոճկոր, վորքան մերունը լավ կաթ տվող պտուկ ունի: Ավելորդ խոճկորներին պետք ե գցել մոտավորապես նույն այդ շրջանում ծնած այլ մերունների տակ: Ծնելու ժամանակ և նրանից հետո կացոցում մերունի մոտ պետք ե լինի խմելու մաքուր ջուր:

4. ԾԾՄԱՅՐ ՄԵՐՈՒՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆ ՈՒ ԽՆԱՄԲԸ

1. Ծնելուց հետո առաջին մեկ-յերկու օրը մերունին տալիս են քիչ կեր (0,75 կիլոգր. ցորենի թեփի և 0,75 կիլոգր. գարու ալյուրի խառնուրդ) ջրիկ լափի ձևով: Կերաբաժինն աստիճանաբար (որական 300—400 գրամ) շատացնում են և 5 կամ 6-րդ օրը մերունին տալիս են լրիվ կերաբաժին՝ մշակված նորմաների համաձայն:

3. Ծծմայր մերունների կերաբաժինը պետք ե կազմված լինի բազմազան կերերից:

Ծծմայր մերունի կերաբաժինը պետք ե պարունակի.

ա) թիթեոնածաղիկ խոտ՝ 1—1½ կգ.

բ) խտացրած կերեր (ցորենի թեփ, հատիկների և հատիկալին միացորդների ջարդվածք, քուսպ).

գ) արմատապտուղներ՝ 4—6 կիլոգր., կամ լավ սիլոս՝ 1,5—2 կիլոգր.

դ) ծծմայր մերուններին տրվում ե հանքային նյութերի նույն խառնուրդից, ինչ վոր հղի մերուններին, յուրաքանչյուր գլխին որական 30—40 գր: Հանքային նյութերը տրվում են ուրիշ կերերի հետ խառնած, ինչպես նաև լցնում են ինքնամսուրների կամ կերատառչտակ-

ների մեջ, վորտեղից նրանք վերցնում են ուղածի չափ:

3. Ծծմայր մերունները միշտ պետք է ապահովված լինեն սենյակի բարեխառնություն ունեցող խմելու համար մաքուր ջրով:

Ջրի պակասության դեպքում զգալի չափով ընկնում է մերունների կաթնատվությունը, վորից տուժում են խոճկորները:

4. Խոճկորներին ծծից կտրելուց յերեք որ առաջ ծծմայր մերունների կերաբաժինը կիսով չափ պակսեցնում են և 6—7-րդ որվա ընթացքում մերուններին սկսում են կերակրել ցամաք մերունների նորմաներով:

5. Ծնելուց հետո 5-րդ որվանից ծծմայր մերուններն ամեն որ պետք է դուրս գան զբոսանքի—առանց խոճկորների՝ 1—2 ժամ տեվողությամբ, ինչպես նաև հղի մերունները: Ծրծմայր մերուններին պետք է զբոսանքի հանել որվա ամենալավ ժամանակը և նրանց հատկացնել հարմար աղալը:

5. ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ ԼՐԱՅՈՒՅԻՉ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. Ծնելու 3-րդ որվանից կացոցի կերակրման բաժանմունքում զրվում են փոքր տաշտեր՝ մաքուր ջրով և հանքային կերերով (աղա-

ցած կալիճ, մանրած նոժուխ, այրված վոսկոր, մոխիր, մաքուր ճիմային հող, կարմիր կավ):

Ջուրը պետք է միշտ մաքուր լինի: Հանքային կերը և հողը նույնպես պետք է փոխել որական 2 անգամից վոչ պակաս:

2. 10—15 որական հասակից խոճկորներին սովորեցնում են հատիկային կերերի: Դրա համար կացոցներում կամ կերակրելու բաժանմունքում մաքուր փոքր տաշտակի մեջ լցնում են բոված գարու, վարսակի, յեգիպտացորենի, տարեկանի հատիկներ, ջարդած վոլոռ: Վորպեսզի խոճկորները հատիկ ուտել շուտ սովորեն, ոգտակար է հատիկների մի մասը, հատկապես վոլոռը թրջել աղաջրի մեջ: Հենց վոր խոճկորներն սկսեն հատիկներ ուտել, այդ մոմենտից տաշտի մեջ յուրաքանչյուր որ քիչ-քիչ քանակով շաղ են տալիս զանազան հատիկներ, վողջ և ջարդած դրությամբ, առվույտի կամ յերեքնուկի տերևներ այնպես, վոր խոճկորները կարողանան միշտ ուտել այդ կերերը: Վորքան խոճկորները շուտ սովորեն հատիկային կերերին, այնքան հեշտ և հաջող կընթանա նրանց աճեցումը:

3. Հենց վոր խոճկորներն սկսեն ուտել չոր հատիկային կեր, բայց վոչ ուշ, քան 15—20

որական հասակը, պետք է սկսել նրանց կերակ-
րել շփոթով՝ պատրաստված ջարդած հատիկի
և այլ խտացրած կերի խառնուրդից: Շփոթը
յեփովում է սովորական յեղանակով՝ ինչպես
մարդկանց համար: Վորքան լավ և համեղ է
պատրաստված շփոթը, այնքան ավելի հաճույ-
քով և շատ են ուտում խոճկորները և այնքան
արագ է ընթանում նրանց աճումը:

Շփոթը տրվում է սառած կամ մի քիչ
տաքացրած վիճակում, որական 3 անգամ՝ մանր
տաշտերի մեջ: Ամեն անգամ՝ տաշտը թողնում
են խոճկորների մոտ 30 րոպեյով, վորից հետո
վերցնում են, իսկ շփոթի մնացորդներով կերակ-
րում մերուններին, կամ ուրիշ ավելի մեծ՝
մորից կտրված խոճկորներին:

Պատրաստած շփոթը խոճկորներին տալուց
առաջ շատ ոգտակար է, անգամ անհրաժեշտ,
նրա մեջ ավելացնել թիթեռնածաղիկ խոտի
ալյուր և քիչ քանակով մանրած թարմ զազար
և յեփած ու ջարդված կարտոֆիլ, իսկ ամառ
ժամանակ, զազարի ու կարտոֆիլի փոխարեն,
մանր կտրտած թարմ, հյութալի կանաչ-առվույտ,
յերեքնուկ, յերիտասարդ յեղինջ և այլն:

4. Շփոթը պետք է պատրաստել հետևյալ
խտացրած կերերի խառնուրդից.

Ջարդած վարսակ 3 մաս

» զաբի 4 »

թեփ 1 »

Թիթեռնածաղիկ խոտի ալյուր 1 մաս:

Մանրացրած. — Շփոթի մեջ ավելացվում է թարմ ման-
րացված զազար և ջարդած յեփած կարտոֆիլ՝ հաշվելով խոճ-
կորների յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամ կենդանի քաշին ո-
րական 10 գրամ:

Գարնանը և ամռանը շփոթի մեջ ավելաց-
նում են այդ նույն քանակությամբ կանաչ,
իսկ այնուհետև յուրաքանչյուր որ այդ կանաչի
քանակն ավելացնում են և յերբ խոճկորները
սովորում են կանաչ ուտել, տալիս են ցանկա-
ցածին չափ:

Կանոնավոր կերակրման դեպքում յուրա-
քանչյուր խոճկորի համար պահանջվում է խտաց-
րած կեր որական (գրամներով).

Խոճկորի հասակը	2-րդ 10-որ- յակ	3-րդ 10-որ- յակ	4-րդ 10-որ- յակ	5-րդ 10-որ- յակ	6-րդ 10-որ- յակ	7-րդ 10-որ- յակ
Չոր վիճակում կե- րակրելու համար	20	90	230	300	400	500
Շփոթի համար	15	50	120	280	290	350

5. Յեթե հնարավորություն կա խոճկոր-
ներին տալ քաշած կաթ, ապա այդ պետք է
սկսել այն ժամանակ, յերբ նրանք արդեն սկը-
սել են հատիկային կեր ուտել: Յեթե կովերը

պալարախտով կամ ինֆեկցիոն վիժումով հիվանդ չեն, կաթը պետք է տալ միշտ թարմ, կամ լավ մակարդված մածնի ձևով: Պետք է սկսել շատ փոքր քանակից՝ խիստ պահպանելով որական բաժինը: Չափից ավելի կաթ տալն անթույլատրելի չէ: Տաշտերը խոնկորներին մոտ յերկար ժամանակ չպետք է թողնել, հատկապես այն դեպքում, յերբ տրվում է թարմ անաբատ կաթ, այլ պետք է 10—15 րոպեյից հետո վերցնել: Կաթի մնացորդով կերակրում են մերձենին, իսկ տաշտերը մաքուր լվանում են և չորացնում արեվի տակ: Խոնկորներին չի կարելի կերակրել այնպիսի կաթով, վոր սկսել է թթվել:

6. Խոնկորներին մորից կտրում են 2 ամսական հասակում: Այդ պետք է կատարել առաիճանաբար՝ 3—5 որում: Սկզբում անջատում են ամենից ուժեղ և մեծացած խոնկորներին, իսկ հետագայում, 5 որից հետո՝ ավելի թույլերին: Մորից կտրելու ժամանակ խոնկորներին կերակրում են այնպիսի կերերով, վորոնցով նրանք կերակրվել են մօրը ծծելու ժամանակ: Անհրաժեշտ է մորից անջատելու առաջին տաշտորյակում խոնկորներին տալ ամենից ավելի համեղ և անաղարար կերեր, վորպեսզի անջատումն անցնի սահուն կերպով և խոնկորներին

ածի վրա վատ չազդի: Այդ ժամանակ խոնկորներին պետք է տալ քաշած կաթի կամ այլ կենդանական կերերի ուժեղ բաժիններ (մսոսկրային, ձկան, արյան ալյուր):

6. ԽՈՆԿՈՐՆԵՐԻ ՊԱՅԵԼՆ ՈՒ ԽՆԱՄԵԼԸ

1. 5—10 որական հասակից, նույնիսկ տարվա ցուրտ ժամանակ, լավ և հանգիստ յեղանակին պետք է խոնկորներին դուրս հանել բակը՝ զբոսանքի: Խոնկորներին ցրտին պետք է սովորեցնել աստիճանաբար և զգուշությամբ:

Առաջին որերին խոնկորներին դուրս են հանում 5—10 րոպեյով, հետո աստիճանաբար զբոսանքի տեվողությունը յերկարացնում են, բայց այս դեպքում անհրաժեշտ է հետեվել, վորպեսզի խոնկորներն զբոսանքի ժամանակ շարունակ շարժման մեջ լինեն և վոչ թե անշարժ կանգնեն: Հենց վոր խոնկորներն սկսեն մրսել, պետք է նրանց իսկույն ներս քշել խոզանոց:

2. Ամառը՝ շոգ որերին խոնկորներին յերկար չպետք է թողնել ուժեղ արեվի տակ, այլ նրանց պետք է պահել սովերում—զով տեղում: Խոնկորները խիստ զնաւովում են տաքությունից և արեվի այրելուց:

3. Յեթե խոնկորներին ամառը պահում են

ազատ դրությամբ՝ ցանկապատած բակերում ծածկի տակ, ապա անհրաժեշտ ե խիստ հետե-
վել, վոր բակերը մաքուր լինեն: Հենց վոր բա-
կերը կկեղտոտվեն, կառաջանա փոշի, փոսեր,
պետք ե խոճկորներին փոխադրել թարմ տեղ:

4. Խոճկորներին պետք ե մաքրել և նրանց
մարմինը ժամանակ-առժամանակ շփել բուսա-
կան յուղով, ճարպով և կրեոլինի մեկ տոկոսային
լուծույթով ներծծված շորով:

5. Ծծից կտրած խոճկորների խմբավորման
ժամանակ պետք ե հետեվել, վոր մեկ խմբի մեջ
հավաքվեն միատեսակ հասակի, քաշի և զարգաց-
ման խոճկորներ: Ավելի թույլ խոճկորներին (կամ
ավելի ուժեղներին) պետք ե առանձնացնել և տե-
ղափոխել իրենց ուժին և զարգացմանը համապա-
տասխան խոճկորներին խմբի մեջ, վորպեսզի կանո-
նավորվի բոլոր խոճկորների ճիշտ կերակրում:

7. ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱ-ՍԱՆԻՑԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Ինչպես խոզանոցում, նույնպես և նրա
շուրջը պետք ե պահպանել խիստ մաքրություն,
դրա համար վորպես կանոն՝

ա) խոզանոցները պետք ե մաքրել ամեն
օր՝ առավոտյան և յերեկոյան.

բ) կացոցի պատերը, միջապատերն ու ա-
ռաստաղը ամեն ամիս պետք ե կրով սպիտա-
կացվեն.

գ) սպիտակացման ժամանակ մայրերին
խոճկորների հետ դուրս են հանում դռանելու,
խակ վատ յեղանակներին սպիտակացումը պետք
ե կատարել հերթականությամբ, ընդ վորում
մայրերին խոճկորների հետ դուրս են հանում
կամ միջանցք, կամ թե խոզերի «ճաշարան»:

2. Գոմաղբը թափելու համար պետք ե հատ-
կացված լինի խոզանոցից 30—40 մետր հեռու
ընկած հատուկ ցանկապատած տեղ:

3. Վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում՝ խո-
զանոցի շուրջը թափել գոմաղբ:

4. Պետք ե ունենալ մշտական հսկողություն
խոզանոցի շրջապատի մաքրության վրա:

5. Խոզանոցի շուրջը չպետք ե լինի աղբ,
թափթփուկներ, մարդկային արտաթորություն-
ներ, սատկած կենդանիների դիակներ:

6. Ֆերմայում աշխատող խոզապահների
համար պետք ե կառուցված լինի հատուկ զու-
գարան (արտաքնոց):

7. Խոզանոցի առաջ և նրա շուրջը չպետք
ե լինեն անձրևաշրերի փոսեր: Փոսեր գոյանա-

լուծույթ՝ անասնաբուժի ցուցմունքով: Ամեն անգամ խոզանոց մտնելուց առաջ մտնողն այդ տեղում պետք է ախտահանի իր կոշիկները, վորպէսզի վորեւէ հիվանդութիւն խոզանոց չը- բերի:

13. Մշտական հսկողութիւն պետք է լի- նի խոճկորների և մայրերի վրա: Յուրաքան- չյուր 10-նորյակում բոլոր խոզերը պետք է զննվեն անասնաբուժի կամ սանիտարի կողմից:

Խոճկորների անկման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապէս հրավիրել անասնաբուժին: Խո- զաբուծական ֆերմաներում խոզերի մսուրային շրջանում կերակրելու և խնամելու, պահպանելու վերաբերյալ բոլոր միջոցառումները պետք է կատարվեն գործավարձով, համաձայն խոզաբու- ծական ֆերմաների աշխատանքի կազմակերպ- ման վերաբերյալ մշակված կանոնադրութեան:



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0301118



ИНСТРУКЦИЯ

по организации опороса свиней в стойлово-
пастбищный период, выращиванию и содержанию
поросят