

636.2

Σ-94

24 367 200

Հ Ի Ս Հ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ—ԱՆՍԱՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ի Ա Հ Ա Ն Գ

**ՀՈՐԹԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԽՈՏԱԶՈՒՐ
ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՑԵՎ ԳՈՐԾԱԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հաստատված է ԽՍՀՄ Հողօգտկումի
սեղակալ Ֆ. ՑԻԼԿՈՑԻ կողմից.
20/III 36 ք.

Մտակված է Սիբիրի անասնապահական գիտահետազոտական ինստի-
տուտի ճյուղերի յեկ Կամենսկու շրջնադրամնի ավագ գոտսելսնիկ
բնկ. Ն. Ի. Ստովարնովի ճյուղերի համաձայն:

636.2
2-94



1936

ՑԵՐԵՎԱՆ

ՄԻՔ 438/45
17.06.2013

22.086

636.2
2.94

1. ԽՈՏԱՋՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արևմտյան Սիբիրի յերկրի կամենակու շրջանի կաթնապրանքային ֆերմաներում կատարված փորձերը և մասսայական դիտողությունները ցույց են տալիս, վոր հորթերի կերաբաժնի մեջ մտած խոտաշուրը տալիս և դրական արդյունքներ՝ նպաստելով հորթերի կենդանի քաշի աճին և ստամոքսա-աղիքային հիվանդությունների վերացմանը:

Սոտաշրի գործածությունը, ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, կանխում է ստամոքսա-աղիքային հիվանդությունները, լավացնում է հորթերի ախորժակը և նպաստում է հիմնական կերաբաժնի կերերի ավելի լավ յուրացվելուն: Բացի այդ, խոտաշուրը պարունակում է վորոշ քանակությամբ սննդարար նյութեր (ոսլա, շաքար, սպիտակուց, հանքային նյութեր, ճարպ և վիտամիններ):

Դրա շնորհիվ, խոտաշրի գործածությունն ապահովում է հորթերի կենսունակությունը, բարձրացնում է որական աճը և նպաստում է նրանց լրիվ պահպանմանը:

Լավ զարգացած, պնդակազմ, առողջ հորթեր դաստիարակելու համար անհրաժեշտ է, վորպեսզի հորթի կերաբաժնի մեջ խոտաշուր մտցվի վոչ ի հաշիվ նրան տրվող անքաշ կամ յերեսը քաշած կաթի և մյուս կերերի: Սոտաշուրը հորթերին պետք է տրվի վորպես լրացուցիչ կեր:

2. ԽՈՏԱՋՈՒԲ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱՆ

Սոտաշուր պատրաստելու ամենալավ ձևը պետք է համարել այնպիսին, վորի միջոցով խոտից հնարավոր է

197
767 38

ստանալ վորքան կարելի յե շատ համեղ և աննդարար նյութեր՝ վոչ շատ հեղուկ վիճակում:

1. Խոտաջուր պատրաստելու համար պետք է վերցնել ամենալավ այլ տեսակի բույսերից բաղկացած կանաչ խոտ, վորը պետք է քաղված լինի ծաղկման սկզբին, անձրևի տակ չպետք է մնացած լինի, նրա մեջ պետք է գերակշռեն շատ տերև ունեցող բույսերը, լոբազգիները և լավ ուտվող այլ բույսեր: Լավագույն լրացուցիչ կեր են հանդիսանում յերեքնուկն ու կորնզանը:

Պետք է խստորեն հետևել, վորպեսզի խոտի մեջ չլինեն թուճավոր բույսեր (դաժան գորտնուկ, անդուզ և այլն):

Փոշոտ խոտից չի կարելի խոտաջուր պատրաստել:

2. Վերոհիշյալ վորակի շուկած խոտը մանրացնում են (կտրատում են ծղոտահատ գործիքով) մինչև 3 սմ մեծությամբ:

3. Մանրացված խոտը լցնում են մաքուր ամանի մեջ (ամենից լավ է կլայեկած և հատկապես այս նպատակի համար առանձնացրած ամանը) ու վրան լցնում են մաքուր լեռացրած, բայց մինչև Յելսիուսի 70—80 աստիճանի պաղեցրած ջուր: Ամանը պինդ փակում են կափարիչով և դնում են տաք տեղ (կեր պատրաստելու բաժանմունքում) մի ուր ու գիշեր (առավոտյան պատրաստած, մանրացրած և վրան ջուր լցրած խոտը պետք է մնա մինչև հաջորդ առավոտ):

4. Մանրացրած խոտի վրա ջուր պետք է լցնել մեկ կիլոգրամ խոտին 6—7 լիտր: Մի կիլոգրամ խոտն իր մեջ ձծում է մոտ մեկ լիտր ջուր:

5. Մանրացրած խոտից աննդարար նյութերն ավելի լրիվ չափով հանելու համար կարելի յե վարվել նաև հետևյալ կերպ. մանրացրած խոտի վրա լցնել լեռացրած սառը ջուր և աստիճանաբար տաքացնել այն՝ յեռացող ջրով կաթսայի մեջ (ջրավազան) մինչև 70—80 աստիճան

ըստ Յելսիուսի: Իրանից հետո ամանը պինդ փակել կափարիչով, ծածկել տաք մնալու համար և դնել տաք շենք:

6. Հաջորդ առավոտ, հորթերին խմեցնելուց առաջ, խոտաջուրը խնամքով քամում են մաղի կամ թանգիֆի միջոցով՝ կլայեկած դլանաձև ունկանի մեջ (կարելի յե գործածել նաև հատկապես այդ նպատակի համար առանձնացված դուլլ) և նորից 5 բուպե տաքացնում են յեռացող ջրով կաթսայի մեջ (պատերիզացիա) մինչև 70—80 աստիճան ըստ Յելսիուսի:

7. Իրանից հետո խոտաջուրը պաղեցնում են մինչև 36—38 աստիճան ըստ Յելսիուսի, այսինքն՝ մինչև հորթերին տրվող անքաշ կամ յերեսը քաշած կաթի շերմության աստիճանը:

Տաքության աստիճանը բոլոր դեպքերում վորոշվում է միայն շերմաչափով:

8. Պաղեցնելու ժամանակ խոտաջրի վրա ավելացնում են սովորական աղ, հաշվելով մոտավորապես 10 լիտր խոտաջրին 10 գրամ:

Այս ձևով պատրաստված խոտաջուրը համարվում է միանգամայն պատրաստ և նրանով կարելի յե կերակրել հորթերին:

9. Լավ, այլատեսակ կամ տարբեր տեսակ բույսերից բաղկացած խոտից (разнотравное сено) պատրաստված խոտաջուրը լինում է մուգ-դարչնագույն, ունենում է թարմ ծաղկավետ խոտի հոտ և հաճելի դառնավուն համ. Խոտաջրի գույնի թուճոգ լինելը կախված է խոտի վորակից և ճիշտ պատրաստելուց:

10. Պատրաստված խոտաջուրն ոգտագործվում է միայն մի ուրվա ընթացքում, յերկրորդ ուրը պահել վոչ մի դեպքում չի թուլատրվում, վորովհետև նա արագ կերպով փչանում է:

11. Խոտաջուր պատրաստելու ընթացքում ստացվող շանչը գործածվում է վորպես կեր՝ կաթնատու անասունների համար:

12. Խոտաշուր պատրաստելու ընթացքում հատուկ ուշադրութիւն պետք է դարձնել ամանի մաքրութեան վրա, խնամքով պետք է լվալ այն և չորացնել: Խորհուրդ չի տրվում գործածել փայտե ամանեղեն (կիսատակառ և այլն):

3. ԽՈՏԱՂԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

13. Լավ վորակի խոտաշուրը պետք է տալ հորթերին վորպես լրացուցիչ կեր՝ նրանց 21 որական հասակից: Ավելի փոքր հասակում գործածել խորհուրդ չի տրվում:

14. Հորթերին առաջին որերը խոտաշուր պետք է տալ քիչ-քիչ (որական քառորդ լիտր) և աստիճանաբար ավելացնել: Խոտաշուրը հորթին տրվում է անքաշ կամ լերեսը քաշած կաթի հետ խառնած:

15. Բոլոր հորթերին հավասար քանակութեամբ խոտաշուր չի կարելի տալ: Հորթերին կերակրելիս պետք է խիստ կերպով անհատական մոտեցում ունենալ յուրաքանչյուր հորթին՝ հաշվի առնելով նրա ախորժակը, առողջութիւնը, կենդանի քաշը և այլն:

16. Մեկ ամսական հորթին կարելի յե տալ որական մոտավորապես մինչև 0,75—1 լիտր խոտաշուր, լերկու ամսական հորթին՝ մինչև 3—3,5 լիտր:

Յերրորդ ամսի վերջին լերեսը քաշած կաթն աստիճանաբար պակասեցվում է, իսկ խոտաշուրն աստիճանաբար ավելացվում է: 5—6 ամսական հասակում, յերբ հորթն ախորժակով ուտում է չոր և թարմ խոտ, խոտաշուր տալը կարելի յե դադարեցնել:

Հորթերին խոտաշուր խմեցնելու դեպքում խիստ կերպով պետք է հետևել, վորպեսզի նրանց փորը շատ չմեծանա, մի բան, վոր հաճախ առաջ է գալիս մեծ քանակութեամբ հեղուկ և մեծածավալ կեր տալուց:

17. Հորթին տրվող խոտաշորի ջերմութիւնը պետք է

անպայման լինի նույնը, ինչվոր անքաշ կամ լերեսը քաշած կաթինը, այսինքն՝ սկզբնական ժամանակաշրջանում 36—38 աստիճան ըստ Յելսիուսի:

Խոտաշուրը չի փոխարինում խոտին և վոչել յեռացրած և պողեցրած մաքուր ջրին. ջուր կարելի յե տալ հորթերին կաթ տալը կրճատելու մոմենտից:

Խոտաշուր տալու ամբողջ ժամանակաշրջանում հորթը պետք է ստանա իր հասակի և քաշի համար անհրաժեշտ կաթի լրիվ նորման:

18. Մինչև 5 ամսական հասակը լրանալը հորթերին կարելի յե տալ յուրաքանչյուր գլխին 400—600 լիտր խոտաշուր՝ անպայման հաշվի առնելով, ինչպես արդեն նշվեց, յուրաքանչյուր հորթի առանձնահատկութեանները:

19. Հորթերի աճեցման վերաբերյալ զոռկանոներով և հրահանգով նախատեսված բոլոր մնացած կանոնները, վորոնք վերաբերում են նրանց կերակրմանը, խնամքին և պահպանմանը, խոտաշուր տալու դեպքում ևս մնում են ուժի մեջ:

Հավելված. — Հորթերին խոտաշուր խմեցնելու սքեման:

Հարբերին կերակրելու (кормление) սենյան՝ որական 1200 գրամ միջին անի դեպքում

Հասակն ամիսներով	Հասակն օրերով	Գաթ	Հիտերով			Գիլոգրամներով			Սրբատապարուզներ	Սիլոս
			Յեղեղ	Քաղցր կաթ	Ռոտաջուր	Վարակի արևիք	Քուսոց	Քիֆ		
1 ամիս	1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
16—20	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
21—25	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
26—30	9,0	1,5	0,5	0,30	—	—	0,35	—	—	
2 ամիս	31—35	8,0	2,0	1,25	0,40	—	—	0,40	—	—
	36—40	5,5	3,0	3,0	0,60	—	—	0,65	—	—
	41—45	3,5	5,0	3,0	0,75	—	—	0,95	—	—
	46—50	1,75	7,0	3,0	0,90	—	—	1,1	—	—
	51—55	—	9,0	3,0	1,2	—	—	1,85	—	—
	56—60	—	10,0	3,5	1,2	—	—	1,4	—	—
3 ամիս	61—65	—	10,0	3,5	1,2	—	—	1,45	—	—
	66—70	—	11,0	4,0	1,2	—	—	1,45	—	—
	71—75	—	10,0	5,0	1,6	0,15	—	1,45	—	—
	76—80	—	9,0	5,5	1,3	0,20	—	1,5	—	—
	81—85	—	8,0	6,0	1,3	0,25	—	1,55	—	—
	86—90	—	8,0	6,0	1,3	0,35	0,10	1,55	—	—
4 ամիս	91—95	—	7,0	7,0	1,4	0,40	0,10	1,55	0,5	—
	96—100	—	7,0	7,0	1,4	0,50	0,15	1,60	0,5	—
	101—105	—	6,0	8,0	1,4	0,50	0,25	1,60	1,0	—
	106—110	—	5,0	8,0	1,5	0,50	0,30	1,7	1,5	—
	111—115	—	5,0	8,0	1,5	0,50	0,30	1,7	2,0	—
	116—120	—	4,0	8,0	1,5	0,60	0,40	1,8	2,0	—
5 ամիս	121—125	—	3,0	—	1,5	0,60	0,40	1,8	2,0	0,5
	126—130	—	2,5	—	1,5	0,70	0,40	2,0	2,0	0,5
	131—135	—	2,0	—	1,6	0,70	0,50	2,1	2,5	0,5
	136—140	—	2,0	—	1,6	0,70	0,60	2,2	2,75	0,5
	141—145	—	2,0	—	1,6	0,80	0,60	2,2	3,0	1,5
	146—150	—	1,0	—	1,6	0,80	0,60	2,3	3,0	2,0
6 ամիս	151—155	—	—	—	1,6	0,80	0,70	2,4	3,75	2,75
	156—160	—	—	—	1,5	0,90	0,70	2,4	4,5	3,0
	161—165	—	—	—	1,5	0,90	0,70	2,4	4,5	3,0
	166—170	—	—	—	1,5	0,90	0,70	2,4	4,5	3,5
	171—175	—	—	—	1,4	0,90	0,80	2,4	5,0	3,75
	176—180	—	—	—	1,4	0,90	0,80	2,4	5,0	4,5
Ընդամենը		366,3	700,0	467,5	199,75	67,75	45,5	260,5	269,0	152,5

Հարբերին կերակրելու (кормление) սենյան՝ որական 800 գրամ միջին անի դեպքում

Հասակն ամիսներով	Հասակն օրերով	Գաթ	Յեղեղ քաղցր կաթ	Ռոտաջուր	Հիտերով			Գիլոգրամներով			Սրբատապարուզներ	Սիլոս	
					Վարակի արևիք	Քուսոց	Քիֆ	Սոս	Վարակի արևիք	Քուսոց			Քիֆ
1 ամիս	1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6—10	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11—15	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16—20	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21—25	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26—30	6,5	1,0	0,75	0,15	—	—	—	—	—	0,20	—	—	
2 ամիս	31—35	5,0	2,0	1,5	0,25	—	—	—	—	—	0,35	—	—
	36—40	4,0	3,0	2,0	0,35	—	—	—	—	—	0,40	—	—
	41—45	2,75	4,0	2,5	0,50	—	—	—	—	—	0,55	—	—
	46—50	1,5	5,0	3,0	0,60	—	—	—	—	—	0,75	—	—
	51—55	—	6,0	3,0	0,85	—	—	—	—	—	0,05	—	—
	56—60	—	7,0	3,0	0,85	—	—	—	—	—	0,05	—	—
3 ամիս	61—65	—	8,0	3,0	0,85	—	—	—	—	—	1,5	—	—
	66—70	—	9,0	3,0	0,85	—	—	—	—	—	0,05	—	—
	71—75	—	8,0	4,0	0,90	0,10	—	—	—	—	1,10	—	—
	76—80	—	7,0	5,0	0,90	0,20	—	—	—	—	1,2	—	—
	81—85	—	6,0	5,0	0,95	0,20	—	—	—	—	1,2	—	—
	86—90	—	5,0	5,5	0,95	0,20	0,10	—	—	—	1,3	—	—
4 ամիս	91—95	—	5,0	6,0	0,95	0,25	0,15	1,3	—	—	0,5	—	—
	96—100	—	4,0	6,0	0,95	0,30	0,20	1,3	—	—	1,0	—	—
	101—105	—	3,0	7,0	1,00	0,30	0,25	1,3	—	—	1,5	—	—
	106—110	—	3,0	7,0	1,10	0,30	0,25	1,3	—	—	2,0	—	—
	111—115	—	3,0	7,0	1,10	0,40	0,25	1,3	—	—	2,0	—	—
	116—120	—	2,0	7,0	1,20	0,40	0,30	1,4	—	—	2,0	—	—
5 ամիս	121—125	—	2,0	—	1,20	0,40	0,30	1,4	—	—	2,0	0,5	—
	126—130	—	2,0	—	1,30	0,50	0,30	1,4	—	—	2,0	0,5	—
	131—135	—	1,5	—	1,30	0,50	0,30	1,4	—	—	2,5	0,5	—
	136—140	—	1,5	—	1,30	0,50	0,40	1,5	—	—	2,5	1,0	—
	141—145	—	1,0	—	1,20	0,60	0,40	1,5	—	—	2,5	1,5	—
	146—150	—	1,0	—	1,20	0,60	0,40	1,7	—	—	2,5	2,0	—
6 ամիս	151—155	—	—	—	1,10	0,70	0,50	1,7	—	—	2,5	3,0	—
	156—160	—	—	—	1,0	0,70	0,50	1,8	—	—	2,5	3,0	—
	161—165	—	—	—	1,10	0,70	0,50	1,8	—	—	3,0	3,0	—
	166—170	—	—	—	1,10	0,70	0,50	1,9	—	—	3,0	3,0	—
	171—175	—	—	—	1,10	0,70	0,50	1,9	—	—	3,0	3,5	—
	176—180	—	—	—	1,10	0,70	0,50	1,9	—	—	3,5	3,5	—
Ընդամենը		268,75	500,0	407,5	146,75	50,0	33,0	195,0	202,5	125,0			

Հորքերի կերակրելու (выпощка) սեման՝ որակամ 1000 գրամ միջին ամի դեպքում

Կատարվող աշխատանք	Հասակը որերով	Քաշը	Ներքին		Մարմնի զանգվածը	Մարմնի զանգվածը	Խոտ	Քիթ	Սոս	Մրմարապտուղներ	Սիլիկ
			Ներքին	Ներքին							
1 >	1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	9,5	—	0,25	—	—	—	—	—	—	—
	26—30	8,0	1,5	0,5	0,18	—	—	—	0,9	—	—
2 >	31—35	7,0	2,0	0,75	0,80	—	—	0,5	—	—	—
	36—40	6,0	3,0	2,0	0,35	—	—	0,5	—	—	—
	41—45	4,0	5,0	2,0	0,50	—	—	0,75	—	—	—
	46—50	1,5	7,0	3,0	0,70	—	—	0,95	—	—	—
	51—55	—	8,0	3,0	0,90	—	—	1,0	—	—	—
	56—60	—	8,0	3,5	0,97	—	—	1,2	—	—	—
3 >	61—65	—	9,0	3,5	0,97	—	—	1,2	—	—	—
	66—70	—	10,0	4,0	1,05	—	—	1,2	—	—	—
	71—75	—	8,0	5,0	1,10	0,1	—	1,3	—	—	—
	76—80	—	7,0	5,5	1,20	0,2	—	1,35	—	—	—
	81—85	—	7,0	6,0	1,20	0,25	—	1,4	—	—	—
	86—90	—	6,0	6,0	1,30	0,25	0,1	1,4	—	—	—
4 >	91—95	—	5,0	7,0	1,30	0,3	0,15	1,4	0,5	—	—
	96—100	—	5,0	7,0	1,30	0,3	0,15	1,45	1,25	—	—
	101—105	—	5,0	8,0	1,30	0,4	0,25	1,45	1,25	—	—
	106—110	—	4,0	8,0	1,30	0,45	0,3	1,45	1,25	—	—
	111—115	—	4,0	8,0	1,40	0,45	0,4	1,5	1,5	—	—
	116—120	—	3,0	8,0	1,40	0,5	0,45	1,5	1,5	—	—
5 >	121—125	—	3,0	—	1,40	0,5	0,50	1,65	1,5	0,5	—
	126—130	—	3,0	—	1,45	0,55	0,6	1,65	1,5	0,8	—
	131—135	—	2,0	—	1,45	0,6	0,7	1,7	1,5	1,0	—
	136—140	—	2,0	—	1,45	0,65	0,6	1,75	2,0	1,5	—
	141—145	—	1,5	—	1,45	0,75	0,6	1,95	3,0	2,0	—
	146—150	—	1,0	—	1,50	0,80	0,6	2,1	3,0	2,0	—
6 >	151—155	—	—	—	1,50	0,80	0,55	2,1	4,0	3,0	—
	156—160	—	—	—	1,45	0,85	0,45	2,2	4,0	3,0	—
	161—165	—	—	—	1,40	0,90	0,45	2,2	4,0	3,0	—
	166—170	—	—	—	1,40	0,90	0,45	2,2	5,0	3,5	—
	171—175	—	—	—	1,40	0,85	0,45	2,5	5,5	4,5	—
	176—180	—	—	—	1,35	0,85	0,4	3,0	5,5	5,5	—
Ընդամենը		327,0	600,0	455,0	180,0	60,0	40,75	234,0	239,0	151,5	

Քարգանիչ՝ Խ. Բարսեղյան
 Խմբագրեցին՝ Պ. Սարգսյան, Նշ. Մալաթյան
 Տեխ. խմբագիր՝ Վ. Ալեքյան
 Սրբագրիչ՝ Գ. Հակոբյան
 Գլավիտի լիազոր № 1081
 Հրատ. № 356, տիրած 2000, պատվեր № 504
 Հանձնվել է արտագրության 1936 թ. հուլիսի 17-ին
 Ստորագրված է տպագրելու 1936 թ. սեպտեմբերի 1-ին
 3/4 տպ. թերթ, մեկ տպ. թերթում 39720 տպ. նշ.

Ֆյուզիբատի տպարան, Յերևան, Նալբանդյան № 11



557

37+



И н с т р у к ц и я
по приготовлению и применению
сенного настоя (отвара) при
выпойке телят

СВЪЛХОВЪИЗ

1006

ӨРИВАНЪ

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0301149

22.086