

0 1 OCT 2010

ՀԱՅԷԼ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ — ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՅԻՆ ՎԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐՏՈՔԻԼԻ

ՖԵՎ.

ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ

(Հաստատված ՀՍԽՀ Հոգծողկոմ
Վ. Մամիկոնյանի կողմից)

635

4.36



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՅԻՆ ՎԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ

Կ Ա Ն

1935

20 MAY 2013

20417

ԿԱՐՏՈՓԻԼԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ

635
4-36

պ.

1. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԱԽԱԳԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԲԸ.

1. Կարտոֆիլը պետք է մշակել ավազախառն թեթև, բերրի և պարարտ հողերում:


2. Այն տեղերում, վորտեղ կարտոֆիլը մտնում է ցանքաշրջանառութիան մեջ, անհրաժեշտ է կարտոֆիլին հատկացնել միամյա (վիկա, քուրուշնա, շամբալա), բազմամյա՝ (աովույտ, կորնգան, յերեքնուկ), խոտաբույսերից, ընդեղեններից (լոբի, սիսեռ, վոսպ) և պարարտացրած հացաբույսերից ազատված հողամասեր:

3. Կարտոֆիլի ցանքը կատարել մասսիվ հողակտորներով:

4. Այն հողամասերը, վորտեղ ցանված կարտոֆիլը 1934 թ. վարակված է յեղել առողաձև — փոշիացող քուս (парша парша) հիվանդությամբ՝ 3—5 տարի տևողությամբ կարտոֆիլ չմշակել, ոչտադործել այդ հողերն առկա հիվանդությունների համար:

3355
1007
33033
1772
1778

5046
4146



Իմրազիլ՝ Ս. Խաչատրյան.

Վոհաբան՝ Արթ. Գրիգորյան

Իմրազիլ՝ Պ. Սարգսյան.

Սրբադեբի՝ Ի. Տ. Մովսիսյան

Թույլատրված է. Գլավլիտի լիազոր № 630

Հանձնված է արտադրության 1934 թ. դեկտեմբերի 25-ին

Ստորագրված է տպագրելու 1935 թ. հունվարի 1-ին

Հրատ. № 159

Տիբրաժ 2000

Գառվեր № 745

Ֆերեան. Գյուղհրատի տպարան, Նալբանդյան 50

5. Կարտոֆիլի մշակման համար հատկացնել աշնանից խոր հերկած (20—22 սանտիմ.) հողամասեր. գարնանը խաչադիր կատարել 10—12 սանտիմ. խորութեամբ կրկնավար, փոքից հետո փոցխել՝ կոշտոտ հողերում ափսեավոր, իսկ մնացած տեղերում զիգզագ փոցխերով:

6. Որգանական պարարտանյութերից (նա-
յած հողամասի զբոլթյան) յուրաքանչյուր հեկ-
տարին պետք է տալ գոմաղբ 25—30 տոնն,
կամ խառնաղբ (տնային թափթփուկներ, գոմաղ-
բի մոխրի խառնուրդ) 15—20 տոնն, կամ մո-
խիր՝ 6—8 տոնն: Այն դեպքում, յերբ տնտեսու-
թյունը գործ է ածում հանքային պարարտա-
նյութ, անհրաժեշտ է հեկտարին տալ ազոտա-
յին պարարտանյութերից (ցիանամիտ, սելիտրա)
1,5-ից. 2,5 ցենտներ, ֆոսֆորային (սուպեր-
ֆոսֆատ) կալիումի և կրային պարարտանյութե-
րից՝ 3—4 ցենտներ: Թարմ զբոլթյամբ գոմաղբը
պետք է տալ աշնանը խոր վար կատարելուց
առաջ. կիսափտած կամ փտած վիճակում՝ գարնա-
նը կրկնավարից առաջ: Հանքային պարարտա-
նյութերից վորոշ տեսակներ (սելիտրա, սուպեր-
ֆոսֆատ) պետք է տալ գարնանը փոցխելուց
առաջ:

7. Բոլոր տեսակի պարարտանյութերը պետք է
պահել անձրևներից, հեղեղումներից ապահով տեղ:

2. ՍԵՐՄԱՑՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՏՐԱՍՏՈՒՄԸ.

1. Սերմացվի համար ոգտագործելիս ան-
հրաժեշտ է պահված սերմացու—կարտոֆիլից
ջոկել առողջ, միջին մեծութեան (50—140 գրա-
մանոց) պալարները, իսկ մնացած կարտոֆիլն
ոգտագործել այլ կերիքների համար:

2. Յերբ սերմացուն տնկելիս ծլած է, պետք է
զգուշ լինել, վոր տնկելիս մատղաշ ծիղերը չխաավեն:

3. Արգելվում է աստղաձև—փոշիացող քո-
սով վարակված կարտոֆիլին իբրև սերմացու ոգ-
տագործել:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Այն դեպքում, յերբ 5
%-ից ավելի չի վարակված, պետք է
սերմացուն ախտահանել ֆորմալինի
0,13 տոկոսանոց լուծույթով: Լուծույ-
թը պատրաստելու համար վերցնել
0,40 0%-անոց ֆորմալինից մեկ լիտր
լուծել 300 լիտր մաքուր ջրի մեջ,
այնուհետև պարկերի մեջ լցրած վա-
րակված սերմացուն 3—5 րոպե պահել
լուծույթի մեջ, վորից հետո վորևե
ծածկոցով (փալատով, խսիրով) ծածկել
2—3 ժամ և հետո ոգտագործել ցա-
նելու համար: Խստիվ արգելել ախտա-
հանված սերմացուն սպառման կարիք-
ների համար ոգտագործելը:

4. Նախքան կարտոֆիլ ցանելը սերմացուն պետք է փոխել 1—2 օր՝ 20—25 սանտիմ. բարձրութեամբ և թառամեցնել:

3. ՏՆԿՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. Տվյալ գյուղում կարտոֆիլի ցանքն սկսել գարնանացանի հացահատիկային կուլտուրաների մասսայական ցանքի հետ միատեղ: Մոտավոր ժամկետներ—Ախտայի, Աղբաբայի, Աբարանի, Մարտունու, Բայազետի, Փաշալվի և Սիսիանի շրջանների համար՝ ապրիլի 15-ից, Արթիկի, Բասարկեչարի, Գորիսի, Դիլիջանի, Ղարաբեյլիսայի, Ստեփանավանի, Լենինականի և Թալինի շրջանների համար՝ ապրիլի մեկից, իսկ մնացած շրջաններում տնկման աշխատանքները պետք է սկսել մարտի 15-ից:

2. Կարտոֆիլի տնկելու խորությունը կախված է ցանելու ժամկետից, պալարի մեծությունից, կլիմայական և հողային պայմաններից, այն է՝ յերբ ցանքը կատարվում է վաղ, դորձ են ածվում մանր պալարներ, յերբ հողամասը խոնավ է պետք է տնկել 7—9 սանտիմ. խորութեամբ, հակառակը—ուշացած ցանքի խոշոր պալարներ ոգտագործելու դեպքում և չոր պայմաններում խորությունը՝ 10—12 սանտիմ.:

3. Նայած կարտոֆիլի տեսակին, կշռին, հողամասի մեքենայացման հնարավորություննե-

րին, սերմացվի նորման պետք է վերցնել հետևյալին 17—22 ցենտ.: Ցանքը կատարելիս միջաբային տարածությունը պետք է լինի 60—80 սմ., իսկ հեռավորությունը՝ 40—55 սմ.:

4. Այն տեղերում, վորտեղ կան կարտոֆիլ տնկող մեքենաներ, տնկելու աշխատանքները պետք է կատարել մեքենայով, իսկ մնացած դեպքերում՝ արորով կամ գութանով:

5. Զափազանց խոնավ հողերում կարտոֆիլի ցանքը կատարել ժապավենաձև:

4. ԿԱՐՏՈՓԻԼԻ ԽՆԱՄԲԸ ՅԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ.

1. Կեղևակալող, կավային ծանր հողերում կարտոֆիլի մատղաշ թփի դուրս գալը հեշտացնելու համար, մինչև ծիլերի յերևալը, 3—5 սմ. խորութեամբ զիգզազով 1—2 յերես փոցխել. այդ աշխատանքը կրկնել, յերբ թուփը 3—5 սանտիմ. բարձրություն ունի:

2. Քաղհանի և փխրացման աշխատանքները կատարել վոչ պակաս յերկու անգամ, առաջինը, յերբ թուփն ունի 10—15 սանտիմ. բարձրություն (մոտավորապես 1—15 մայիսի), յերկրորդ քաղհան-փխրացումը կատարել առաջին քաղհան-փխրացումից 10—12 օր անցնելուց հետո:

3. Բուկ լցնելը կամ վարը դնել, յերբ կարտոֆիլի թուփն ունի 18—20 սանտիմ. բարձրու-

թյուն (մոտավորապես մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 10-ը), առաջին բուլը լցնելուց 8—10 որ հետո կատարել լրացում:

4. Մշակության հետ կապված հիմնական աշխատանքները, քաղհան-փխրացումը, բուլը տալ, վար դնել և այլն, պետք է ավարտել մինչև կարտոֆիլի ծաղկումը:

5. Զրարբի հողամասերում առաջին ջուրը տալ անկելուց մոտավորապես 35—40 որ անց. ջրելու հետագա աշխատանքները (2—5-րդ) կատարել բոտ պահանջի: Բերքահավաքից 25—30 որ առաջ դադարեցնել ջրելու աշխատանքը:

6. Սիլոս պատրաստելու կամ թուփն իբրև անասունի կեր ոգտագործելու համար (յեթե կարտոֆիլի թուփը վարակված չէ ֆիտոֆտորայով), հնձել թուփը բերքահավաքից 10—15 որ առաջ:

5. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

1. Ֆիտոֆտորա (սև փտում) նկատելիա թուփը, հուլիս—ոգոստոս ամսում, սրսկել 1,25 տոկոսանոց բորդոյան հեղուկով: Վերցնել 5 կիլոգրամ պղնձի արջասպ, 6—8 կիլոգրամ կիր և 400 լիտր ջուր, մեկ հեկտարին գործադրել այդ լուծույթից 42—48 դուլլ: Բերքահավաքից 8—10 որ առաջ ամբողջությամբ հեռացնել և այրել վարակված թփերը:

2. Թփի այլ հիվանդություններ (տերևների

կուշ գալ, վաղաժամ դեղնություն) յերևալու դեպքում անմիջապես հավաքել վարակված տերևներն ու ցողունները:

6. ԲԵՐՔԱՀԱՎԱԿԸ ՅԵՎ ԱՄԲԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՂԱՏՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ.

1. Բերքահավաքից մեկ ամիս առաջ ավարտել կարտոֆիլի ամբարման համար ոգտագործվող պահեստների, ամբարների, նիււղների, ոգանցքների և տարայի վերանորոգման ու ախտահանման աշխատանքները: Բուրգային պահպանման դեպքում պահվող սերմացվի քանակի 3—5 տոկոսի չափով, նախորոք պատրաստել չոր ծղնոտ:

2. Բերքահավաքի անմիջական աշխատանքներն սկսել այն ժամանակ, յերբ թուփն սկըսում է դեղնել, թառամել և ամբանում է կարտոֆիլի մաշկը: Լեռնային շրջաններում բերքահավաքի գործնական աշխատանքներն սկսել սեպտեմբերի վերջից մինչև հոկտեմբերի 20-ը, նախալեռնային շրջաններում՝ սեպտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 20-ը: Մնացած շրջաններում այդ աշխատանքն ավարտել մինչև հոկտեմբերի 15-ը: Բերքահավաքի տևողությունը պետք է լինի 15—20 որ:

3. Սերմացվի համար նախատեսված ցանքերի բերքահավաքը կատարել մասսայական բերքահավաքի վերջին ուղերում:

4. Այն տեղերում, վորտեղ կան կարտոֆիլ քանդող մեքենաներ, քանդելու աշխատանքը կատարել մեքենայով, իսկ մնացած դեպքերում՝ բաներով, արորով կամ գուլթանով:

5. Սերմացվի համար առողջ պալարների ընտրությունը ըստ մեծության և գույնի պետք է կատարել հենց դաշտում, բերքահավաքի հետ գուլթնթաց, անհրաժեշտության դեպքում, մինչև պահ տալը, կրկնել գյուղում:

6. Համատարած բերքահավաքից հետո, արորի կամ փոցխի միջոցով դաշտում կատարել մնացած պալարների կրկնակի հավաք:

7. Տեղափոխման աշխատանքները կատարել նախորոք պատրաստած և հարմարեցրած տարայով և փոխադրական միջոցներով: Արգելել կարտոֆիլի տեղափոխման ընթացքում ոգտադործելու մետաղյա վերջավորություն ունեցող գործիքներ:

7. ԱՄԲԱՐՈՒՄ.

1. Սերմացվի համար նախատեսված կարտոֆիլն ամբարել առանձին, իսկ սպառման կարիքների համար առանձին:

2. Արգելել կարտոֆիլի պահեստներում, նկուղներում և բուրգերում պահելու գյուղատնտեսական այլ մթերքներ (հացահատիկ, բանջարեղեղեն, արմատապտուղ), շուտ խոնավացող նյութեր (աղ, հանքային պարարտանյութ) և գյուղատնտեսական ինվենտար ու գործիքներ:

3. Մինչ ամբարումն անհրաժեշտ է սերմացուն փոել և ցամաքացնել:

4. Սերմացուն ամբարել պահեստներում, մառաններում և զեանափոր բուրգերում:

5. Ամբարումից 5—10 որ առաջ ստուգել և կարգի բերել ունեցած պահեստներն ու նկուղները և ավարտել բուրգերի կառուցումը:

6. Պահեստները, ամբարները և բուրգերը պետք է ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ ողափոխող խողովակներով:

7. Պահեստները, նկուղները, ինչպես և բուրգերը պետք է ունենան առանձին ջերմաչափեր: Կարտոֆիլ պահելու վայրերը պետք է ունենան 1—3 աստիճան տաքություն:

8. Ամբարները և բուրգերն ընտրել և կառուցել ստորերկրյա ջրերից ապահով տեղում: Վերջիններիս շուրջը 30—40 սանտիմ. լայնությամբ և 20—25 սանտիմ. խորությամբ ջրաբառովակներ պատրաստել:

9. Կարտոֆիլի պահպանման ամբողջ ժամանակաշրջանում պարբերաբար ստուգում կատարել:

10. Պահված սերմացվի վիճակը և զբությունը պարզող առանձին տետրեր ունենալ և կանոնավոր գրանցումներ կատարել:

11. Նշանակել կարտոֆիլի ձմրան պահպանման անմիջական պատասխանատու անձնավորություններ թե՛ կոլտնտեսություններում և թե՛ շրջաններում:

ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱԳՐՈՎԱՆՈՆՆԵՐ.

1. ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՅԵՎ ՅԱՆՔԸ.

1. Շաքարի ճակնդեղի ամենալավ նախորդները հանդիսանում են լոբազգի բույսերը և միամյա խոտաբույսերը, ընդեղենները, աշնանացանը և ցեխերը:

2. Շաքարի ճակնդեղի բարձր բերքն ապահովելու համար ամբան և աշնան հերկն առաջին հերթին պետք է հատկացնել շաքարի ճակնդեղին:

3. Այն կոլտնտեսություններում, վորտեղ կիրառված է ցանքաշրջանառությունը, վորպես կանոն, ճակնդեղի ցանքը պետք է տեղավորել իր տեղում:

4. Վաղ գարնան դաշտ դուրս գալուն պես աշնանահերկն անմիջապես փոցխել զիգզագ փոցխով յերկու յերես և այդ աշխատանքը վերջացնել յերկու-յերեք օրում:

5. Յանքից առաջ կատարել յերեսվար (կուլտիվացիա) 8—10 սանտիմետր խորությամբ բազմախոփանի գծվածով՝ նախորոք հանելով գոլթանի թերն ու անմիջապես փոցխել:

6. Ճակնդեղի հողի նախացանքային մշակումը և ցանքն սկսել հացահատիկային կուլտուրաների մաստայական ցանքն սկսելուց 3—4 օր հետո և ավարտել 7 բանվորական օրում:

7. Հողը պարարտացնել սուպերֆոսֆատով, մեկ հեկտարին տալով 2,5 մինչև 3 ցենտներ:

8. Յանքը կատարել շաքարացան և մեկ հեկտարին ցանել 30 կիլոգրամ սերմ: Վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում ցանքը կատարել առանց սերմ ստուգող լաբորատորիայի սերմի վորակը հաստատող փաստաթղթի:

9. Յանքի խորությունը սահմանել ծանր հողերում՝ 3 սանտիմետր, իսկ թեթև հողերում 4 սանտիմետրից վոչ պակաս խորությամբ:

2. ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ.

1. Շաքարի ճակնդեղի ծիւերն յերևալուն պես, առանց սպասելու լրիվ ծլելուն, անմիջապես շաքերի մեջ կատարել շարովկա (մակերեսային փխրացում) և այդ աշխատանքները վերջացնել 4—5 օրում:

2. Շարովկայից անմիջապես հետո, ճակնդեղի յերկու իսկական տերկները յերևալուն պես, կատարել նոսրացում 18 սանտիմետր հե-

ռափորության վրա թողնելով ուժեղ և առողջ բույսեր: Այս աշխատանքները վերջացնել 10 որում:

3. Նոսրացման աշխատանքները վերջացնելուց հետո կատարել ստուգում և այդ աշխատանքներն ավարտել ուժ բանվորական որում:

4. Առաջին ջուրը տալ ստուգումից անմիջապես հետո-հունիսի առաջին տասնորյակում և այդ աշխատանքներն ավարտել 10 որում: Զրելուց 3—4 որ հետո շարքերի մեջ կատարել փխրացում և քաղհան:

5. Յերկրորդ ջուրը տալ հունիսի վերջին և ավարտել 10 որում: Զրելուց 3—4 որից հետո շարքերի մեջ կատարել փխրացում և քաղհան:

6. Յերրորդ ջուրն սկսել 2-րդ ջրից 20—25 որ հետո և ավարտել 10 բանվորական որում: Զրելուց 3—4 որ հետո կրկին փխրացում կատարել:

7. Չորրորդ ջուրը, անհրաժեշտության դեպքում, կատարել 3-րդ ջրից 20 որ հետո: Ճակնդեղի մշակման աշխատանքների ժամանակ լրիվ ոգտագործել ձեռքի պլանետները և ձիու կուտիվատորները:

3. ԲԵՐՔԱՀԱՎԱԲ.

1. Ճակնդեղի բերքահավաքն սկսել հոկտեմբերի սկզբից և ավարտել 15 բանվորական որում:

2. Ճակնդեղի արմատները մաքրել հողից, կարել արմատի սուր ծայրը, տերևներն արմատից կտրել կոնաձև և առանց մաքրելու մեկ որից ավել չթողնել:

3. Մաքրած ճակնդեղն անմիջապես կույտ դարսել 5—6 ցենտների չափով և ծածկել հողի բարակ շերտով:

4. Ճակնդեղի տեղափոխումն ավարտել հոկտեմբերի 25-ին:



291



Агроправила по обработке картофеля
и сахарной свеклы.

Сельхозгиз

1935

Эривань

«Ագգային գրադարան»



NL0293762

20717