

№ 757

С 1926 № 548

ԻՆՉՊԵՍ ԸՆՏՐԵԼ ԿԱԹՆԱՌԱՏ ԿՈՎ



БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Академии Наук
СССР

637.1
U-58

ԽՍՀՄ ԺՈՂՈՎՈՐԴԻՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐ. ՀՐԱՏԱՐԱԿԶՈՒԹՅՈՒՆ
Մ Ո Ս Կ Վ Ա

1926

N 457

C1926 4548
24 SEP 2010

U
Ca 2073

ԱՆԱՄՆԱԲՈՒՅԺ Բ. Լ. ՍԿՈՄՈՐՈՆՈՎ,

637.1

U-58

ԻՆՉՊԵՍ ԸՆՏԻԵԼ

ԿԱԹՆԱՌԱՏ ԿՈՎ

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Академии Наук
СССР

ԽՍՀՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՁՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈՍԿՎԱ

1926

Напечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий“: Москва,
Пименовская ул., д. № 16,
в количестве 4000 экз.
Главлит № 54309.



56159 - 66

ԻՆՉՊԵՍ ԸՆՏՐԵԼ ԿԱԹՆԱՌԱՏ ԿՈՎ

Կով գնելիս—կաթնառատ, լավ կով ընտրելը
դժվար գործ է: Ի՞նչ նշաններից կարելի յե իմա-
նալ՝ կաթնառատ յե կովը, թե՞ վոչ: Բիշ փորձ-
ված գնողները սովորաբար հենց այդ բանը չեն
իմանում: Դրանից ոգտվում յեն ծախողները և
ամեն կերպ աշխատում առնողին խաբել:

Այդպիսի դեպքերում հաճախակի նրա ուշա-
դրությունը դարձնում յեն կովի կաթնառատու-
թյան այն նշանների վրա, վորոնք իսկապես ուշա-
նակություն չունեն:

Այս գրքույկում ամենաանհրաժեշտ խորհուրդ-
ներն ու ցուցմունքներն յեն բերված: Ինչպես
պետք է դիտել կովը և ընտրության ժամանակ
ամենից շատ ինչ բանի վրա յե հարկավոր ուշա-
դրություն դարձնել:

Կով գնելիս ամենից առաջ անհրաժեշտ է. 1)
վորոշել (հորթածնության թվով) կովի հասակը,
2) իմանալ, ի՞նչպես է նրա առողջությունը և
3) կարգի՞ն է ծիծը—արդյոք նա լիովին առողջ
է, չկա՞ն նրա մեջ կոշտացած տեղեր կամ ու-
ռուցքներ, արդյոք ծիծը և պտուկները արատ-

ներ և պակասություններ չունեն: Միայն զբանից հետո արդեն կարելի յե այն նշանների վրա կանգ առնել, վորոնցով ընդունված ե իմանալ կովի կաթի առատությունը:

Հետո՝ կաթնառատ կով ընտրելիս աչքի առաջ պետք ե ունենալ, վոր կովերի կաթնառատությունը ժառանգական ե լինում: Այդ նշանակում ե, վոր յեթե կովը կաթնառատ ծնողներից ե, ապա կարելի յե ավելի շուտ և անսխալ ընտրել իսկապես կաթնառատ կով: Կաթնառատ կովերի ամբողջ ցեղեր և սերունդներ կան, վորոնց կաթնառատությունը մի սերնդից մյուսին ե անցնում: Բայց միևնույն ժամանակ պետք ե հիշել, վոր կաթնառատ կովերի ցեղերի և լավ ծնողներից ծնած կովերի մեջ պատահում յեն այնպիսիները, վորոնք քիչ կաթ յեն տալիս: Յեվ ընդհակառակը, կարելի յե շատ կաթնառատ կովերի պատահել մեր գյուղական նախնիների «անցեղ» կովերի մեջ:

ԻՆՉԻՅ Ե ԿԱՆՎԱԾ ԿՈՎԻ ԿԱԹՆԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ամենագլխավորն այն ե, վոր կովի ծիծր բավականաչափ ուժեղ զարգացած պիտի լինի: Ծիծը կաթի գործարանն ե: Կովի կաթնառատության վրա մեծ ազդեցություն ունի նույնպես նրա հասակը: Շատ ղեպքերում ստուգված ե,

վոր կովերի ամենաշատ կաթնառատությունը չորրորդ և վեցերորդ հորթածնության միջոցում ե լինում—վեցից մինչև ութը տարեկան հասակում: Այդ հասակից հետո կովերի կաթնառատությունը սովորաբար կամաց կամաց ընկնում ե, պակասում ե:

Տասնյերորդ հորթածնությունից հետո կաթի համար կով պահելը արդեն միշտ ել ոգտավետ չի լինում: Միայն առանձին ղեպքեր յեն պատահում, յերբ կովերը ությերորդ և մինչև անգամ տասներորդ հորթածնությունից հետո ել շատ կաթ յեն տալիս: Իսկ միջին թվով՝ տնտեսության մեջ կաթի համար կովը տաս տարի յեն պահում:

Բացի դրանից՝ կով ընտրելիս ուշադրություն պետք ե դարձնել հորթածնության ժամանակը մեծ ազդեցություն ե ունենում կաթի թե քանակության և թե հասկության վրա: Հորթածնության առաջին ամիսները կովը այնքան ել յուղալի կաթ չի տալիս: Այդ կաթը իր քանակությամբ շատ կլինի, բայց իր բաղադրությամբ—ավելի ջրալի: Առհասարակ նոր ծնած կովերի կաթը յուղ քիչ ե պարունակում: Հինգյերորդ—վեցյերորդ ամսից հետո կովը կամացկամաց կաթը պակսեցնում ե: Դրանից հետո կաթը ավելի թանձր և յուղալի յե դառնում:

Կերակրելը նույնպէս ազդեցութիւնն է ունենում կովի կաթնառատութեան վրա: Այդ համաձայն չէ պետք չէ աչքից բաց թողնել: Որինչապի համար, յերբ կովը վատ տիրոջ մօտ է յեղել, ինչտեղ նրան կուշտ չեն կերակրել, կարող է լինել, վոր հենց դրա պատճառով նա քիչ եր կաթ տալիս: Վատ կերը, վատ, ցուրտ գոմը, վատ խնամելը և ընդհանրապէս վատ պահելը միշտ վատ յեն ներգործում կովի կաթնառատութեան վրա: Վատ կացութեան պայմանների մեջ յեղած կովը ժամանակի ընթացքում կարող է կաթը շատ ավելացնել՝ յեթե լավ կեր է ուտում, նրան լավ յեն պահում և խնամում:

Ավելի հանգիստ բնավորութիւն ունեցող կովերը, հեզ և խոնարհ կովերը միշտ ավելի լավ են քացի տվող անհանգիստ կովերից: Այդպիսի կովերը ավելի լավ յեն կեր ուտում, ուրիշ բանով չեն զբաղվում: Կթելու ժամանակ նրանք հանգիստ յեն և թողնում յեն, վոր լիովին կթեն: Այդ բոլորը նույնպէս պետք է նկատի ունենալ կաթնառատ կով ընտրելիս:

ԻՆՉՊԵՍ ԻՄԱՆԱԼ ԿՈՎԻ ՀԱՍՍԱԿԸ

Կովի հասակն իմանալու ամենահասարակ միջոցը հորքածնութեան քիմիկն է: Բանն այն է, վոր ամեն մի հորթածնութիւնից հետո կովի պոզերի

վրա մի մի ողակ է դուրս գալիս: Այդ ողակները դոյանում յեն այն պատճառով, վոր կովը հզի ժամանակ թե՛ իրեն է կերակրում և թե՛ հորթին: Դրա շնորհիվ աննդի պակասութիւնն է լինում և պոզերի վրա ողակների պէս նշաններ են հայտնվում:

Կովի տարիքը հորթածութեան թվով հաշվելը շատ հեշտ է: Դրա համար պոզերի ողակները պետք է համարել և ելի ավելացնել յերկուտարի—մինչև առաջին հորթածնութեան ժամանակը: Յենթադրենք, վոր ամեն մի պոզը չորս ողակ ունի: Դրանց վրա ավելացնենք ելի յերկու տարի: Հաշվենք. չորս ողակը չորս հորթածնութիւնն է նշանակում, ավելացնենք ևս յերկու տարի, դուրս է գալիս վեց: Ուրեմն՝ կովը վեց տարեկան է: Պետք է ուշադրութիւն դարձնել և այդ ողակների միջև յեղած տարբերութեան վրա: Այդ տարածութիւնները հավասար պիտի լինեն: Յեթե պատահի, վոր նրանք իրարուց մոտավորապէս յերկու անգամ մեծ յեն, ապա այդ նշանակում է, վոր կովը անծնունդ է յեղել: Ամեն մի այդպիսի մեծ տարածութիւնը յերկու տարի պետք է հաշվել: Այդ մեծ տարածութիւնների թվի հիման վրա կարելի յէ իմանալ, թե կովը քանի անգամ հզի չի յեղել:

Ի դեպ, պետք է նկատել և այն, վորպէս զորքերը վրա ողակները հայտնվում յեն վո՛չ միայն հղի լինելուց հետո: Նրանք յերբեմն ծանր հիվանդութիւններէից և սաստիկ քաղցած մնալուց հետո յել են հայտնվում: Սակայն այդպիսի ողակները դժվար չէ հղիութեան ողակներից զանազանել: Նրանք քիչ ավելի պարզ կլինեն և անպատճառ անհարթ: Գործնականում այդպիսի դեպքեր հազիւ յեն պատահում: Ավելի շուտ շուտ այնպիսի դեպքերի յենք պատահում, յերբ պոզերի վրա ողակները քիչ են նկատելի, վորոշակի չեն արտահայտված: Այդպէս է լինում այն կովերին, վորոնք ծանրացած ժամանակ լավ յեն կերակրվել: Այստեղ արդեն պետք է դիմել այն մարդկանց ոգնութեան, վորոնք վարպետ են՝ կովի տարիքը նրա ատամներով վորոշելու: Անհրաժեշտ է լինում պոզեր չունեցող կովերի ատամները նայել, թե չէ ուրիշ կերպ հնարավորութիւն չկա կովի տարիքն իմանալու: Ամենից լավն է այդպիսի դեպքում անասնաբուժին դիմել՝ նրա խորհուրդն իմանալու և ոգնութեան ստանալու:

ԻՆՉՊԵՍ ԻՄԱՆԱԼ՝ ԿՈՎՐ ԱՌՈՂՁ Ե ԹԵ ՎՈՉ

Առողջ կովը արտաքուստ կայտառ կլինի, պարզ և աշխույժ հայացք կունենա, նրա բուրդը հարթ կլինի և մի քիչ ել փայլուն, պինձը

փոքր ինչ տաք և թաց: Այդպիսի կովը կերի, լավ ուտելու և խմելու ցանկութիւն պիտի ունենա:

Շնչառութիւնը հավասար և հանգիստ պիտի լինի: Յիվ ընդհակառակը, ամեն մի հազ, խըրխուց, շնչարգելութիւն ապացույց են շնչառութեան գործարանների— շնչափողի և թոքերի— հիվանդութիւնների (հաճախ՝ թոքախտի):

Փորլուծութիւնն ու փորակապութիւնը ապացույց են ստամոքսի կամ աղիքների հիվանդութեան:

Միզարգելութիւնը, արյունախառն շեռը ապացույց են միզերակի հիվանդութեան, այսինքն ցույց են տալիս, վոր կովը յերկամունքի, միզափամփուշտի ցավեր ունի, և այլն:

Պնչի չորութիւնը շատ հաճախ ջերմի կամ տաքութեան նշան է («ներքին տաքութեան»): Այդպիսի ջերմ և բարձր տաքութիւն միշտ լինում են փոքր ի շատե լուրջ ցավերի և վարակիչ հիվանդութիւնների դեպքում: Յ՛րբ հարկավոր է լինում կովի առողջութիւնը վորոշել, այդ բոլորը պետք է նկատի ունենալ:

Կովի առողջութիւնը վորոշելու ժամանակ սկսում են գլխից: Պետք է նայել, արդո՞ք զըլխին և մանավանդ ծնոտին ուռուցքներ չկա՞ն (Այդպիսի ուռուցքներ լինում են մի առանձին

հիվանդության ժամանակ, վոր ահա՛նումիկոզ ե կոչվում), արդյոք կովի աչքերը հո չե՞ն ցավում (կուրություն, փառ, աչքերի թաղանթի կարմրություն, արտասուքի հոսումն և այլն), արդյոք կովի քթից չի՞ հոսում, արդյոք բերանում վերք (վոր մի քանի վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ լինում ե, ինչպես, որինակի համար, «ժանտախտի», «կրծելու սովորության» ժամանակ և այլն), քերթված, բորբոքված տեղեր չկա՞ն:

Գլխից հետո պետք ե նույնպես ուշադրությամբ դիտել վիզը, կրծքի վանդակը, վոտները, կնճղակները, իսկ ամենից գլխավորն ե—լավ դիտել ծիծը:

ԻՆՉՊԵՍ ՊԻՏԻ ԼԻՆԻ ԿԱԹՆԱՌԱՏ ԾԻԾԸ

Մենք արդեն ասացինք, վոր ծիծը կաթի գործարանն ե: Հենց ծծի մեջ ե կաթը մշակվում և վոչ թե մի ուրիշ տեղում: Այդ պատճառով կաթնառատ ծիծը միշտ իր «նշանները», իր առանձին հատկություններն ունի:

Կաթնառատ ծիծը անպատճառ մեծ և պարունակող պիտի լինի: Նա կունենա լավ և զարգացած հավասարաչափ «ծծի քառորդներ»: Այդ տեսակ ծիծը յետևից՝ ազդրների միջև, սովորաբար շատ առաջ ե ընկնում: Առջևից նա դեպի

փորն ե գնում, նույնպես և կողքերից նա փոքր ինչ դուրս ե ընկնում (նկար 1):

Այդպիսի կաթնառատ ծիծը ընդհանրապես քառանկյունի ձև ունի: Միևնույն ժամանակ նկատի պետք ե ունենալ, վոր մեծ ծիծն ել վոչ միշտ կաթնառատ կարող ե դուրս գալ:

Այստեղ պետք ե իմանալ կաթնառատ ծիծը վոչ կաթնառատ ծծից զանազանել: Յերկու դեպքումն ել իրենց մեծությամբ նրանք միատեսակ կարող են լինել, սակայն ուշադրությամբ դիտելիս դժվար չի լինիլ զանազանությունը վորոշել:

Առողջ, կաթնառատ ծիծը, յերբ դեռ չեն կթել, շոշափելու ժամանակ բավական պինդ ե, առաձկական, ասես թե լեցուն: Յեւ ընդհակառակը, այդ ծիծը կթելուց հետո կակղում ե, փոքր ինչ կախվում, դատարկ, արտաքուստ



Նկ. 1

եւ կնճռոտ եւ լինում: Այդպիսի ծծի վրա ամեն անգամ կթելուց հետո յետեից փոթեր, ծալքեր են լինում:

Ինչքան այդ ծալքերը մեծ են, այնքան եւ նա հեշտ եւ ճգվում:

Նշանակում եւ, վոր ծիծն եւ լավ եւ: Համենայն դեպս կաթնառատ ծծի համար դա լավ նշան եւ:

Իսկ վոչ կաթնառատ ծիծը կթելուց հետո քիչ եւ փոխվում, նա վոչ կախ եւ ընկնում, վոչ եւ կնճռոտվում: Շոշափելիս նա պինդ եւ բավական ուժեղ կլինի:

Հետո կաթնառատ ծծի վրա լավ են վորոշվում կաթնա-



Նկ. 2

յին ջղերը (ավելի ճիշտ—«կաշվի» արյունատար կամ կաթնային յերակները): Կաթնառատ կովի ծիծը նուրբ, շարժուն եւ քնքուշ կաշի ունի՝ ցանցաւ, կակուղ եւ փայլուն մազերով:

Վոչ-կաթնառատ ծծի կաթնային յերակները աննկատելի յեն լինում, սովորաբար նրա կաշին կոպիտ եւ լինում, եւ կթելուց հետո ծալքեր չեն լինում: Այդ տեսակ ծծի մազերն եւ կոպիտ են լինում:

Կովի ծիծը յերբեմն եւ «կախ ընկած» եւ լինում: Այդպիսի ծիծը ման դալիս լիւլիւում եւ կովի ազդերների միջեւ, մինչեւ անգամ յեթե կթած եւ չի: Խորհուրդ չեն տալիս այդպիսի ծծեր ունեցող կով առնել: (Տես. նկ. 2):

ԻՆՉՊԵՍ ՊԻՏԻ ԼԻՆԵՆ ՊՏՈՒԿՆԵՐԸ

Կաթնառատ ծծի պտուկները վորքան կարելի յե միմյանցից հեռու պետք եւ լինեն եւ ուղղակի դեպի ցած պիտի նայեն:

Կթելու համար ամենից լավը այն պտուկներն են, վորոնք ծայրին նեղանում են, հարթ եւ միջին յերկայնության են: Շատ յերկար պտուկները կամ մսային են լինում եւ դժվար են կրթվում, կամ կակուղ եւ նեղ, վոր պառավ կովերն են ունենում:

Կթելու ժամանակ կաթը հավասարաչափ պիտի հոսի պտուկներից, առանց վորեւիցե դժվարության:

Յերբ թույլ կթվող կովերի ծիծը սաստիկ

լցվում է, շատ անգամ կաթը ինքնաբերաբար դուրս է թափվում:

Կաթնառատ կովերը, բացի կանոնավոր, բնականապես զարգացած չորս պտուկներից, ևս յերկու լրացուցիչ, քիչ զարգացած պտուկ են ունենում: Սովորաբար այդ պտուկները յետին պտուկներից մի քիչ վեր են լինում: Այդ պտուկները չեն կթվում, բայց կաթնառատության նշան են:

Լավ ծծի առջևի պտուկները յետքի պտուկներին շատ ավելի բարձր են:

Կարեւոր նշանները կարևորակներն ու կարևորադրյալներն են:

Կաթներակներն ու կաթնաղբյուրները պետք է լավ ճանաչել և հասկանալ: Դրանք կովերի կաթնառատության շատ կարևոր նշաններ են: Կաթներակները ծծից գնում են դեպի փորի յերկու կողմը:

Կաթնառատ կովերի կաթներակները հաստ, պարզ յերևացող թելերի պես են լինում: Այդ իսկ կաթներակները ծծից մի քիչ հեռու փորի ներսն են մտնում: Յեւ հենց այդ յերակների մտնելու տեղը ընդունված է կարևորադրյալներ անվանել: Մատով ել դժվար չէ նրանց շոշափել: Բանից դուրս է գալիս, փոր ինչքան այդ յերակները հաստ են, պարզ փորոշված և ինչքան լայն

է կաթնաղբյուրների բերանը, այնքան ել անսխալ կարելի յե ասել, փոր կովը իսկապես կաթնառատ է:

Այդպիսի յերակներ, ինչպես արդեն ասված է, կաթնառատ կովերի ծծերի վրա յեն լինում: Սակայն այս կաթներակները ավելի քիչ են զարգացած, քան այն յերակները, փորոնք փորի և կաթնաղբյուրների վրա յեն գնում:



Նկ. 3

Ծծի կաթներակները շատ վետովետ (ալիք-ալիք) են և ընդմիջվող ճյուղերով են միանում միմյանց հետ (Նկար 3. a յել 6 կարևորակներն են, b — կարևորադրյալները):

ԿԱԹՆԱՌԱՏ ԿՈՎԻ ՈՒՐԻՇ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Կաթնառատ կովի գործիք թեթև պետք է լինի, մի քիչ ել դուրս քաշած:

Վոսները բարակ պիտի լինեն, իսկ ախանջները յերկայն և թափանցիկ: Ականջների միջի մազերը—փափուկ:

Վիզը բարակ պիտի լինի, բավական յերկայն. ծոկերու ժամանակ բազմաթիվ փոթեր ունի:

Մոռողը (վզի տակ կախված մասը) — միջակ մեծության: Մեծ մոռուղ միայն այն կովերն են ունենում, վորոնք պարարտանալու հակումն ունեն:

Կաթնառատ կովի համար առանձնապես մեծ նշանակություն ունի կուրծքը: Կենդանու մարմնի ամենակարևոր գործարանները՝ թոքերն ու սիրտը կրծքի մասումն են գտնվում, և ի հարկե վորքան լավ ե զարգացած կրծքի վանդակը, այնքան շատ հույս կա, վոր կենդանու թոքերը և սիրտը առողջ են լինելու:

Կանոնավոր կերպով զարգացածը համարվում ե լայն կուրծքը: Այդպիսի կրծքի վանդակն ել լայն և մեծեղիր ե լինում, և առջևի վոտները լայն են դրված:

Կաթնառատ կովի կողերը բարակ և տափակ պիտի լինեն: Այդ կողերի միջի արանքները լայն են, մանավանդ վերջին կողերի միջև: Այդ արանքներում յերկու - յերեք մատ պիտի տեղավորվի:

Փորը բավական մեծ պետք ե լինի: Դա ցույց կտա, վոր կովը ընդունակ ե մեծ քանակությամբ կեր մարսելու: Բայց չե վոր առանց դրան շատ կաթ ստանալ չի կարելի:

Սակայն պետք ե իմանալ զանազանել ամեն մի այդպիսի մեծ փորը «կախ ընկած» փորից, վոր

կովի թուլությունը կամ նրա պառավությունն ե ցույց տալիս:

Պատահում են նիհար փորով կովեր: Առանց անասնաբուժի խորհուրդի, այդպիսի կովեր ձեռք բերել հարկավոր չե:

Կաթնառատ կովի լեզվի ուղիղ և հավասար պիտի լինի: Միայն հղի կովերինն ե փոքր և ներս ընկած լինում: Պառավ և շատ անգամ ծնածնեղից զրեթե ամեն մեկինը այդպես ներս ընկած ե լինում:

Կաթնառատ կովերի վոտները բարակ և կարճ են լինում: Վոտների բարձրությունը թերևս նշանակություն չունի: Բայց ի նկատի պետք ե ունենալ, վոր կաթնառատ ցեղերի մեծամասնությունն վոտները բավական կարճ են լինում: Յերբ ծիծը մեծ և լավ զարգացած ե լինում, կովերը վոտները լայն են դնում:


Կաթնառատ կովի կաշին բարակ, շարժուն պիտի լինի, բուրդը կակուղ և քնքուշ: Մատներով բռնելիս այդպիսի կաշին շատ հեշտ ե ձրգվում և բարակ ծալք շինում:

Պոչը լավ ե, յերբ նրա արմատը բարակ ե:

Այդ ել կարծես կովի կաթնառատության նշան կարող ե համարվել:

Կաթնառատ կովի աւրողը ֆաւակը բավանաչափ լավ զարգացած պիտի լինի: Յեթե

56159.66



այդպիսի կովին մի կողմից նայելու լինենք, հեշտ ե նկատել, վոր նրա քամակը ավելի սաստիկ ե զարգացած, քան թե առջևը: Յե՛վ այդ հասկանալի յե: Կովի յետին մասումն են գտնուվում նրա հղության ե կաթնատվության (ծիծ) գործարանները:

Կաթնառատ կովի ընդհանուր տեսքը (մոտավորապես) այսպես պիտի լինի. թեթև, բարակ ե պարզ արտահայտված վոսկորներ, լայն քամակ, յերկայն յերանք. բարակ, քնքուշ ե շարժուն կաշի, վոր պարանոցի վրա մանր ծալքեր ե կազմում. ծծի, փորի, ականջների ե վոտների ցածրը մասերի կաշին ներսից կակուղ ե քնքուշ մազերով պիտի լինի ծածկված:

Առհասարակ կաթնառատ կովը լավ կազմվածք պիտի ունենա, լավ ե կայտառ տեսք պիտի ունենա. յերբ տերը կանչում ե՝ հեշտ արձագանք պիտի տա, հանգիստ իրեն մոտ պիտի թողնի նայելու ե կթելու:

ԾԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այժմ տեսնենք, թե կաթնառատ կով ընտրելիս վո՞րպիսի հիվանդությունների վրա պետք ե առանձին ուշադրություն դարձնել:

1. Ծծի տրեկոյոց (բարակացալ): Կաթ-

նառատ կովերի բոլոր հիվանդություններից դա ամենից վտանգավորն ե: Դա վտանգավոր ե այն պատճառով, վոր տուբերկուլյոզը կարող ե վարակել ե մյուս կովերին: Կաթի միջոցով ինքը մարդն ել կարող ե վարակվել: Յերբ ծիծը տուբերկուլյոզ ունի, յերբեմն կարելի յե պինդ ե բոլորովին ցավ չպատճառող կնճռոտ ուռուցքներ շոշափել: Պատահում ե, վոր ծծի վնասված մասը ամենից հաճախ յետին մասը, փոքրանում ե: Յերբեմն ուռուցքն ինքն իրեն մեծանում ե ե հազվին մեծության հասնում (մինչև 50 ֆունտ):

Առհասարակ կովի ծիծը նայելիս յեթե ուռուցք պատահի, առանց անամաբուժի նայելուն ե նրա խորհրդին պետք չե այդպիսի կով գնել:

2. Պսոակի ակցի նեղանալը: Ծիծը դիտելիս կարելի յե նկատել ե պտուկի անցքի նեղություն: Լինում են դեպքեր, յերբ պտուկի անցքը բոլորովին փակվում ե: Այդպիսի պտուկը ձեռք տալիս կարելի յե անցքի մեջ սիսեռաձև պինդ ուռուցքներ շոշափել: Այդ ուռուցքը կարող ե կամ բոլորովին պտուկը փակել ե չթողնել վոր կաթը թափվի, կամ թե կարող ե միայն դժվարացնել հոսանքը: Այդպիսի հիվանդություն ունեցող կովը լավ ե չգնել:

3. Գորսևուկներ (կոծիծներ) յե՛վ ձեղխեր: Հաճախ են պատահում կաթնառատ կովեր, վորոնց

պատվաների վրա գորտնուկներ են լինում: Այդ գորտնուկները ավելի շատ վիչացնում են ծծի տեսքը: Բայց յեթե դրանք շատ են և մեծ, կթելու ժամանակ կխանգարեն: Բացի դրանից, նույնիսկ կթողի ձեռներից այդ գորտնուկները կարող են մյուս կովերին անցնել: Այդ պատճառով մեծ զգուշությամբ պետք է այդպիսի կով առնել:

4. Պսակների քերել մեղիերը: Այդ ձեղքերը ամենից հաճախ առաջ են գալիս կեղտոտ պահելուց և ծիծը կթելուց առաջ և հետո լավ չխնամելուց, չհետևելուց: Այդ վնասից ձեղքերը շատ հեշտ կարելի չէ բժշկել: Ուստի և այդպիսի կովը չի կարելի անպետք համարել:



281

22830

ԳԻՆԸ 12 ԿՈՊ.

2.81
2700



Տնօրոքոխ
Как выбрать
молочную корову.

На армянском яз.

Центральное Издательство Народов Союза С С Р

Москва

Никольская 10.