

~~Հ. 4. 4. 4. 4. ԱԳԻՏ-ԲԱԺՆԵ ԳՅՈՒՂԱՏՎԵՄԱԿԱՆ ԾԵՐԴԱ~~ № 4

ՊԵՐՔԱՆԵՐԻ բՈՒՐ ՀԵՂԵՐ ԹԵՐ, ՃԵՐԵՐ

ԸՆՍ ՅՈՒՐՄԱԼԻԱՏԻ



ԿԱԹԵՆԱՏՈՒ ԿՈՎԻ

ԿԵՐԱԿՐԵԼ ՈՒ ԽՆԱՄՔԸ

Կ. Կ.

— — — — —

Թարգմանեց Եր. ՄԱԼԱԹՅԱՆ

Խազմված և խմբագրությամբ
Խ. ՅԵՐԵՅՅԱՆԻ

ԶԵՐԵՎՈՒՄ
1924

ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ Խ. ՅԵՐԻՑՅԱՆԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ Հ.4.4.4.4.4.4.
ԱԳԻՏ-ԲԱԺՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼ
ԳՐՔՈՒՅԿԱՆԵՐԸ

1. Ա. Պոպով - Առչխատրի քյափանակ հիվանդությունը
Գինն և 10 կող.
2. Ա. ՄԵԼԻՔ-Շահնազարյան - Դաշտային մկները և նրանց զեմ
կովելու միջոցները - Գինն և 15 կող.
3. Խ. ՏԵՐ. Ս.Վազյան - Մեղվի փոտախտ հիվանդությունը և նրա
զեմ կովելու միջոցները - Գինն և 20 կող.
4. Ա. Յուրմաղիան - Կաթնատու կովի կերակրելն ու խնամքը
Գինն և 30 կող.

Տպագրվում են յեվ ռուսով լույս կտեսնեն

1. Մ. Թումանյան - Բամբակի Մշակությունը
2. Մ. Գլուխով - Կանաչ պարարտացումը
3. Ա. Յուրմաղիան - Հորթերի խնամքն ու կերակրելը
4. Ա. Արմատապտուղների մշակությունը
5. Պրոֆ. Գուրին - Հղի կովի խնամելը
6. Սկսմուխով - Ընտանի կենդանիների հիվանդությունները

Դիմել ՅԵՐԵՎԱՆ. Հ. Ա. Ա. Ա. Ա. Բ ԽԵՎՏԱՐԱԿՅՈՒԹՅԱՆ
Էրևան. издательство Ц. К. К. П. А.

Ա136

Պետևաբներ բոլոր յերկրների, միացեք


Հ. 4. 4. 4. ԱԳԻՏ-ԲԱԺՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆԵՍԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱ № 4

ԸՆ ՅՈՒՐՄԱԼԻԱՏԻ

W163

ԿԱԹՈՆԱՏՈՒ ԿՈՎԻ

ԿԵՐԱԿՐԵԼՆ ՈՒ ԻՆԱՄՔԸ



Թարգմանեց Դ. ՄԱԼԱԹՅԱՆ

Կազմված է խմբագրությամբ
Խ. ՅԵՐԵՑՅԱՆԻ



ՅԵՐԵՎԱՆ
ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՐԱՆ
1924



23868

Պատվեր № 2099

ՅԵՐԿՈՒԻ ԽՈՍՔ

Այս գիրքը հրատարակելիս կոմկուսի կենտրոնական կոմիտեյի Ազիտ-Բաժինը ցանկացել է ոգնության գալ մեր անասնապահ գյուղացուն և ցույց տալ, թե ինչպես պետք է նոր ձեվով կերակրել ու խնամել տավարը, վոր նա առողջ լինի, շատ կաթ տա և տիրոջը շատ ոգուտ:

Այս գրքում գրած կերակրելու ձեվը մենք մեր գըլ-խից չենք հնարել: Շատ վաղուց ե, վոր այս ձեվով կերակրում են իրենց տավարը շատ առաջավոր ժողովուրդներ՝ դանիացիք, շվեդացիք, գերմանացիք, ամերիկացիք և այլն: Այս ձեվով կերակրում են նայեվ Ծուսաստանի շատ տեղերում: Մեզանում ել են շատ փորձեր արել մեր գյուղացու հասարակ կովերի վրա և միշտ այդպիսի կերակրումից ստացել են 2-3 անգամ ավելի կաթ, քան գյուղացին և ստանալիս յեղել իր կերակրած ձեվով: Նոր յեղանակով կերակրելն է, վոր հարստացրել է դանիական գյուղացուն ու նրա տավարը լավացրել: 25-30 տարի սրանից առաջ դանիացոնց տավարն ել այնպես եր, ինչպես մեր տավարը: Իսկ հիմա եղ յերկու տավարի մեջ սարեր կան:

Թե ինչումն է կայանում կերակրելու նոր ձեվը, այդ պարզ ու ամենքի համար հասկանալի լեզվով գրած է այս գրքի մեջ: Ուշադրությամբ կարդացողը հեշտությամբ կհասկանա և շատ ու շատ կշահի այս գրքի խորհուրդներից: Այս գրքից կիմանա, թե ի՞նչ տեսակ կերեր ե հարկավոր և վորքան ամեն մեկից, վորպեսզի տարվա պաշարը պատրաստ լինի և կանոնավոր կերակրումը դլուխ գտա:

Ուրեմն տավարատերը պետք է իր տնտեսության մեջ ունենա այն բոլոր կերերը, վորոնք հարկավոր են նոր ձեվով և կանոնավոր կերակրելու համար։ Կերերի մի քանիսն ինքը կարող է պատրաստել իր տնտեսության մեջ (որինակ՝ խոտը, առվույտը (յոնջան) դարմանը, բազուկը, գազարը, կարտոֆիլը, վարսակի ալյուրը (օвес) և այլն) մի քանիսն ել, յեթե ինքը չկարողացավ իր ձեռքով պատրաստել, պետք է գնի դրսից, յեթե ձեռնտու յե (որինակ՝ կտավատի, բամբակի քուսպերը, ալյուրի թեփը և այլն):

Այնուհետեվ այս գրքից իմացվում է, վոր ամեն մի կով չի կարելի պահել ու կերակրել, յեթե նա կերակրելու ու խնայելու ծախսերը չեն հանում։ Իսկ այդ իմանալու համար հարկավոր է կերը հաշվով տալ, կաթի և կովի քաշի համեմատ։ Ամեն բանում վարպետություն է հարկավոր։ Կաթնատու կովի կերակրելն ել մի մեծ վարպետություն է, վորը սակայն ամեն մի գյուղացի հեշտությամբ կսովորի, յեթե ցանկանա ու իր շահերը հասկանա։

Հենց դրա համար ել գրված է այս գիրքը, վոր գյուղացին իր շահերը հասկանա ու այնպես վարվի։

Թեպետ այս գիրքը ոռւսերենից է թարգմանված, բայց սրա մեջ փոփոխություններ շատ են արված։ Շատ բան կրճատել ենք շատ բան ել ավելացրել ու աշխատել ենք մեր պայմաններին հարմարեցնել, իսկ վոր գլխավորն է, աշխատել ենք հասկանալի դարձնել մեր գյուղի միջակընթերցողի համար։



Թ Ա Մ Ն 1.

Ի՞նչՊԵՍ ՊԵՏՔ Ե ՊԱՀԵԼ ԿԱԹՆԱՏՈՒ ՏԱՎԱՐԸ

1. ԿԱԹՆԱՏՈՒ ՏԱՎԱՐԸ ՊԱՀԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԸ

Կաթնատու տավարը կանոնավոր՝ պահելու և կերակրելու նպատակն ե՝ 1) նրան առողջ պահել, 2) քիչ ծախս անելով շատ քանակությամբ լավ վորակի կաթ ստանալ և 3) առողջ սերունդ ստանալ:

Կաթնատու տավարը կանոնավոր կերակրելիս և պահելիս մենք չպետք ե աշխատենք այնքան շատ կաթ ստանալ, վոր ուրիշներին զարմացնենք, այլ այնքան, վոր համապատասխանի տավարին տրված կերի արժեքին ու ցույց տված խնամքին:

Մեր նպատակին հասնելու համար մենք պետք ե ունենանք վոչ միայն լավ կով, լավ կեր և լավ գոմ, այլ և պետք ե ծանոթ լինենք կերակրելու և խնամելու կանոնների հետ:

Կաթնատու տավարին կերակրելու վերաբերյալ գոյություն ունեն շատ գիտական ու գործնական ուսումնասիրություններ, տվյալներ և կանոններ։ Սակայն դրանց ոգտվելու համար հարկավոր ե նսիսապես գիտենալ և գործադրել խնամքի մի քանի ընդհանուր կանոններ։ Այս ընդհանուր կանոնները գործադրվում են կաթնատու տավարի կերակրման բոլոր ձեվերի ժամանակ և համարվում են ամենակարեվորներն ու ամենահիմնականները, ուստի և այդ պետք ե կատարենք առաջին հերթին։ Հենց այդ կանոնների մասին ե խոսվում այս գրքի առաջին մասում։

2. ԿԱԹՆԱՏՈՒ ՏԱՎԱՐԻ ՊՌԵԵԼՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒԹ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Կաթնատու տավարը, մյուս բոլոր կենդանիներին ման,
առողջ ապրելու համար կարիք ունի բավարար քանա-
կությամբ մաքուր ողի, սնունդի, տաքության, լույսի և
շարժումներ կատարելու:

Յեթե տավարի մաքուր ողը, տաքությունը և լույսը
պակաս են և նա շարժումներ քիչ ե անում, այդ դեպ-
քում կենդանին լավ կերակրելու ժամանակ ել շուտ-շուտ
կհիվանդանա, կաթը կպակասեցնի, վորից և կտուժի տա-
վարատերը:

Միայն առողջ անասուններն են ամենալավ ձեվով
ոգտագործում իրանց տրված կերը յեվ տալիս են առողջ
սերունդ: Հետեվտքար մենք վոչ մի միջոց չպիտի խնա-
յենք, վորպեսզի մեր տավարն ապրի լավ պայմաններում
և լինի առողջ:

Ամառը, տուվարին հանդում արածացնելիս կարիք
չի լինում մտածելու մաքուր ողի, լույսի, տաքության և
շարժումների մասին: Զմրանն ընդհակառակը. մենք ոտիպ-
ված ենք նրան պահել գոմերում, իսկ մենք գիտենք, վոր
մեր գոմերում ընդհանրապես ողը, լույսը, յերբեմն և
տաքությունն անբավարար են. գոմը տաք յեղած դեպ-
քում ել ողը շատ խեղդուկ ու կծու յե լինում: Բացի
դրանից մեր գոմերը մեծ մասամբ մութ, կեղտոտ և նեղ
են լինում:

Մեզ մոտ լեռնային մասերում ցրտի պատճառով
տարվա մեծ մասը տավարին պահում են գոմերում,
ուստի և մենք առանձին լուրջ ուշադրություն պետք ե
դարձնենք մեր գոմերի կառուցման վրա:

Գոմի շինության վերաբերյալ կատարված ամեն մի
սխալը ապագայում տավարատիրոջ վրա կարող ե թանկ
նստել, վորովհետեւ կաթնատու տավարին հնարավոր ե

կանոնավոր պահել ու կերակրել միայն այն դեպքում,
յերբ գոմը կարգին ե շինված:

Ի՞ՆՉՊԵՍ ՊԵՏՔ Ե ԼԻՆԻ ԳՈՄԸ

1. Գոմը ձմբանը պետք ե լինի սահ, այսինքն ջերմության աստիճանը չպետք ե լինի 36⁰—15⁰ ցածր:
Ով վոր կով կերակրել ե, յերեվի կիմանա, վոր ցուրտ
գոմում կովս ավելի շատ կեր ե ուտում, քան տաք գո-
մում, բայց կաթ քիչ ե տալիս. ուրեմն կերի մի մասն
իզուր ե կորչում։ Այդ ավելորդ կերը տավարը ծախսում
ե իր մարմինը տաքացնելու վրա, վորովհետեւ տավարի
մարմինը ցուրտ գոմում ավելի շուտ ե սառչում, քան
տաք գոմում։ Կենդանու մարմնի տաքության աստիճա-
նը պետք ե լինի միշտ միեվնույն բարձրության վրա
(խոշոր յեղջյուրավոր անասունները 37,5⁰—38⁰ ՑԵԼՍ.)։
Մարմնի տաքությունը գոյանում ե այն սննդանյութե-
րից, վորոնք կերի միջոցով մտնում են մարմնի սեջ:
Յերբ գոմը ցուրտ ե լինում, տավարն աշխատում
ե սովորականից ավելի շատ ուտել, վորպեսզի իր
մարմնի ընդհանուր տաքությունը չպակասի։ Մարմնի
տաքության աստիճանի պակասելու պատճառով կենդա-
նին հաճախ հիվանդանում ե, յերբեմն ել սատկում։

Գոմը տաք պահելու համար հարկավոր ե այսպես
անել.

Աշնանը, յերբ դեռ տավարը դրսումն ե պահվում,
պետք ե գոմի պատերի բոլոր ճեղքերը կալնել ու սվա-
ղել կավացեխով։ Առաստաղի ճեղքերը նույնպես պետք ե
կալնել ու յերեսին կավ քսել, վրան ել հող փռել, կամ
ցեխ քսել 2-3 վերշոկ հաստությամբ։ Գոմի դռները պետք
ե պինդ ծածկել, վոր վոչ մի ծակ ու ծուկ չլինի։ Պա-
տուհանները նույնպես պետք ե լավ ծածկել, ճեղքերը
կալնել, վորպեսզի տաքությունը դուրս չգնա, գոմը
չսառչի. հակառակ դեպքում ձմեռվա ընթացքում մեծ քա-

նակությամբ ավելորդ կեր կծախսվի, բացի այն, վոր տավարն ու հորթերը կարող են մըսել և հիվանդանալ: Թե վորքան կախումն ունի կովի ծախսած կերի քանակը գոմի տաքությունից, այդ վկայում են տավարատերերը, վորոնք նկատել են, վոր ցուրտ գոմում ձմբանը կովը 12-15 փութ խոտ ավելի յեւ ուտում, քան տաք գոմում, իսկ կաթ քիչ եւ տալիս: Հետեվաբար ձեռնուր յեւ, վոր մենք աշխատենք գոմը տաք պահել:

2) Գովի ողը պետք ե լինի մաքուր, թարմ, չոր յեվ վսչ շատ տաք ողը վատ ե ազդում տավարի առողջության և կաթնատվության վրա: Այդպիսի գոմում տավարը վատ ե ուտում, քրտնում ե և ավելի շուտ կարող ե մըսել, քան չափավոր տաքություն ունեցող գոմերում: Գոմի ողի տաքության աստիճանը չպետք ե լինի 16,5⁰ Ց. թարձ:

Վորպեսզի պարզ լինի, թե մաքուր ողը վորքան խոշոր նշանակություն ունի ընդհանրապես կենդանիների և մասնավորապես կաթնատու տավարի հումար, անհրաժեշտ է իմանալ, թե ի՞նչ տարբերություն կա մաքուր և կեղադաս ողի մեջ:

Մաքուր ողը բաղկացած ե 2 գազից՝ ազոտից յեվ թթվածնից: Ազոտը կազմում ե ողի $\frac{4}{5}$ մասը, իսկ թթվածինը՝ $\frac{1}{5}$ մասը: Դրանցից ամենագլխավորը թթվածինն է: Առանց թթվածնի կենդանիները չեն կարող շնչել, առ իսկույն կխեղղվեն, իսկ թթվածնով հարուստ ողում կենդանիները լավ շնչում են և լավ ել ապրում: Բացի ազոտից ու թթվածնից մաքուր ողի մեջ գտնվում են նայեվ քիչ քանակությամբ ջրի գոլորշիներ և ածխաթթու գագ: Ածխաթթու գագը դժվարացնում ե ընշառությունը: Ինչպես հայտնի յեւ, շնչելու ժամանակ մենք ներշնչում ենք թթվածին ազոտի հետ, իսկ արտաշնչում ածխաթթու գագ նույն ազոտի հետ: Վորքան ողի մեջ ածխաթթու քիչ կա, այնքան ողը մաքուր եւ այնքան ավելի հեշտ

Ե շունչ քաշել: Ներշնչվող և արտաշնչվող ողերն իրարից տարբերվում են նրանով, վոր ներշնչվող ողը հարուստ և թթվածնով, իսկ արտաշնչվողը՝ ածխաթթու գազով: Ներշնչվող մաքուր ողի 100 մասից մոտ 20 մասը թթվածին է, իսկ ածխաթթուն մաքուր ողի 10.000 մասից մոտավորապես 3-4 մասն է կազմում: Արտաշնչած ողի 100 մասից միայն 14-17 մասն է կազմում թթվածինը, իսկ մոտ 3-6 մասը ածխաթթուն: Հետեվաբար արտաշընչած ողի մեջ ածխաթթուի քանակը 100.260 անգամ ավելի յե քան ներշնչվող մաքուր ողում, իսկ թթվածինը $\frac{1}{4}$ չափով պակաս: Ահա այս եթարմ ողի և խեղդուկողի մեջ յեղած տարբերությունը: Յերբ կենդանին գոմում շնչում է, ածխաթթուն գոմում շատանում է, իսկ թթվածինը քչանում: Յերբ գոմում ածխաթթուն շատ է, ողը խեղդուկ է լինում, վորավիետեվ ածխաթթուն ավելի ծանը է, քան ողը, նա հավաքվում է փակված դռների մոտ և վոչ միայն ինքը դուրս չի գնում, այլ և արգելում է, վոր դրսից մաքուր ող ներս գա: այդ դեպքում տավարը դժվար է շնչում, լավ չի ուտում, արյունը չի մաքրվում և ներս շնչած ածխաթթուն աստիճանաբար թունավորում է ամբողջ արյունը:


Ընդհակառակը, թարմ ողում կամ ողափոխված գոմում կենդանիները հեշտությամբ են շնչում, լավ են ուտում և իրենց լավ են զգում:

Վորքան տավարի շնչած ողը մաքուր է, այնքան ավելի արադ և լավ է մաքրվում նրա արյունը, ավելի լրիվ է մարսվում ու յուրացվում նրա կերածը, ուստի և նա ավելի առողջ է լինում:


Մաքուր ողը նույննշանակությունն ունի նայեվ բոլոր ուրիշ կենդանիների համար, ինչպես և մարդու համար:

Գոմի ողը մաքրելու և միատեսակ տաքություն պահպանելու համար անհրաժեշտ է այնտեղ շինել ողը դուրս քաշող և ողը մաքրող խողովակներ:

Ողը մաքրող խողովակներից ամենագործնականն ու եժան նստողը Մուհիրի սիստեմով շինվող խողովակն եւ Այդ խողովակը շինվում է այսպես. վերցնում են 4 հատ դյուիմանոց տախտակ ամեն մեկը $\frac{3}{4}$ արշին լայնությամբ. տախտակները կպցնում իրար այնպես, վոր ստանում են քառակուսի խողովակ. ապա այդ խողովակի միջին մասը 2 տախտակով բաժանում են 4 մասի (տես նկ. 1, 2 և 3). Խողովակն այդ ձեփով շինելու դեպքում կեղտոտ ողը




Նկ. 1. Օդ
մաքրող խողովակը.



Նկ. 2.

Խողովակի ներս
տախտակներով բա-
ժանված 4 մասի:

ՀԵՂՄԱՆՈՒԹՅԱԾՔ ՊՈւրս ԿԾՃՎԻ և ՄԻԱԺՅԱՄԱՆԻԱԿ ՓՈԽԱՐԵՆԸ
Թարմ, մաքուր ող ներս կդա:



ՆԿ. 3. ցույց ե տրվում, թե ինչպես ե ողը գուրս ու տուն
անում խողովակի միջով:

Խողովակի տակը ամրացվում ե մի տախտակ, վորը
խողովակի հատակի մակարդակից 2 անգամ մեծ պետք ե
լինի: Այդ տախտակը նրա համար են ամրացնում, վոր-
պեսզի մաքուր ողը հավասար չափով տարածվի գոմում:

Վորովհետեւ խողովակը ներսից բաժանված ե 4 մա-
սի, ուստի վորտեղից ել բաժին փշելիս լինի, նա ներս-
կմտնի մի կամ յերկու բաժանմունքով, իսկ հակառակ
կողմի յերկու բաժանմունքներից ներս ու դուրս կանե-
կեխտութ ողը:

Խողովակի ներքեվի մասում ամեն մի բաժանմունքի համար առանձին խուփ ե շինվում, վորպեսզի ուժեղ քամիների ժամանակ և գոմի ողը մաքրելուց հետո փակվեն: Մուիրի սիստեմի խողովակով ողը շատ հաջող ե մաքրրվում: Այդ խողովակով բավական մեծ չափով և արագությամբ դուրս ե գնում կեղտոտ ողը և գոմի ողը բոլորովին մաքրվում ե: Պետք ե միայն զգույշ լինել, վոր չափազանց յերկար ժամանակ բաց չմնան խողովակի խուփերը, մանավանդ ուժեղ քամիների ժամանակ, վորպեսզի գոմը չցըտի և տավարը չմըսի:

Մեկ այդպիսի ող մաքրող խողովակը բավական ե քսան կովի համար: Մեր զյուղական վոքրիկ գոմերի համար նույնպես բավական ե մեկ խողովակը:

Ող մաքրող խողովակը պետք ե կանգնեցնել գոմի մեջտեղը և վոչ թե կովերի դիխավերեվը, այնպես, վոր կեսը լինի առաստաղից ներքեվ, մյուս կեսը կտուրից վերեվ:

Գոմի ծավալը բավարար ե համարվում այն ծամանակ, յերբ ամեն մի կովին ընկնում ե $2\frac{1}{2}$ խորանարդ սած. ող, այն ել լավ ողամաթրության դեպքում:

3. Գոմը սլեսք ե լինի լուսավոր: Վոչ միայն կենդանիները, այլ և բույսերը կարիք ունեն լույսի: Այսպես որինակ՝ յեթե վերցնենք կարտոֆիլը, կամ վորեվե ուրիշ բույս և աճեցնենք նկուղում առանց լույսի, նա կլինի գունատ ու հիվանդու:

Գիտնականները դիտել ու փորձել են, վոր լույսի ազդեցության տակ մննդարար նյութերն ավելի արագ ու լիակատար են ընդունվում ու մարսվում մարմնի կողմից քան մթության մեջ:

Մութ ու խոնավ բնակարաններում սովորաբար բազմաթիվ հիվանդաբեր բակտերիաներ են առաջանում, վորոնք վարակում են թե կաթը և թե տավարին: Մութ տեղում տավարը տիրում ե, քիչ ե ուտում, հետեվաբար

և կաթ քիչ ե տալիս: Բացի այդ մութ գոմերում դժվար ե տավարի առողջության վրա հսկել և անհարմար ե աշխատել:

Վորպեսզի գոմը լուսավոր լինի, աներածեց ե օլինել լուսամուտներ: Վորքան գոմը լուսավոր ե, այնքան լավ: Բայց վորովիետեվ շատ լուսամուտներ շինելը թանկ ե նստում և շատ լուսամուտ ունեցող գոմն ավելի շուտ ե սառչում, ուստի ստիպված ենք լուսամուտների համար քիչ տեղ թողնել, բայց վոչ այնքան, վոր մութ լինի և տավարի առողջության վրա ազդի: Վորպեսզի գոմը բավարար չափով լուսավորված լինի, լուսամուտները շինում են այն հաշվով, վոր գոմի հատակի ամեն մի 15-16 քառակուսի արշինին ընկնի 1 քառակուսի արշին լուսամուտ: Լուսամուտները պետք ե շինել բարձր և պատի յերկարությամբ և վոչ բարձրությամբ: Վորպեսզի ձմրանը լուսամուտներից չփչի, լավ ե կրկնակի ապակիներ անցկացնել և պետք ե բոլոր ծակ ու ծուկերը լավ խցկել:

4. Տավարը լեռնային ցուց երգաներումն ել պետք ե ձմեռը ժամանակ առ ժամանակ դուրսը՝ մայուր ողում ման գա, վորքան այդ հնարավոր ե: Բոլոր կենդանիների համար մաքուր ողում ազատ շարժումներ կատարելը խոշոր նշանակություն ունի: Ազատ շարժումներ անելիս կենդանու մարմինը պնդանում ե և ավելի հեշտությամբ ե դիմադրում զանազան հիվանդությունների:

Մատղաշ կենդանիների համար մաքուր ողում շարժումներ կատարելն ավելի կարեվոր ե, քան մեծերի համար: Հորթին կանոնավոր մեծացնելու համար շատ կարեվոր են զրոսանքներ կատարելը և ընդհանրապես ազատ շարժումները, վորոնց շնորհիվ մարմինի բոլոր մասերը հավասարապես են զարգանում, ախորժակը լավանում ե, կերը լավ ե մարսվում և մարսված նյութերը ստամոքսի ու աղիքների պատերով մտնում են մարմնի արյան

մեջ ու ծառայում իրը և սննդանյութ։ Ընդհակառակը, յեթե մատղաշ կենդանիներին ձմբանը միշտ կապած ենք պահում, նրանք վատ են զարգանում, թույլ են լինում և հաճախակի հիվանդանում են։

5. Գոմը յեվ տավարը պետք ե մաքուր պահել։ Կենդանիների կաշին մի ժանի կարեվոր նպատակների համար ե. այն ե, ընչելու, մարմնի տաքությունը միյեվնույն աստիճանի վրա պահելու, մարմնի ֆրինչը դուրս նանելու յեվ մարմինը արտաքին վնասումներից պատշաճնելու համար։ Հասկանալի յե, վոր յերբ կաշին հիվանդանում ե, չի կարողանում այդ աշխատանքները կատարել։ Իսկ կաշին մեծ մասամբ հիվանդանում ե կեղտոտությունից։ Գիտնականները փորձել են, վոր յեթե կենդանու կաշվի $\frac{1}{3}$ մասը հիվանդանում ե և չի կարողանում վերեվ հիշված աշխատանքները կատարել, այդ դեպքում, չնայած լավ սնունդին և այլ լավ պայմաններին, նա սատկում ե։ Բացի դրանից կեղտոտ կաշի ունեցող տավարի կաթն ել հեշտությամբ ե կեխտոտվում։ Ուստի անհրաժեշտ ե հետեւվել, վոր տավարի մարմինը լինի մաքուր և չոր։ Պետք ե տավարին հաճախակի մաքրել և տակը ծղնոտ կամ կերի կրճունքներ փուել։ Յերբ տավարը չի մաքրվում և կեղտոտ ե մնում, նրա վրա սկսում են զարգանալ զանազան վողիներ և պարագիտներ։ Այդ պարագիտներն ապրում են կովի մարմնի հաշվին, խրվում են նրա կաշվի մեջ և ծծում նրա արյունը։ Յեթե այդ պարագիտները շատ են լինում կովի արմնի վրա, նրանք նախ շատ են անհանգստացնում կովին և դրանով ազդում կաթի քանակի վրա, յերկրորդ՝ կարող են մեծ քանակությամբ արյուն ծծել։ Իսկ մենք գիտենք, վոր արյունն առաջ ե դալիս կերից։ հետեւվաբար կեղտոտ կաշի ունեցող տավարը պետք ե ավելի շատ կեր ուտի, վորպեսզի պարագիտների ծծաց արյան տեղը հանի։ Դա ձեռ-

նտու չե տավարատիրոջ համար, վորովհետեւ ավելորդ կեր ե կորչում:

Վորպեսզի տավարը լինի մաքուր և չոր, պետք ե որական յերկու անգամից վոչ պակաս նրա տակը փոխել: Ավելի լավ ե ծղնոտն ու կրծունքը քիչ-քիչ փռել տակը, բայց շուտ-շուտ, քան թե մի անգամ և շատ: Տավարի տակը փռելու համար ամենալավը ծղնոտն ե կամ հարդը հաշված ամեն մի գլխին 5-6 փունտ: Կերի թերմացքը նույնպես շատ լավ ե:

Բայց բավական չե միայն տավարի տակ չոր բան փռել. հարկավոր ե ամեն որ խոզանակով (չուկով) մաքրել կատին: Յեթե զոմը տաք ե, շատ ցանկալի յե ձմրանը տավարին մի քսնի անգամ լվանալ գոլ ջրով ու կանաչ սպոնով: Լվանուուց հետո պետք ե լավ չորացնել մարմինը, վոր չմրսի:

6. Պետք ե աշխատել ձմրանը, մանավանդ սար սեղերում, տակարին ջուր տալ գոմում: Ջուրը պետք ե ամառվա ջրի պես տաք լինի, $15^{\circ} - 20^{\circ}$ ՑԵԼՍ:

Չի կարելի սառտիկ ցուրտ ժամանակ տավարին տանել գետը կամ առու՝ ջրելու համար, վորովհետեւ տավարը ցրտումը վատ ե խմում, կենդանիներն իրար խփում-հրում են, սառույցի վրա սայթաքում և վնասում են իրենց վուճներն ու պճեղները: Բացի այդ սառը ջուր խմելուց հետո կովս սկսում ե դողալ, սրթսրթալ և ամբողջ մարմինը սառչում ե: Իսկ մենք գիտենք, վոր նա իր սառած մարմինը և խմած սառը ջուրը տաքացնելու համար պետք ե ավելի շատ կեր ընդունի, վորը նույնպես ձեռնտու չե տավարատիրոջը: Սառը ջրից կովերը կարող են և հորթատել:

Տավարի խմելու ջուրը պետք ե լինի մաքուր, առանց կողմնակի համ ու հոտի:

Արի ավագանեներ: Տավարին սառը ջուր չտալու նպատակով գոմի մի անկյունում շինում են 2 հատ Մի

ավագան։ Ամեն մի ավագան պետք է այնքան ջուր տանի, վոր բավականացնի տավարին մի ամբողջ որ։ Մինչեվ մի ավագանի ջրի պրծնելը, մյուս ավագանի միջինը կամաց-կամաց գոմի տաքությունից կտաքանա։ Այդպես հերթով լցնում ու գործածում են ջուրը։ Ավագանների մեծությունը կախված է տավարի քանակից։ Ամեն մի կովի համար հարկավոր է պատրաստել որական 3.5 դույլ ջուր։

Ավագանները լցնելու համար ջուրը դրսից գույլերով (վեդրոներով) բերելն անհարմար է, վորովհետեւ այդ ժամանակ գոմի դուռը հաճախակի բաց ու խուփ անելիս գոմը կսառչի։ Ուստի դրա համար ավագանների կողքի պատից դեպի դուրս անցը են բաց անում։ Ջուրը դրսից դալիս—հոսում է պատի միջով անցնող նավով և թափվում ավագանների մեջ։ Յեթ վոր ավագանները լցվում են ջրով, անցքը փակում են։ Ավագաններից ջուրը նույնական դույլերով չեն կրում. տանում ու լցնում կովերի խմելու տաշտը, այլ տուանձին շինած նավով ջուրը հոսում է և զնում, թափվում տաշտերի մեջ։ Մեծ տնտեսություններում ջուրը հատուկ յերկաթե խողովակներով է հոսում-թափվում խմելու տաշտերի մեջ։

Այնտեղ, վորտեղ անհնարին է այս ձեվով ջուր տալը, լավ է ջուրը կրել վեդրոներով և լցնել ավագանները ու այնուհետեւ ել ավագաններից լցնել խմելու տաշտի մեջ։ Վերջապես պետք է աշխատել տավարին շատ սառը ջուր չտալ։ Տավարատիրոջից է կախված թե ինչ ձեվով նա այդ կիրականացնի։

7. Յեթե կրվող կովերի հետ կոպիտ ենք վարվում յեվ անհանգստացնում ենք, նրանք կաթը պահանջնում են։ Զոլետք է կովերին շուտ-շուտ փոխել մի տեղից մյուս տեղ։ Զոլետք է ծեծել բոռնցքով կամ վոտով խփել կամ հրել և ընդհանրապես այս կամ այն

կերպ անհանգստացնել։ Կովի հետ պետք է քնքույշ վարվել և նա կվարձտորի ձեզ հենց նրանով, վոր ձեզ շատ կտթ կտա։


8. Յեթե ուզում եք տավարին կանոնավոր ու խնայողաբար կերակրել, մսուր կամ ախոռը այնպես պետք է սարքեք, վոր կովերը կերը չթափեն վոտերի տոկ։


Մսուրը կամ ախոռը և ջրի տաշտը սովորաբար շինում են տախտակից կամ ցեմենտից. գյուղական տնաեսություններում համարյա միշտ տախտակից են շինում։

Հաստկ առած կաթնատու տավարի մսուրի լայնությունը պետք է լինի 1 արշին, իսկ մանր տավարինը՝ ^{3/4} արշին։ Մսուրի հետեւի կողմից խփում են 8 վերշոկ բարձրություն ունեցող մի տախտակ, վորպեսզի կերը այդտեղից ներքեվ չթափվի։ Յեթե մսուրը ցեմենտից ե շինած, բարձրությունը հատակից պետք է լինի 6-8 վերշոկ, իսկ յեթե տախտակից ե, 8-12 վերշոկ։ Մսուրի տախտակները պետք է քիվ կպած լինին իրար և ջրի տաշտին, վորպեսզի կերը նրանց արանքից չթափվի ներքեվ։

Մսուրին անմիջապես կպած ե լինում ջրի տաշտը։ Ջրի տաշտն այնպես են շինում, վոր նրա վերին յեզերքը կպչի ուղիղ մսուրի յեզերքին. (տես նկ. 4) Ջրի տաշտի բարձրությունը հավասար պետք է լինի մսուրի բարձրությանը։ Փայտե ջրի տաշտը չպետք է կպած լինի գետնին, այլ նրա և հատակի միջեվ պետք ե մնա ազատ տարածություն ող խաղալու համար, թե չե տաշտը շուտ կը փչանա։ Մսուրն ու ջրի տաշտը չպետք է լինեն այնքան բարձր, վոր կովը դժվարանա հասնել և ուտել։ Ջրի տաշտի լայնությունը պետք է լինի 8 վերշոկ, իսկ խորությունը՝ 4 վերշոկ։ Տաշտն այնպես պետք է լինի դըրքած, վոր ջուրը նրա յերկու ծայրերում հավասար բարձրության վրա կանգնի։

Վորպեսզի կովը վոտքերով չբարձրանա մսուրի վրա և կերն այնտեղից վոտքերի տակ չթափի, դըր համար





Նկ. 4. Կովը կապած մառերի մոտ.

Մի տաշտի հետեւի կողմից դեպի առաստաղը ուղղահայց կերպով սյուներ են խփում և պատրաստում են քառակուսի շրջանակ, վորի միջից միայն կովը կարող է գլուխը մտցնել և համնել մառերին կեր ուտելու համար (տես նկ. 4): Շրջանակի բարձրությունը $1\frac{1}{4}$ արշին պետք է լինի, իսկ լայնությունը՝ ամեն մի կովի համար 1 արշին $10\cdot 12$ վերշոկ: Ուտելու ժամանակ կովը պետք է գլուխը ներս կոխի շրջանակի անցքից: Շրջանակին ամբացվում է սյուներին (տես նկ. 5):




Նկ. 5. Կովը մառերին կապելու ձեվը

Նկար 6. ցույց ե տալիս անշարժ մսուրի դիրքը
գոմում:

Ի հարկե, կարելի յե և ուրիշ ձեզի մսուրներ պատ-
րաստել, բայց միշտ ել պետք ե այնպես շինել, վոր հար-
մար լինի տավարի համար և կերը չթափվի վոտքերի տակ:

9) Տավարին կանոնավոր ձեզով պահելիս ու կերակ-
րելիս կերը տրվում է վոչ թե աչքի չափով, այլ քաշով.
ուսի գոմում պետք է ունենալ կըեռք կեր բաւելու հա-
մար: Կշեռքն այնպես պետք ե հարմարեցնել, վոր կա-




Նկ. 6. աճշարժ մսուրի դիրքը գոմում

քելի լինի արագ և առանց դժվարության կշռել կերը:
Ուժեղ կերերի համար սովորաբար մի առանձին չափ են
ունենում (միաման), իսկ կոպիտ կերերի համար քթոց:
Մի անգամ կշռում են դրանց միջի կերը և այնուհետեւ

բաժանում են դրանցով կերերը և ամեն անգամ չեն կը ռում:

10) Տավարը կանոնավոր պահելու և կերակրելու ժամանակ կերը տրվում է համապատասխան կթի քանակին, ուստի անհրաժեշտ ամեն սի կովի կաթն առանձին կը ունել կամ չափել, այսինք, փորձնական կիթ անել, զոնե 10 որը մի անգամ: Առանց կաթը կշռելու հնարավոր չի տավարին կանոնավոր կերակրել, վորովհետեւ յեթե ամեն մի կովի տված կաթի քանակն առանձին չի մանանք, չենք կարողանալ վորոշել, թե վորքան կեր ե հարկավոր նրան տալ, վոր շարունակի գոնե նույն քանակությամբ կաթ տալ և չպակսեցնի:

Նկ. 7-ի վրա ցույց ե տրված հասարակ կշռոքը, վորով կշռում են կոպիտ կերերը:



Նկ. 7. Կովի չափելը կայուվեր-օտքառվի ձեզով.

b և յերկարությունն ե
c-d Փաթը

Յեթե հնարավոր ե, լավ կը լինի ամեն որ ամեն մի կովի տված կաթը կշռել, վորովհետեւ դրանով կարելի յե հակել թե կովի առողջության և թե մաքուր կթելու վրա: Յեթե որակուն կիթերի մեջ մեծ տարբերություն յերեվա,

այդ ցույց կտա, վոր կամ կովը հիվանդ ե, կամ լավ չե կթված և կամ լավ չի կերակրված:

11) Կովերը միյեզսույն մեծության չեն լինում. կան խոշոր և մանր կովեր. Ամեն մարդ ել հասկանում ե, վոր խոշոր կովս ավելի շատ ե ուտում, քան փոքրը. Բայց վորպեսզի ճիշտ կերպով գիտենանք, թե մի կովը մյուսից վորքան ավելի կամ պակաս կեր ե պահանջում, պետք ե իմանանք ամեն մի կովի կենդանի քաշը. Կովի կենդանի քաշը կարելի յե իմանալ կշռելով և չափելով:


Կենդանի քաշը չափելով իմանալու շատ ձեվեր կան. Ամենաճիշտ ձեվը Կլյուվեր Շտրառլինն ե, վորը ոռուական չափերի յե վերածել Ավ. Ա. Քալանթարը. Այդ ձեվը շատ անգամ կշռոքների միջոցով ստուգվել ե և տվել ե բավականին ճիշտ հետեւվանքներ:

Այս ձեվով կովը չափելու համար այսպիս ենք անում. կովին կանգնեցնում ենք ուղիղ տեղ բոլորովին ուղիղ դիրքով. Հետո սանտիմետրների բաժանված ոռուետով չափում ենք կովի մարմնի յերկարությունը սկսած երու սրանկյունից մինչեւ նստոսկով թումբը, ինչպես ցույց ե տրված նկ. 7 ում:

Ապա ոռուետը դարձնելով մեջքի կողմը՝ չափում ենք կրծքի փաթը արմունկից մի թիզ հեռու, ինչպես նկարում ցույց ե տրված. Չափելու ժամանակ պետք ե ոռուետը մի թեթեվ ձգել, վոր լավ կպչի մարմնին. Այսպես վերցնելով յերկարության ու փաթի չափերը, Կլյուվեր Շտրառլի աղյուսակի միջոցով հաշվում ենք իսկական քաշը ֆուտերով. Այսպես որինակ, յեթե մարմնի յերկարությունը 156 սանտիմետր ե, կրծքի փաթը՝ 180 սանտ. ապա այդ աղյուսակով կենդանի քաշը կը լինի 1088 գր. այսինքն 27 ք. 8 գրվ. (տես տախտակը գրքի վերջում):

Յեթե սանտիմետրների բաժանված ոռուետկա չկա, կարելի յե վերշոկների բաժանված ոռուետկայով չափել: (տես. նկար 8) (Տրուխանովսկու յեղանակը):

Դրա համար վերջոկներով չափում են, ինչպես նըլկարում ցույց ե տրված, մարմնի յերկարությունը (սկսած ուստի գագ. մինչեվ պոչի արմատը), ապա չափում են կրծքի փաթը (թիակի հետեվից) և ստացված թվերը իրար հետ բազմապատկում են։ Ստացված թիվը ցույց ե տալիս



Նկար 8

Կենդանի քաշը արտահայտված ֆունտերով։ Որինակ, յենթադրենք բազմապատկելուց ստացվեց 600. այդ կնշանակի, վոր կովի կենդանի քաշը 600 ֆունտի է հավասար, այդ թիվը բաժանելով 40-ի վրա, կստանանք կենդանի քաշը փթերով, այսինքն 15 ֆութ։

Ինչպես վոր առանց կաթը կշռելու հնարավոր չի կովին կանոնավոր կերպով կերակրել, այնպիս և առանց կենդանի քաշն իմանալու հնարավոր չի վորոշել թե վորքան կեր ե հարկավոր նրա կյանքը ոլահպանելու համար։

Բացի կիթը և կենդանի քաշը պարզելուց, նախ քան կանոնավոր կերակրելուն անցնելը, հարկավոր ե կովին լսվ նայել և վորոշել նրա չաղությունը կամ լզարությունը, ծնելու ժամանակը, ցուլի դալու ժամանակը, այլինք

քննել յեղած կերերը՝ նրանց լույն ու վատր վորոշելու
համար:

3. ՏԱՎԱՐՈՒ ԽՆՉՊԵ՞Ս ՊԵՏՔ Ե ՊԱՀԵԼ ԱՄԱԹՔ

Յեթե ձմբանը բավականին քանակությամբ լով կեր
ունենք և դոմը լով ե շինգած, կստանանք հավասարաչափ
և բարձր կիթեր: Իսկ ամառը, արոտում յեղած ժամա-
նակ, կովի կիթերը տատանվում են նախ կանոչ խոտի
վորակից, ապս նայելի յեղաճակից: այս ե յերբեմն շողից,
յերբեմն ցուրտ քամիներից և անձրեվներից: Բացի այդ
ձմբանը սովորաբար տվելի լավ ենք հետեւվում տավարին
ու կերակրում, մինչդեռ ամտուր՝ զյուղացիներն ի-
րենց տավարը պահ են տալիս տավարածին: Իսկ տավա-
րածները մեծ մասամբ անչափահաս կամ պառաված մար-
դիկ են լինում, յերբեմն ել խելքից թեթեկ մարդիկ: Այդ-
ովիսի տավարածները խփում, ծեծում են տավարին, ուր
մնաց թե լավ արածացնեն կամ թե չե ողնեն պատահա-
կան հիվանդությունների ժամանակ:

Տավարին արածացնելու աննպաստ պայմաններից
մեկն ել արոտի հետավորությունն է: Տավարն ամեն որ
արոտ գնալու և հետ գալու համար յերկար ճանապարհ
ե կտրում: Տավարն արոտ գնալ գալիս ուժ ե կորցնում,
իսկ մենք զիտենք, վոր այդ ուժը ստացվում ե կերից,
հետեւսբար արոտանեղում ստացած կերի մի մասը փո-
խանակ կաթ գառնալու, ծախսվում ե գնալ - գալու
վրա: Բացի այդ տավարը գնալ-դալուց հողնում ե, վորը
նույնպես ազդում ե կաթի քանակի վրա:

Տավարը հանդում արածացնելու զլիսավոր պակասու-
թյունները հետեւվյալներն են՝ 1. վատ արոտները և նը-
րանց հետու գտնվելը զյուղից, զսմից կամ ուրթատեղից
2. վատ տավարածները, վորոնք կոպիտ են վարվում տա-
վարի հետ, 3. յեղաճակի խխտ փոփոխությունները - շող,
ցուրտ և այլն. 4. միջատներն ու պարագիտները, վարոնք

անհանգստացնում են տավարին և 5. վատ ճանապարհները:

Նտխքան տավարի կերակրելու յեղանակին անցնելը
մի քիչ կանգ առնենք արոտների զլիսավոր պակասու-
թյունների վրա:

4. ՏԵՎԱՐԻ ՎԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ՎԱՏ ԱՐՈՏՆ Ե

Բնական արոտներն այն դրությամբ, ինչ վոր մենք
ներկայումս ունենք, մեր անասնապահությունը զար-
գացնելու ամենամեծ արգելքներից մեկն են հանդիսա-
նում: Վորպես ընդհանուր կանոն, անասնաբուծությամբ
գրաղվելիս մենք անպայման պետք են հաշվի առնենք մեր
ունեցած արոտը: Ցեթե պահում ու բուծում ենք լավ
կաթնատու կամ լով մսացու տավար, առանց հաշվի առ-
նելու այն հանգամանքը, վոր մեր արոտը տավարին չի
կշտացնում և մենք ել նրան տանը լրացուցիչ կեր չենք
տալիս, ապա հասկանալի յե, վոր ամառվա ընթացքում
մեր տավարի կաթնատվությունը կպակասի և նա մոխց
կընկնի: Վորովհետեւվ մեր արոտները, մարգագետինները և
ընդհանրապես կերի պայմանները վատ են, դուրս են գա-
լիս, վոր մենք կարող ենք զարգացնել միայն քիչ կաթ
տվող և մանր տավար: Շատ տավարատերեր հենց այդպես
ել անում են. նրանք պահում են այնպիսի տավար, վորը
հեշտությամբ են դիմանում իրենց վատ արոտներին և
պայմաններին: Հասկանալի յե, վոր այս դեպքում ա-
նասնապահությունը զարգացնելու մասին խոսք լինել չի
կարող:

Կան ուրիշ տավարատերեր, վոր առանց լավացնելու
արոտներն ու մարգագետինները, իրենց ազնվացեղ և կաթ-
նառատ տավարն ուղարկում են ճահճային կամ
քարքարոս ու խոտով աղքատ արոտները: Պարզ է,

վոր այդ դեպքում կատարյալ անհաջողության կհանդիպեն: Ազնվացեղ, քնքուշ տափարը վատ արոտում իրեն համար բավարար կեր չի գտնի, կղարի, կաթը կպակսեցնի և կհիվանդանա: Հետեփաբար վերսիշյալ յերկու դեպքումն ել անասնապահության զարգացման մասին խոսք լինել չի կտրող:

Մնում ե ուրեմն յերրորդ ճանապարհը, այն ե՝ լավացնել արոտներն ու մարգագետները. իսկ այդ նողատակին հասնելու համար հարկավոր ե չորացնել ճահճուտ ու ճկուտ տեղերը, արմատահան անել թփերն ու քոլերը, հավաքել քարերը և բացի այդ կանոնավոր մշակել արոտատեղերը, այսինքն ցաքանել նոր լավորակ սերմեր ցանել լավ տեսակի խոտ ստանալու համար, փեյինով, մոխրով և այլ նյութերով պարարտացնել և այլն: Այս ձեվով մշակված արոտատեղը կտա շատ առատ և սննդարար խոտ և հնարավոր կլինի պահել հասարակ տափարի փոխարեն ազնվացեղ, կաթնառատ տափար: Արոտատեղերն այս ձեվով մշակելը ամենամեծ միջոցներից մեկն ե մեր տեղական տափարի վորակը բարձրացնելու համար: Ուրիշ խոսքով հարկավոր ե վոչ թե տափարը հարմարեցնել մեր աղքատ արոտներին, այլ արոտը տափարի պահանջներին: Յեվ քանի վոր մենք մեր արոտատեղերը չենք չորացնում, քարերից չենք մաքրում, չենք մշակում ու պարարտացնում, նրանք տարեց-տարի ավելի վատանում են և ուրեմն մեր տափարն ել քանի զնում՝ մանրանում ե ու վատանում:

Ուստի անհրաժեշտ ե, վոր սմենալուրջ ուշադրություն դարձնի լճմեռվա և առանձնապես ամառվա արոտատեղերը կարգավորելու վրա: Բացի հիշած կուլտուրական միջոցներից, վորոնք անհրաժեշտ են բնական արոտների յեկամուտը բարձրացնելու տեսակետից, միտքամանակ անհրաժեշտ ե նպատակահարմար ձեվով վճռել արոտատեղերից ոգտվելու հարցը՝ թե հասա-

րակությունների, թե արտելների և թե առանձին տավարտերերի համար։ Միայն այդ բարեկարգությունները մտցնելուց հետո կարելի կլինի լրջորեն մտածել մեր տավարի ազնվացման մասին։ Վերեվ հիշված կուլտուրական միջոցների գործադրումը մեծ չափով կախված է արտատեղերի ոգտագործման ձեվերից։

Խոշոր հշանակություն ունեն և մեր հանգերի ճանապարհները։ Վոչ մի ծախսի առաջ չպետք է կանգնել մեր արոտների ճանապարհները կանոնավորելու գործում։ Վաս, քարքարոտ և գիրտ ճանապարհները տավարի համար տանիշանք են։ Ով կարողացավ ամենից շուտ տղատել իր տավարն այդ տանիշանքից, նա ամենից շատ կշահի։

5. ՄԻ ՔԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԱՄԱԲԻՇ ՏԱՎԱՐՆ ԱՐՈՏՈՒՄ ՊԱՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ.

Նախ քան տավարն արոտ հանելը պետք է նայել նրանց սմբակները, սլաղները։ Յեթե պահանջված յերկար են, պետք է կտրել. թե չե դրսում իկուտրվեն և տավարը կկաղա։ Անհրաժեշտ ենայեվ կովերի յեղջյուրների (կոտոշ) ծայրերը սղոցել, վորպեսզի կովերն իրար չվիրավորեն։

Արոտ ուղարկելու առաջին որը հարկավոր է տավարին առավոտները ամեն մեկին 6-8 ֆ. խոտ անալ։ Յեթե խոտ չկա, կարելի յե և դարման տալ։ Դարմանը պետք է թրջել աղաջըրի մեջ և խառնել ալյուրի թեփի հետ և մոտավորապես 3-4 ֆ. տալ ամեն մեկին՝ խել ավելի կաթնառատ կովերին մինչեվ 8 ֆ. թեփ։

Յեթե արոտը աղքատ է և տնտեսության մեջ կանաչ խոտ չկա, այդպես շարունակում են կերակրել ամբողջ ամառը։ Ի հարկե, նայած թե ինչպիսի արոտ է և ինչքան կաթ է տալիս տավարը, ըստ այնմ ել պետք է տալ լրացուցիչ կերը։ Վորքան արոտը աղքատ է, իսկ կովերը կաթնառատ, այնքան ավելի շատ պետք է տալ լրացուցիչ կեր։

Ամառները մեզ մոտ՝ սարերում, շատ դժվար է հետեւի այս խորհուրդներին, քանի վոր այնտեղ անհնարինե բավականի չափով կեր ունենալ տավարին լրացուցիչ կեր տալու համար։ Այդ վերաբերում է մանավանդ այն տավարատերերին, վորոնց ընակավայրը գտնվում է սարիուրդից հեռու, այսինքն քոչվորներին։ Նրանք միանգամայն զրկված են տմառները սարերում գոնե կթի կովերը լրացուցիչ կերով կերակրելու հնարավորությունից։ Սակայն այն տավարատերերը, վորոնց ընակավայրը մոտե ուրդին և վորոնք չեն քոչում, նրանք միշտ ել ի վեճակի յեն կեր պահելու և կթի տավարը տմառները լրացուցիչ կերակրելու։ Եվեյցարիայում սարերը բաժանված են տավարատերերի վրա, վորոնք այնտեղ վորոշ հարմար հողաբաժիններ են ջոկում և գործ են ածում իբրեւի խոտհարք ու միշտ սարերում նրանք այդ նոլատակի համար խոտ են ունենում, վորով և յերեկոները կերակրում են կթի տավարին։

Յերբ մեզ մոտ ել քոչը կվերանա և սարի արստատեղերն այնպես կբաժանվեն, վոր յուրաքանչյուր հողամաս իր հատուկ մշակողը (համայնք, արտել, ընկերություն կամ անհատ) կունենա, այդ գեպքում ամեն մեկը հնարավորություն կունենա այդ սարերում ամառվա արոտի կերի պակասության գեպքում լրացուցիչ կեր ունենալու և կերակրելու իր տավարը դրանով։

Յերբեմն շատ կանաչ խոտ ուտելիս տավարը գործուծ է ստանում։ Դրա առաջն առնելու համար պետք է կանաչ կերի վրա ցանել ջրի մեջ լուծված կավիճ։

Չպետք է տավարին առավոտյան շաղին կամ թացժամանակ առվույտատեղերում (յոնջատեղ) արածացնել։ Դրանից տավարը կարող է վրկել ու արաքել։ Հարկավոր ե սկզբում արածացնել սովորական արստում և հետո տանել առվույտի վրա կամ թե չե տանը մի քիչ կերակրել

և հետո արոա ուղարկելու Փքվելու դեպքերի համար տավարածը պետք ունենա առանձին գործիք-բիզ (տրոակար)՝ տավարի փորն ուռած ժամանակ ծակելու համար և պետք է ծանոթ լինի նրա գործածության հետ:

Յեթե առավոտյան ցուրտ ե լինում և յեղյամը նոտած՝ չպետք է տավարը դուրս թողնել արածելու, քանի դեռ յեղյամը չի հալվել, հակառակ դեպքում հղի կովերը կարող են հորթատել:

Արոտավայրում պետք է լավ, մաքուր ջուր լինի, ջրի տեղը պետք է հարմար լինի, վոր տավարը կարողանա հասնել ու կռւշտ խմել:

Ամառվա շող ժամանակ տվելի լավ է տավարն արածացնել յերեկոյան, գիշերը և կանուխ առավոտյան և վոչ թե կեսորին:

Յեթե տավարն ամառը արյուն է միզում (շոռում), պետք է նրան մաքրել խողանակով (չոտկով), լվանալ աղաջրով և քսել բենզինի յուղ:

Այս ձեվով տավարն ապահով կլինի այդ հիվանդությունն առաջացնող տիզերից:

Յեթե հարմարություն կա, լավ կլինի տավարին ամառը լողացնել, բայց զգուշությամբ. չպետք է քշել ջրի մեջ հոգնած ու քրտնած ժամանակ, թե չե կարող ե մըսել:

Զի կարելի նախիրի մեջ միաժամանակ 2 կամ մի քանի ցուլ թողնել, վորովհետեւ նրանք կկովեն իրար հետ և կվսասեն իրար: Բացի այդ մըցելով իրար հետ նրանցից ամեն մեկն ուզում է ինքը տիրանալ ցուլ յեկող կովին և այդպիսով փախցնում են կովին և իրենք ել վաղում նրա հետեւից: Մեր լեռնոտ, լանջ տեղերում այսպիսի դեպքերում ցուլերից հալածվող կովը շատ հաճախ գլորվում է ցած ու ջարդվում, իսկ նրա հետեւից յերբեմն և ցուլերը:

U n u n II

ԻՆՉՊԵՍ ՊԵՏՔ Ե ԿԵՐԱԿՐԵԼ ԿԱԹՆԱՏՈՒ
ՏԱԿԱՐԻՆ ԴԱՆԻԱՑՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ
ԶԵՎՈՎ,

6. Ի՞նչո՞ւ ՊԵՏՔ Ե ԿԱԹՆԱՏՈՒ ՏԱՎԱՐԻՆ ԿԵՐԱԿՐԵԼ
ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԻՐ ՔԱՇԻ ՀԱՄԵՄԱՏ

ԹԵ ԻՆՀ ՎՈՐԱԿԻ ու Քանակի կերպետք ե տանք
կաթնատու տավարին, այդ մեզանից է կախված. մենք
կարող ենք նրան տալ շատ կամ քիչ, շավ կամ վատ կեր-
ի հարկե, լավ ու բնականն այն կը լիներ, յեթե մենք
թողնելինք, վոր տավարն իր ցանկության համաձայն
ջոկեր այս կամ այն կերը և ուտեր այնքան, վորքան ինքը
կուզենար, սակայն գործնականում այդպես չի կարելի
անել, վորովհետեւ այդ դեպքում տավարը բնազդորեն
կուտեր չափից դուրս, ավելի քան իրեն հարկավոր ե-
բացի այդ, անտեսության համար ել դա ձեռնուր չե-
քանի վոր կովերից շատերը կուտեն ու կը փչացնեն մի
քանի անգամ ավելի արժեք ունեցող կեր, քան թե իրենց
տված կաթն արժե։ Այդ պատճառով մենք ստիպված ենք
վերցնել զանազան տեսակի կերեր և կազմել նրանցից
ամեն մի տեսակի տավարի համար առանձին որական
կերաբաժին՝ միշտ ի նկատի ունենալով տավարի կեն-
դանի քաշը, կաթնատվությունը և կամ կատարած աշ-
խատանքը։

Առանձնապես մեծ նշանակություն ունի կենդանի
քաշով կերակրելը կովին:

Կովի տված կաթի քանակը կախված է նրա ստացած
կերից. Վորքան լավ կերակրենք կովին, այնքան նա շատ
կաթ կտա, Բայց պետք է հիշել, վոր զանազան տեսակ
կովեր են լինում. կան կովեր, վոր վորքան ել լավ կե-
րակրենք, շատ կաթ չեն տա, Բացի այդ մյեմնույն

կովը տարբեր ժամանակներում տարբեր քանակությամբ կաթ է տալիս։ Այսպես որ ծնելուց հետո կովն ավելի շատ կաթ է տալիս քան ցամաքելուն մոտենալու ժամանակ, յերբ նա կաթը քիչ-քիչ ոլակսեցնում է, թեկուղ նրան կերակրելիս լինենք նույնքան լավ վորքան տռաջնամակ, մեկ ուրիշ որինակ. այն կովը, վոր որական տալիս է 20 շիշ կաթ, ի հարկե ավելի կեր է ոլահանջում, քան թե այն կովը, վոր որական տալիս է 2 շիշ կաթ։ Նույնպես չի կարելի միատեսակ կերակրել տարբեր կենդանի քաշ ունեցող կովերին։ Որինակ՝ յեթե 30 փութ կենդանի քաշ ունեցող կովին տանք նույնքան կեր, վորքանով 15 փութ կենդանի քաշ ունեցող կովը հազիվ է կշտանում, այդ դեպքում 36 փթանոց կովը սոված կը մնա։ Կամ թե հակառակը, 15 փթանոց կովին տանք այնքան կեր, վորքան բավարար է 30 փթանոց կովի համար, այդ դեպքում ել 15 փթանոց կովը կը ստանա ավելորդ կեր։ Նշանակում է, պետք չի կերակրել բոլոր կովերին միատեսակ, այլ ամեն մեկին պետք է կերակրել իր կենդանի քաշին համապատասխան։

Շատերը մինչեվ այժմ այն կարծիքին են, թե վորքան տավարին շատ ու լավ կեր տանք, այնքան շատ կաթ կը ստանանք և զարմանում են, վոր յերբեմն կերի քանակը պակսեցնելիս կովերը կաթն տվելացնում են։ Այդ տոթիվ մենք կը հիշեցնենք տավարատերերին, վոր կովի ստամբուր կարող է ընդունել յերեք անգամ ավելի կեր, քան քեզ կարող է մարսել, և վոր կովերը, յեթե կերը համեղ է, ուտում են չափից ավելի, կշտանալուց հետո ել։ Մենք դիտենք, վոր ստամբուր մտած սնունդը մարսվում է ըստամբուի դեղձերի արտադրած հյութի շնորհիվ, իսկ այդ հյութը անսպառ չե. Նա միայն վորոշ քանակությամբ կեր կարող է մարսել, իսկ ավելորդ ընդունված կերը ստամբուում չի մարսվում և նույն ձեզով դուքս է գտնվու և իզուր կորչում։ Այդ նշանակում է, վոր նրանից

կաթ չի ստացվում. բացի այդ, ավելորդ կերը ծանրաբեռնում է ստամոքսը և նրան անհանգստություն պատճառում. Առաջ ծանրաբեռնված ստամոքսը ճնշում է թռքերը և դրանով խանգարում կանոնավոր շնչառությունը, իսկ յերբ շնչառությունը կանոնավոր չե, արյունն ել լավ չի մաքրվում, ուստի կաթի կազմվելն ել դանդաղում է: Այստեղից պարզ է, վոր յեթե մենք թույլ չտանք, վոր կովը չտփից դուրս ուտի և ծանրաբեռնի իր ստամոքսը, այդ գետքում կաթը կը շատանա, յեթե նույն իսկ կերը պակսեցնենք:

Այսպիսով մենք ավելորդ անգամ գտիս ենք ու համոզվում, վոր չի կարելի կերակրել տովարին աչքի չափով, առանց կշռի ու հաշվի:

Ճիշտ չեն մտածում այն մարդիկ, վորոնք ստում են. «Ինձ լավ ու շտո կեր տվեք, ես գիտեմ վոնց կը կերակրեմ»:

Նրանք պետք ե իմանան, վոր բացի լավ և առառ կեր ունենալուց անհրաժեշտ է կերակրելու ձեվն ել իմանալ, հարկավոր է ամեն անգամ կազմել որական կերաբաժին՝ համապատասխան կովի տված կաթի, կենդանի քաշի և այլն: Ուրիշ խոսքով հարկավոր ե կերակրել կանոնավոր և նորմայով: Յերբ կենդանուն կերակրում են կարի յեվ կենդանի բաշի համեմատ, ասում են, վոր տավարին կանոնավոր են կերակրում կամ նորմայով են կերակրում:

Ճիշտ որական կերաբաժին կազմելու համար պետք ե իմանալ՝ 1) առանձին կերերի համեմատական արժանիքը մննդի տեսակետից, 2) վորքան կեր և հարկավոր զանազան կենդանի քաշ ունեցող կովին՝ իրեն առողջ պահելու համար, և 3) վորքան կեր և հարկավոր տալ կովին վորոշ քանակությամբ կաթ ստանալու համար:

Նախքան այդ հարցերին պատասխան տալը հարկավոր է բացատրել հետեւյալը.—

Կաթնատու տավարի կերակրման համար մենք կարող ենք ոգտվել միջին մոտավոր տվյալներով, թվերով. իսկ շատ ճիշտ տվյալներ կամ նորմաներ ստանալու համար պետք է փորձ անենք:

Պետք է փորձի համար կերակրենք ամեն մի կովի առանձին և միաժամանակ փորձենք ամեն մի տեսակի կերի արժանիքը և այս դեպքում մեր ստացած տվյալներն ու նորմաները ճիշտ կը լինին միայն այն կովերի ու կերերի համար, վորոնց վերաբերմամբ փորձը կատարված է, իսկ ուրիշ կովերի ու կերերի համար դրանք կը լինեն միայն մոտավոր թվեր ու նորմաներ։ Բոլոր կենդանիները, թեկուզ նրանք լինեն մի տեսակի, հավասարութափ ընդունակություն չունեն միս կապելու, կաթ տալու և ույժ հավաքելու։

Նույնպես և բոլոր կերերը, վորոնք միյեվնույն չափով սննդարար չեն ու վոչ ել հավասարաչափ շուտ մարսվող Որինակ խոտ ել կա՝ խոտել։ Մի տեսակ խոտը կարող է յերկու անգամ ավելի սննդարար լինել քան մի ուրիշ տեսակը չնայած վոր յերկուսն ել խոտ են։ Հասկանալի յե, վոր կերակրելիս այս տարբերություններն ի նկատի պետք է ունենալ։

Մենք այս դրքում կտանք մոտավոր թվեր, վորպես դի տավարատերերն այդ թվերը հիմք ընդունելով կարողանան կազմել իրենց տավարի հատկություններին ու կերի պայմաններին համապատասխան կերաբաժիններ և սխալ-մունքների մեջ չնկնեն։

Ինչ ձեվով կամ նորմայով ել մենք կերակրելիս թվենք, անհրաժեշտ է միշտ կը ունել կաթը յեվ կերը։

Յեթե մենք կշռենք կաթն ու կերը, այն ժամանակ մենք կը պարզենք, թե վորքան զանազան տեսակի կեր է հարկավոր տալ, վորպեսզի ստանանք վորոշ քանակությամբ կաթ (որինակ մեկ դույլ)։

Յեվ մենք արդեն առուջուց կատարած փորձի հիման

վրա կարող ենք ասել, վոր վորպեսզի միջակ կաթնառու կովը նոր ծնելուց հետո որական մեկ դույլ կաթ տա, պետք է նրան տալ որինակ՝ 25 ֆ. լավ յերեքնուկ (սիրի-սիրի) և 6 ֆ. ցորենի թեփ։ Յեթե մենք այս քանակից ավելի կեր տանք, նա միյեվնույն է կաթը չի տվելացնի, ավելորդ կերը կը կորչի և գյուղացու զրադանը կը վնասի։

Կերերը կշռելու միջոցով նույնպես կարող ենք պարզել, թե տարրեր կենդանի քաշ ^{ունեցող} կովերին ինչ բանակությամբ և ինչ տեսակի կեր պետք է տալ։

Բացի այդ, կերն ու կաթը մշտապես կշռելու միջոցով կարող ենք պարզել նայել, թե ինչ չափով կարելի յե փոխարինել մի կերը մյուսով, այնպես, վոր վոչ կաթը պակասի և վոչ ել կովը լղարի։ Այս բանն իմանալը շատ կարելոր եւ և անհրաժեշտ։ Մանավանդ յերբ ցանկանում ենք թանկ կերերը փոխարինել եժան կերերով, այնպես պետք է անենք, վոր թանկ կերերին փոխարինող եժան կերաբաժինը միյեվնույն չափով սննդարար լինի։

Միայն խիստ հաշիվ պահելով մենք կկարողանանք ձեռնուու կերպով ոգտագործել մեր կերերը։ Առաջի սավարին կերակրելու աշխատանիների ժամանակ մենք սիւս պետք է աչքի առաջ ունենանք չափը, քայլ յեվ հաշիվը։ Առանց այդ յերեքի անհնար է շահավետ սննդություն վարել։

7. ԿԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Ա. Ինչից են կազմված կերերը

Այս բոլոր բուսական ու կենդանական ծագութ ունեցող մթերքները, վորոնք կարող են կենդանիների համար իրենց սնունդ ծառայել, կովում են կեր կամ ճարակ։ Սակայն կենդանիների ընդունած կերն ամբողջովին չի մնում նրանց մարմնի մեջ և դառնում կաթ, միս և այլն, այլ միայն աննշան մասը, իսկ մնացած մեծ մասը

գուրս ե զալիս մարմնից վորովես թրիք։ Հետեվաբար կերը բաղկացած ե յերկու տեսակ նյութերից 1) այնպիսի նյութերից վորոնք ընդունակ են մարսվելու և մնալու մարմնի մեջ և 2) այնպիսի նյութերից, վորոնք մարմնի մեջ չեն մարսվում և դուրս են թափվում վորպես թրիք։

Կերի միջի այն նյութերը, վորոնք կարող են ստամոքսում մարսվել, պիտանի դառնալ կենդանու համար, կոչվում են մարսվող սննդարար նյութեր։ Իսկ այն նյութերը, վորոնք ընդունակ չեն ստամոքսում մարսվելու և ողտավետ լինելու կենդանուն, կոչվում են անմարս կամ չմարսվող նյութեր։

Բայց շատ դեպքերում պատահում ե, վոր վոչ բոլոր մարսվող նյութերն են մարսվում ու յուրացվում կենդանու մարմնի կողմից, այլ նրանց մի մասը միայն։

Դրա պատճառները շատ են։ Այսպես որինակ. յեթե մենք տավարին տանք մեծ քանակությամբ համեղ կեր, նա կուտի ավելի, քան իր ստամոքսը կտրող և մարսել և այդ ավելորդ կերածն ի զուր կը կորչի։

Մննդարար նյութերի մարսվելը կախումն ունի նայել նրանից, թե ամեն մի կեր ինչ դրությամբ և ինչ քանակությամբ ե տրվում տավարին։ Որինակ, մի որվա կերաբաժնի մեջ մտած 10 ֆ. խոտը ավելի լավ կոդագործվի, քան թե 20 կամ 30 փունտը։ Կանաչ, թարմ խոտն ավելի լավ կմարսվի քան բորբոսնած խոտը և այն։ Բացի այդ տավարի հիվանդ կամ առողջ լինելն ել մեծ նշանակություն ունի։

Բ. կերերը բաժանվում են խմբերի

Համաձայն իրենց արժանիքի բոլոր կերերը մենք կարող ենք բաժանել հետեւյալ խմբերին. — 1) Զոր կոպիտ կեր, 2) կանաչ կեր, 3) Արմատապտուղներ և Պալորապլատուղներ, 4) Ուժեղ կամ խտացրած կեր և 5) կենդանական ծագում ունեցող կերեր.

1. ԶՈՐ ԿՈՂԻՏ ԿԵՐԻ խմբին պատկանում են ամեն տեսակի խոտեր, առվույտը (յոնջեն) յերեքնուկը, վիկը, կորնգանը, զանազան տեսակի դարմաններ և այլն։ Զոր կոպիտ կերը տարբերվում է մնացած կերերից նրանով, վոր հակառակ իր մեծ ծավալին, համեմատաբար պակաս սննդարար նյութեր ե պարունակում։

Տավարատիրոջ համար շատ կարեվոր ե իմանալ, թե ամեն մի տեսակի կեր ինչ ազդեցություն ե թողնում տավարի առողջության և կաթի վորակի ու քանակի վրա։

Բացի այդ կարեվոր ե իմանալ, թե ամեն մի կոպիտ կերից ի՞նչ քանակությամբ կարելի յեւ տալ տավարին, վոր նրան չվնասի։

Էնդհանրապես չոր կոպիտ կերը կերաբաժնի անհրաժեշտ և հիմնական մասն ե կազմում։ Ի հարկե, յեթե տավարին տրվում ե կանաչ խոտ, կարելի յեւ և առանց չոր կոպիտ կերի յոլա գնալ։

Յեթե կերաբաժնի մեջ չկան ուժեղ և ուրիշ վոչ կոպիտ կերեր, տավարի կանոնավոր մարսողությունը չի խանգարվում, իսկ յերբ կերաբաժնի մեջ չկա բավարար բանակությամբ կոպիտ կեր, այն ժամանակ տավարի մարսողությունը խանգարվում է։

Դրա համար շատ կարեվոր ե իմանալ, թե ամենաքիչն ինչքան կոպիտ կեր (խոտ, դարման) պիտի լինի կերաբաժնի մեջ, վորպեսզի տավարի կանոնավոր մարսողությունը չխանգարվի։

Յերբ վոր չափազանց շատ վո՞չ կոպիտ կեր ենք տալիս տավարին, (թեփ, քուսալ և այլն) դա վատ ե ազդում նրա առողջության և կաթնատվության վրա։ Մինչդեռ յերբ սովորականից ավելի կոպիտ կեր ենք տալիս, նկատելի ազդեցություն չե անում վոչ առողջության և վոչ ել կաթնատվության վրա, միայն թե տավարատիրոջ խոտի դեղը ժամանակից շուտ ե վերջանում։

Թե որական կերաբաժնի մեջ վորքան կոպիտ կեր

պետք ե մտնի, այդ վորոշվում ե կովի կենդանի քաշին համապատասխան և մեկ ել նայած թե մյուս կերերից վորը կա տնտեսության մեջ և ինչ քանսկությամբ։ Սովորաբար գործնականում ղեկավարվում են հետեւյալ կոպիտ-մոռավոր հաշվով։ Հաշվում են, վոր կովը բացի մնացած կերերից, յեթե չի ստանում արմատապտուղ կամ պալարապտուղ տակ զազար, կարտոֆիլ յեվ այլն), պետք ե ստանա որական միջին թվով ամեն սի փուր կենդանի ժամկեց 1 ք. չոր կոպիտ կեր։ Որինակ, յեթե կովի կենդանի քաշը 13 փութ է, ապա նա պետք ե ստանա մոտ 13 ք. կոպիտ կեր, իսկ յեթե կենդանի քաշը 21 փութ է, մոտ 21 ք.։ Կերաբաժնի մնացած մասերը կկազմեն ուժեղ կերերը կամ մի այլ կեր։ Իսկ յեթե տնտեսության մեջ խոտ ու դարման շատ կա և դրանք առատորեն կտրելի յե գործածել, այն ժամանակ կտրելի յե վերեվում բերած միջին նորմայից ավելի կոպիտ կեր տալ տավարին՝ առանց նրան վնասելու։ Շատ կոպիտ կերը տավարին չի հղփացնում, վորովհետեւ նա միշտ լավ մասը ջոկում-ուտում է, իսկ մնացածը թափում ե վոտքերի տակ։ Բայց թանկ կոպիտ կերից այդպես առատությամբ տալը ձեռնտու չե։ Յեթե տավարին բավական ժանակ կությամբ արմատապտուղ ե տրվում, այն ժամանակ կարելի յե կոպիտ կերի ժանակը պակսեցնել միջին նորմայից ել ցածր։ Այսպես որինակ, 24 փութ կենդանի քաշունեցող կովին 60 ք. շաղկամ տալու դեպքում բավական է միտյն 12 ք. չոր կոպիտ կեր տալ։ Իհարկե, կաթնատու կովին բացի վերոհիշյալ կերերից անհրաժեշտ ե տալ նայեվ ուժեղ կերեր՝ համապատասխան իր տված կաթի քանակին։

Յեթե տավարին համեմատաբար մեծ քանակությամբ դարման ենք տալիս (որական ամեն մի գլխին 15 ք. ավելի), վորպեսզի ամբողջովին ուտի, անհրաժեշտ է դարմանը խաչել։ Յերկու տեսակ են խաշում, առաջին

դեպքում դարմանը լեցնում են տակառների մեջ և
խաշում են յեռացող ջրով կամ գոլորշիով, ապա թող-
նում են, վոր կամաց-կամաց սառչի, սառչելուց հետո
հանում-տալիս են տափարին:

Յերկրորդ դեպքում դարմանը լեցնում են կիսա-
տակառի կամ արկղների մեջ, մի լավ ծեծում-նստեցնում
են, ապա թրջում են գոլ ջրով: Նետո դարմանով լցված
տակառները կամ արկղները վերեվից ծածկում են խսի-
րով, վրան դնում են տախտակներ, իսկ տախտակների
վրա վորեվե ծանրություն: Յերկու-յերեք որ հետո դար-
մանը խիստ կտաքանա և այն ժամանակ կարելի յե նրա-
նով կերակրել տափարին:

Կերակրելու ժամանակ լավ կը լինի դարմանի վրա
աղ անել և շաղ տալ ալյուր կամ թեփ: Այդ ձեվով տա-
վարը դարմանն ավելի ախորժակով կուտի: Վորպեսզի
ամեն որ թարմ խաշած դարման լինի, ցանկալի յե ունե-
նալ 3-4 արկղ կամ տակառ այն հաշվով, վոր յուրաքանչյուր
տակառը կամ արկղը իր մեջ պարունակի որական բոլոր
կովերի համար անհրաժեշտ քանակությամբ դարման:

Բայց ինչքան ել վոր կոպիտ կերը լավ լինի, կամ
ինչ ձեվով ել վոր նրան պատրաստենք, այնուամենայնիվ
միայն նրանով, առանց ուժեղ կեր կամ արմատապտուղ
ավելացնելու չի կարելի մեծ քանակությամբ կաթ ստա-
նալ, վորովհետեւ կոպիտ կերի մեջ քիչ քանակությամբ
մննդարար նյութեր կտն, իսկ կովը միայն սահմանափակ
քանակությամբ կոպիտ կեր կարող ե ուտել:

Շատ մասնագետների և տափարատերերի դիտողու-
թյունների համաձայն խոշոր կովը միջին հաշվով որա-
կան կուտի 35-36 ֆ. կոպիտ կեր, նույնիսկ այն դեպ-
քում, յեթե տված կերը բաղկացած լինի միայն առվու-
տից (յոնջայից). Բայց 35 ֆ. լավ առվույտից մենք կա-
րող ենք ամենալավ դեպքում ստանալ մոտ 28 ֆ. կաթ,

մինչդեռ լավ կաթնատու կովերը, բացի կոպիտ կերից նայեվ ուժեղ կեր տալու դեպքում, որական կարող են տալ մինչեվ 60 ֆ. կոթ (որինակ հոլանդական կովը):

Հիմա մենք անցնենք կոպիտ կերերի քննությանը առանձին առանձին:

Սովորական չոր խոտը: Յեթե խոտը քաղված ե ծաղկելու սկզբին, նա ավելի սննդարար կը լինի, վորովհետեւ մատղաշ խոտն ավելի հեշտ ե մարսվում, քան շատ հասածը: Յեթե խոտը քաղում են ծաղկելուց հետո, այն ժամանակ նա կորցնում է իր սննդարարության ^{1/3} մասը:

Խոտի կերարժանիքը, բացի նրա քաղելու ժամանակից, կախումն ունի նայեվ նրա կազմից, այսինքն թե ինչ տեսակներից ե կազմված նա: Յեթե խոտի մեջ շատ կան յերեքնուկ, առվույտ (յոնջա), կորնգան վիկ և այլ թիթեռածաղիկ խոտեր, նա այնքան ավելի՞ո սննդարար կը լինի և ընդհակառակը, վորքան հիշյալ տեսակի խոտերը քիչ են, իսկ նրանց փոխարեն շատ են ճահճային խոտերը, այնքան ել ուրեմն խոտը քիչ սննդարար կը լինի:

Ժամանակին հավաքած և չոր պահած խոտն ավելի սննդարար ե, քան ուշ հավաքած, անձրեվի տակ ընկած և վատ պահած խոտը:

Առվույտ (յոնջա) կոպիտ կերից վոչ մեկն այնքան շատ չի գործածվում, վորքան առվույտը: Յեթե բտելու (չաղացնելու) համար պահվող ջահել յեզներին առվույտ տանք, նրանք ավելի արագ կը չաղանան և միաժամանակ կը խնայվի վորոշ քանակությամբ ուժեղ կեր, վորտրվում ե չաղանալու համար: Կթի կովի համար չկա առվույտից ավելի լավ կեր, վորովհետեւ առվույտը հարուստ ե վոչ միայն սպիտակուցային նյութերով, այլեվ հանքային նյութերով վորոնք ամենաանհրաժեշտ նյութերն են կաթ առաջացնելու համար:

Մեզ մոտ շատ տեղերում առվույտ են ցանում: Ցանկալի յե, վոր առվույտը ցանեյին վոչ միայն արա-

նում և ջրովի շրջաններում, այլեվ լեռնային մասերում՝ դեմի շրջաններում։

Իհարկե, վորքան ել մենք շատ առվույտ ունենանք, կաթնառատ կովերին կերակրելիս չենք կարող բավականանալ միայն առվույտ տալով, այլ պետք ե տանք և ուժեղ կերեր։

Յերեքնուկ (սիրի-սիրի)։ Յերեքնուկը (նրա բոլոր տեսակները) իր սննդարարությամբ շատ ե մոտենում ուժեղ կերերին, բայց դրանից չի հետեւում, վոր լավ կաթնառու կովին կարելի յե կերակրել միայն յերեքնուկով առանց ալյուրի։

Ամեն մի կեր լավ ե ոգտագործվում տավարի կողմից այն ժամանակ, յերբ նա կերաբաժնի մեջ ե մտնում միջին չափով։ Բնդիանրապես վորելիք կերից վորքան շատ ե լինում կերաբաժնի մեջ (մանավանդ կոպիտ կերից), անքան տվյալ կերը վտա ե ոգտագործվում։ Այսպես, յեթե որինակ կերաբաժնի մեջ մտնում ե 20 ֆ. յերեքնուկ, նա ավելի լավ կոգտագործվի կովի կողմից, քան յեթե նույն յերեքնուկից 35—40 ֆունտ լինի։ Բացի այդ, շատ կաթնառու կովեր կարողանում են տալ որական մեկ դույլ (վեդրո) կաթից ավելի, հետեւսբար կաթնառատ կովերի համար միայն յերեքնուկը բավական չե, անհրաժեշտ ե նայեվ ուժեղ կեր։

Յերեքնուկն ամենից շատ սննդարար ե լինում այն ժամանակ, յերբ նրան հնձում ու չորացնում են նոր ծաղիկ տված Մամանակը։ Բայց տնտեսության համար ձեռնառու չե այդ ժամանակ հնձել յերեքնուկը, ուստի պետք ե սպասել և հնձել լրիվ ծաղկելուց հետո։

Յերեքնուկը հնձելու ժամանակ պետք ե ուշադրություն դարձնել, վոր ծաղիկներն ու մանր տերեվները չը պոկվեն ու թափվեն։

Վիկ կամ վիկախոՏ։ Լավ ժամանակին (այսինքն մին-

չեվ լրիվ ծաղկելը) քաղած վիկն իր սննդարարությամբ
հավասարվում է միջակ տեսակի յերեքնուկին:

Ինչպես վիկն, այնպես ել յերեքնուկը լավ են ազ-
գում կաթի թե վորակի և թե քանակի վրա:

Կորնգոնիր: Կորնգանը նույնպես շատ սննդարար է և
մեծ բերք է տալիս ու լավ աճում է քարքարոտ ու կրա-
հողերում: Նա պետք է հնձել ծաղիկն սկսելու ժամանակ,
վոր խոտը շատ չկոշտանա:

Սրանցից հետո զալիս են ջրովի խոտհարքների յեվ
արհեստական ցանվող խոտհարքների խոտերը: Այդ խո-
տերը համարյա սիատեսակ սննդարար են և կազմում են
զանազան տեսակի խոտերի խառնուրդ:

Այս խոտերը, յեթե ժամանակին են հնձված ու լավ
հավաքված, սննդարարությամբ շատ քիչ են հետ մնում
յերեքնուկից: Դրանք բոլորն ել լավ են ազգում կաթի թե
վորակի և թե քանակի վրա: Ամենալավ կերաբաժինն այս
տեսակ խոտերից որական 20.2‡ ֆունտն ե, բայց ի հար-
իե, կերաբաժինը պետք է հարմարեցնել կովի կենդանի
քաշին և նկատի առնել և մյուս կերերը՝ որինակ դարմա-
նը. յեթե դարմանը շատ է, խոտ քիչ պետք է տալ և
այլն:

Անջրդի խոտհարքների խոտը սննդարարությամբ շատ
դեղքերում ցածր է լինում, քան վերեվամ հիշված խո-
տերը նա շատ անգամ կազմված է լինում հասարակ
խոտերից, որինակ խրփուկ և այլն:

Այս տեսակ խոտը պետք է հնձել ծաղկելու սկզբին,
վորովհետեւ ծաղկելուց հետո նա իր սննդարարության
մեծ մասը կորցնում է: Զւշ հնձելու դեպքում նա իր
սննդարարությամբ համարյա հավասարվում է դարմանին
և տավարը նրան ախորժակով չի ուտում: Այս խոտը կա-
թի վորակի և քանակի վրա առանձին լավ ազգեցություն
չի թողնում:

Պետք է ասել, սակայն, վոր մեզ մոտ անջրդի

տեղերում մեծ մասամբ բուսնում են լավ, պիտանի խոտեր, հարուստ թե յիշեքնուկով ու յոնջայով և թե ուրիշ սննդարար բույսերով։ Մեր լեռնաշրջանի տուչնակարգ խոտհարքները դեմի յեն և շատ սննդատու։ Խրփուկանման հասարակ խոտերը պատահում են մեծ մասամբ խամ թողած թույլ վարելահողերում։

Անտառային խոտը։ Անտառային խոտից ստացվում ե պինդ, սպիտակ և անհամ յուղ։ Կաթի առատության վրա շստ թույլ ե ազդում։ Իր սննդարարությամբ գարնանացանի դարմանից մի քիչ բարձր է, յեթե քաղված ե ծաղկելու ժամանակ։

Թթու խոտը (ճահճային կամ ճլոտ տեղերից)։ Բաղկացած ե գլխավորապես բոշխից ու դամիշից և այլ ճահճային խոտերից։ Աննդարարության կողմից ավելի ցածր է, քան գարնանացանի լավ դարմանը։ Թթու խոտը վոչ միայն լավ չի ազդում կաթի առատության վրա, այլ ընդհակառակը, հաճախ պակսեցնում ե կաթը։ Բացի այդ, թթու խոտով կերակրելիս յերբեմն տավարի ստամոքսի խանդարում ե նկատվում։

Թթու խոտի կաթն անհամ ե և յուղը թույլ։ Յեթե կաթից շվեցարական պանիր եք պատրաստում, այս տեսակ խոտով չպետք է կերակրեք կովերին և արածացնեք ճլոտ ու ճահճոտ տեղերը. պանիրն ուռչում ե ու ճաքճքում։

Կա նայեվ, այսպես կոչված, փայտախոտ-բոխ։ Այս «խոտը» բոխը պատրաստվում է ծառերի մատղաշ ճյուղերից։ Ամառն այդ մատղաշ ճյուղերը պոկում ցախավելի նման գործում և չորացնում են։

Զմրանն այդ չոր ցախավելները խաշում են յեռման ջրով, կտրառում և տալիս են տավարին։ Վորտեղ անտառ շատ կա, փայտախոտը կերի պակաս տարիներին կարող ե փրկել տավարին սովամահությունից, յեթե նրան ավելացնենք քիչ քանակությամբ ուժեղ կեր։

Զի կարելի բոխ ողատրաստել փշատերեվ ծառերի, կաղնու, ճապքու, հոնի և մի քանի տեսակ տտիպառատ ուռիների ճյուղերից, վորովհետեվ այդ տեսակ ծառերից պատրաստած բոխը տավարի փորկապ ե առաջ բերում։

Դարման։ Գյուղաղան տնտեսություններում կոպիտ կերերի գլխավոր մասը (ըստ քանակի) կազմում ե դարմանը։ Կաթնատու տավարի համար ամենալավ դարմանը համարվում ե վարսակի դարմանը, ապա զարու դարմանը, նրանից հետո ել ցորենի դարմանը։ Վարսակի դարմանն իր կերարժանիքով յերկու անգամ պակաս ե գնահատվում յերեքնուկից, այսինքն 1 ֆ. յերեքնուկի սնունդը հավասար ե յերկու ֆ. վարսակի դարմանի սնունդին։

Տավարին ձմրանը կերակրելու ժամանակ ցանկալի յե, վոր որական կերարժնի մեջ մտնի գոնե 5 ֆ. դարման ամեն մի գլխին։ Սակայն դա պարտավորեցուցիչ չե, յեթե տավարին տրվում ե շատ խոտ։ Դարման դարմանն ավելի լավ ե քան աշնան դարմանը։

Յերբ կովին շատ դարման ենք ուտեցնում, սոսացվում ե պինդ, սպիտակ և անհամ յուղ։

Առօրայի (սարեկանի, չովզառի) դարման։ Սա վորպես կաթնատու տավարի կեր այնքան ել նշանավոր չե, վորովհետեվ նախ պակաս սննդարտը ե, հետո ել տավարը ախորժակով չի ուտում։ Գարու և ցորենի (աշնանացան) դարմանների հետ հեմեմատած նա յերրորդ տեղն ե բըռնում իր սննդարարությամբ։ Կերի պակասության դեպքում կարելի յե սրանով կերակրել տավարին, միայն թե պետք ե աղ շաղ տալ վրան և խառնել ուժեղ կերերի հետ։ Յերե տավարին տրվում ե մեծ խնակությամբ ճականացեղ ուժեղ կերի հետ, այս դարմանը կարող է փոխարինել ամբողջ կոպիտ կերին։ Այս դեպքում նա մեծ նշանակություն ունի, վորովհետեվ մարսողությունը կանոնավոր ե պահում։

Մղեղ.— Մղեղն ընդհանրապես ավելի սննդարար

նյութեր ե պարունակում, քան նույն տեսակի դարմանը:

Մղեղի պակասությունն այն ե, վոր նա սովորաբար փոշոտ ե, մեջը հող և զանազան ծակող քիստեր շատ կան, մանավանդ զարու, աշորայի և ցորենի մղեղի մեջ։ Այդ պատճառով տավարին մղեղով կերակրելիս հաճախ հազարաթերթիկը (յերբորդ ստամոքսը) կեղտակալվում ե, փորկապ ե լինում և ընդհանրապես մարսողությունը խանգարվում ե։

Մեզ մոտ մղեղը մաքուր դրությամբ չի լինում, այլ միշտ խառնվուծ ե լինում դարմանի հետ։

2. ԿԱՆԱԶ ԿԵՐ. — Կանաչ կերերից լավ ե ազդում կովի կտթնատվության վրա կանաչ յերեքնուկը, յոնջեն, վիկը, կորնգանը, մարզագետնի և ցանվող կանաչ խոտերը և ընդհանրապես հարուստ արոտների խոտերը։

Կանաչ առվույտով պետք ե կերակրել մինչեվ լրիվ ծաղկելը. ծաղկելուց հետո նա փայտանում ե և քիչ սննդարար ե դառնում։ Մեծ քանակությամբ առվույտ ուտելու դեպքում կովի փորը կարող ե ուռչել, փորլույժ ե լինում և յերբեմն ել կարող ե հորթատել։

Կանաչ կերին են պատկանում նայեվ զանազան արմատապուղների ու պալարապտուղների թփերն ու տեսնելիքները (որ. կաղամբի, կարտոֆիլի, տակի և այլն), կաղամբի տերեվներն իրենց սննդարարությամբ այս կերերի շարքում առաջին տեղն են բռնում։ Նրանք խիստ շատացնում են կաթը. բայց որական ամեն մի կովին 25-30 ֆնտից ավելի չե կարելի տալ փորպես լրացուցիչ կեր։ Շատ ուտելիս կովը փորլույժ ե ստանում և կաթն ընդունում ե կաղամբի համ։ Նույնը կարելի յե ասել և թթվեցրած կաղամբի մասին։

Գազարի տերեվից թարմ դրությամբ ամեն մի կովին առանց վնասելու կարելի յե մինչեվ 60 ֆ. տալ. այս քանակությունը վոչ փորլույժ կառաջացնի և վոչ ել կաթի վրա վատ կաղդի։

ձակենդեղի (սակի) տերեվներից թարմ գրությամբ ամեն մի կովին որական 40 ֆնտից ավելի չե կարելի տալ: Շատ ուտելու գեղքում կովը փորլույժ ե ստանում և կաթն ու յուղը փշանում են:

Կարտոֆիլի տերեվներով հում գրությամբ տավարին չպետք ե կերակրել, կարելի յե խաշել կամ սիլոս*) պատրաստել և այնպես տալ որական ամեն մեկին 20 ֆնտից վոչ ավելի:

Թէ շաղգամի (տրուու) յեվ թէ բողկի տերեվներից որական ամեն մի կովին 30-40 ֆնտից ավելի չե կարելի տալ:

Գոնզեղի (ճրիկա) տերեվները մի ժիշ ավելի լավ են՝ նրանից կարելի յե ամեն մի կովին մինչեվ 1 փութ տալ:
3. ԱՐՄՈՒՏԱՊՏՈՒԴՆԵՐ ՅԵՎ ՊԱԼՈՐԾԱՊՏՈՒԴՆԵՐ—

Այս խմբի կերերից կարտոֆիլը ամենասննդարար կերն ե:

Ավելի լավ ե կարտոֆիլը հում գրությամբ տալ որական ամեն մի կովին 30 ֆնտից վոչ ավել: Լավ ե ուրիշ կերերի հետ տալ 10 ֆնտից վոչ ավել: Յեթե ստացված կաթից պետք ե շվեցարական պանիր պատրաստել, բուլորովին չի կարելի տավարին կարտոֆիլ տալ:

Պետք ե կարտոֆիլը նախապես սառը ջրի մեջ թրչել, ապա կոտորել և այնպես տալ տավարին: Սառած ու ծլած կարտոֆիլը չի կարելի տալ տավարին, վորովինետեվ հղի կովերը կարող են հորթատել: Տավարը մեծ քանակությամբ կարտոֆիլ ուտելիս փորլույժ ե լինում, և կաթից ստացվում ե ճարպանման յուղ:

Գազարը արմատա — եպալարապտուղներից ամենալավը ե իբրեւլ տավարի կեր: Զափազանց լավ ե ազդում թէ տավարի առողջության վրա և թէ կաթնամթերքների համի, գույնի և քանակության վրա:

Յուղ պատրաստելու և կաթը հում ծախելու գեղքում որական ամենաշուտը 50 ֆ. գազար կարելի յե տալ կովին. իսկ պանիր պատրաստելու գեղքում՝ 25 ֆ.: Գազարը պետք ե հում-հում տալ տավարին:

*) Հատուկ հորերում ձմեռվա համար թթու դրած կանաչ կերը կոչվում ե սիլոս:

ծակնդեղ (բազուկ) կարելի յե որական ամեն մի կովին մինչեվ 2 փութ տալ, առանց կովի առողջությանը, կաթին ու յուղին վնաս տալու:

Պանիր պատրաստելու դեպքում կովին որական 25 ֆնտից ավելի ճակնդեղ չի կարելի տալ: Ծակնդեղը պետք է տալ հում դրությամբ:

Շաղգամն (տүրուոց) իր կերարժանիքով ճակնդեղից բավական ցած ե կանգնած:

Ամենաշատը որական 100 ֆ. շաղգամ կարելի յե տալ ամեն մի խոշոր կովին, մուսաստանի մի քանի տնտեսություններում տալիս են մինչեվ 120 ֆ. ամեն մի կովին^{*}): Պանիր պատրաստելու դեպքում չի կարելի 25 ֆնտից ավելի շաղգամ տալ:

Կոնգեղի (բրյուկա) մասին համարյա թէ նույնը կարելի յե ասել:

Վորպես արդյունաբեր կեր, շաղգամը ամենից ձեռնուն ե, վորովիետեվ զարգանում ե 8-10 շաբաթվա ընթացքում առատ բերք ե տալիս և եժան և նստում:

Գետնախնձորը (տոպինամբուր) իր կերարժանիքով հիշեցնում ե կարտոֆիլին, թեյեվ գետնախնձորն ավելի ջրալի յե, հեշտությամբ ե մարսվում և տավարը ախորժակով ե ուտում: Գետնախնձորն աշնանը մի ինչ վորդառնություն ե ստանում, այդ պատճառով այդ ժամանակ տավարն ախորժակով չի ուտում: Գարնան դեմ այդ դառնությունն անցնում ե: Որական բաժինը ամեն մի կովի համար 25 ֆունտից ավելի չպետք ե լինի, թե չե կաթը դառն համ կստանա: Յեթե մտադրություն կա տավարը չաղացնելու, կտրելի յե մեծ քանակությամբ դեմախնձոր տալ:

*) Այդքան մեծ քանակությամբ արմատապտուղին պետք ե սովորեցնել կամաց-կամաց: Բացի այդ, այսուեղ ցույց տրված քանակությունը ամենաշատնե ե և ինկատի յե առնված համեմատաբար խոշոր և մեծ կենդանի բաշ ունեցող տավարը:

4. ԽՏԱՑՐԱԾ ԿԵՐ (զանագան տեսակի ալյուրներ, թեփեր և քուսպեր). Խտացրած կամ ուժեղ կերը կաթնատու կովի կերաբաժնի ամենաանհրաժեշտ մասն է կազմում։ Այս կերը մյուս կերերից գլխավորապես տարրերվում է նրանով, վոր փոքր ծավալի մեջ պարունակում է շատ սննդաբար նյութեր։ Ուժեղ կերի քանակը ընդհանրապես ամեն մի որական կերաբաժնի մեջ պետք է լինի 2 ֆունտից վոչ պակաս և 15 ֆունտից վոչ ավել։ Ուժեղ կերի որաբաժինը չպետք է միայն մի տեսակից լինի. ցանկալի յե, վոր նրա մեջ մտնեն միաժամանակ և ալյուր, և թեփ և քուսպ։

Յերբեք չի կարելի կաթնատու տավարին ուժեղ կեր տալ հատիկի ձեվով, այլ միշտ պետք է ալյուր դարձնել։ Սննդի ուժեղությամբ առաջին տեղն են բոնում բուսպերը (կոպտոնները)։ Ամենալավ քուսպերը համարվում են արեվածաղկի և կտավատի քուսպերը։

Կտավատի քուսպն առաջինից ավելի սննդաբար՝ և նրանով քիչ քանակությամբ կերակրելիս նա կաթնամթերքների վրա վոչ մի վատ ազդեցություն չի անում։ Արեվածաղկի քուսպից որական 7-8 ֆնտից ավելի չի կարիլի տալ ամեն մի կովին, իսկ կտավատի և կանեփի քուսպերից՝ 6 ֆունտից վոչ ավելի։

Բողկուկի բուսպը անդուրեկան դառը համ է տալիս կաթին, ուստի նրան լավ կլինի չտալ տավարին, կամ տալ շատ քիչ։

Բամբակի բուսպը նույնպես կարելի յե տալ կաթնատու կովին, բայց որական 3-4 ֆնտից վոչ ավելի։ Բամբակի սերմը նույնպես լավ է, բայց որական 2-3 ֆնտից ավել չպետք է տալ. նա կարող է կենդանուն մխասել։

Վարսակի ալյուր.—Իր սննդաբարությամբ քուսպերից հետո գալիս ե վարսակի ալյուրը։ Վարսակի ալյուրից ել

Հի կարելի շնչին 8 ֆնտից ավելի տալ։ Շատ քանակությունը կաթի վրա վատ ե ազդում։

Յեզիացուենի ալյուրը լավ ե ազդում կաթնատվության վրա և տալիս ե պինդ, դեղին յուղ։ 8 ֆնտից ավելի չի կարելի տալ ամեն մի կովին։

Դարու ալյուրն ավելի ոգտակար է չաղացվող տավարի համար։ Առանց կենդանուն մնասելու կարելի յետալ մինչեվ 12 ֆ. որական։ Դարի ալյուրով կերակրելիս ստացվում ե կոկուղ, բայց համեղ յուղ։

Առուայի ալյուրը յեվ առուայի թեփը. կաթնատավարի համար ավելի պակաս արժեք ունին, քան հիշված ուժեղ կերերը, վորովինետեվ գրգռիչ կերպով են ազդում և շատ ուտելիս թուլացնում են մարսողությունը։

Միսեռն ու բակլան ավելի պետքական են չաղացվող տավարին, քան թե կաթնատուին։

Ցուենի ալյուրի թեփը շատ հիանալի սննդարար կեր ե կաթնատու տավարի համար։ Լավ ե ազդում կաթնամթերքների վորակի և քանակի վրա, բայց որական 10 ֆնտից ավել չպետք ե տալ ամեն մի շնչին։ Շատ տալու դեպքում տավարը փորլույժ ե լինում։

5. ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԵՐԵՐ. — կաթթան, պանրի շիճուկ։

Յերես քաշած (կած) կաթ, սինուկ յեվ քան. — Այս կերերն ավելի ոգտակար կլինի տալ ջահել տավարին, քան կթի տավարին։ Բայց դրանցից յերբեմն կթի տավարին ել են տալիս մինչեվ 2 դույլ ամեն մեկին։ Զի նկատված, վոր այդ կերերից սուանձնապես կաթը ավելանա, բայց տավարի փորկասլ յեղած ժամանակ շատ լավ են ազդում ստամոքսի վրա և մարսողությունը լավացնում են։

8. ԻՆՉՊԵՍ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ ՄԻ ԿԵՐԸ ՄՅԱՒՍՈՎ

(Համաձայն Դանիական նորմաների)

Ի՞ՆՉՆ Ե ԿԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐԸ

Յենթադրենք, ուզում ենք խմանալ, թե մի կերի մի գրվանքան ուրիշ կերի քանի գրվանքով կարելի յէ փոխարինել, այն պայմանով մայն, վոր այդ փոխելուց տավարի կաթը չպակասի։ Դրա համար վերցնում ենք հայտնի սննդարարություն ունեցող կերից վորոշ քաշ և դրա հետ համեմատում ենք մնացած բոլոր կերերը. այսինքն ընդունում ենք դրան իրբեվ միավոր։

Վոր կերն ե ավելի հարմար միավորի տեղ ընդունելու. դրա համար պետք ե ընտրել այնպիսի կեր, վորի հատկությունները շուտ չեն փոխվում, այլ վորոշ չափով կայուն են և մնում են համարյա անփոփոխ։ Այդ տեսակետից բոլոր կերերի մեջ իր այդ հատկությամբ աչքի յե ընկնում ուժեղ կերը. այսինքն զանազան տեսակ ալյուրները, թեփերն ու քուսպերը։ Դրա համար ել դանիացիք առանձին կերերի արժանիքներն իրար հետ համեմատելու համար վերցրել են 1 ֆ. ուժեղ կերերի խառնուրդ, վոր կազմված է $\frac{1}{3}$ ֆ. ալյուրի թեփից, $\frac{1}{3}$ ֆ. արեվածաղկի քուսպից և $\frac{1}{3}$ ֆ. ալյուրից։ Այդ 1 ֆ. խառնուրդ ուժեղ կերը ծառայում է վորպես չափ մնացած կերերի արժանիքը վորոշելու համար և կոչվում է կերի միավոր (ինչպես որինակ արշինը յերկարության միավոր ե, ֆունտը ծանրության միավոր, այդպես ել 1 ֆ. խառնուրդ ուժեղ կերը կոչվում է կերի միավոր)։

Կթի տավարի վրա փորձեր կատարելով՝ դանիացիներին հաջողվել է մոտավորապես պարզել, թե կերի միավորի կամ 1 ֆ. խառն ուժեղ կերի փոխարեն ուրիշ կերերից վորքան պետք է վերցնել, վոր կովը նույն անունով ստանա և կիթը չպակասի։ Այսպես որինակ յենթադրենք, թե կթի կովի կերաբաժնից պակսեցրել

ենք մի քանի ֆ. խառն ուժեղ կեր կամ մի քանի կերի միավոր (վորը միեվսույն բանն ե), Պարզ ե, վոր յեթե ամբողջ կերաբաժինն այնքան ե, վոր հազիվ ե կշտացնում կովին, ուրեմն որական կերաբաժնից որինակ 3 ֆ. ուժեղ կեր պակսեցնելիս կաթն ել կպակասի: Հասկանալի յե, վոր յեթե հիմա մենք ցանկանում ենք, վոր կովս ելի առաջվա չափ կաթ տա, պետք ե վերադարձնենք նրան կերաբաժնից հանած 3 միավորը կամ 3 ֆ. խառնուրդ ուժեղ կերը: Բայց կիթը նախկին չափին հասցնել մենք կարող ենք վոչ միայն վերադարձնելով կերաբաժնից հանած 3 միավորը կամ 3 ֆ. խառն ուժեղ կերը, այլ և տալով ուրիշ տեսակի կերեր, միայն թե այն քանակությամբ, վոր նրանք իրենց սննդանյութերով հավասար լինեն 3 ֆ. ուժեղ կերին: Որինակ՝ կերաբաժնից պակսեցրած 3 միավորի փոխարեն մենք սկսում ենք կերաբաժնին կամաց-կամաց ավելացնել, որինակ՝ այնքան առվույտ (յոնջա), մինչեվ վոր կովս սկսի տալ նախկին քանակությամբ կաթ: Յենթադրենք, վոր մենք ընդամենը ավելացրինք 6 ֆ. լավ առվույտ ու ստացանք կաթի նախկին քանակը, ուրեմն փորձը ցույց տվեց, վոր 6 ֆ. առվույտը տալիս ե նույնքան կաթ, վորքան 3 ֆ. խառնուրդ ուժեղ կերը կամ 3 միավորը: Այստեղից հետեւում ե, վոր 1 կերի միավորին կարող ե փոխարինել 2 ֆ. առվույտը (յեթե 3 միավորին փոխարինում ե 6 ֆ. յոնջան, ուրեմն մեկ միավորին կփոխարինի 2 ֆ. յոնջան): Այս ձեվով կարելի յե պարզել և մյուս կերերի արժանիքը 1 ֆ. խառնուրդ ուժեղ կերի հետ կամ 1 կերի միավորի հետ համեմատած:

Կաթնատու տավարի կերակրման վերաբերյալ կատարված բազմաթիվ փորձերի հիման վրա դանիացիները կարողացել են պարզել, վոր 1 ֆ. խառնուրդ ուժեղ կերը պարունակում ե մուսավորապես նույնքան սնունդ, վորքան հետեւյալ կերերն առանձին-առանձին (ուրիշ խոս-

քով ներքեվում քերտծ կերերի քանակն առանձին առանձին կարող ե փոխարինել 1 կերի միավորի):

ՈՒԺԵՂ ԿԵՐԵՐ

1 ֆ. ալյուր (զանազան տեսակներից խառնուրդ) հավասար ե 1 կերի միավորի

3/4 ֆ. արեվածաղկի քուսպը	»	1	»	»
3/4 ֆ. կտավատի	»	1	»	»
1 ֆ. բողկուկի	»	1	»	»
1 ֆ. կանեփի	»	1	»	»
1 ֆ. ցորենի ալյուրաթեփ	»	1	»	»

ԶՈՐ ԿՈՊԻՏ ԿԵՐԵՐ

3 ֆ. մարգագետնի խոտը	հավասար	ե	1	կերի	միավորի
4 ֆ. ճահճային (ճլոտ)	»	»	1	»	»
2—2 ¹ / ₂ ֆ. յերեքնուկը	»	1	»	»	»
2 ¹ / ₂ —3 ֆ. առվույտը (յոնջա)	»	1	»	»	»
4—5 ֆ. դարնան դարմանը	»	1	»	»	»
5—6 ֆ. աշնան դարմանը	»	1	»	»	»

ԿԱՆԱՉ ԿԵՐԵՐ

12 ֆ. դաշտի խոտը	հավասար	ե	1	կերի	միավորի
14 ֆ. մարգագետնի խոտը	»	1	»	»	»
10 ֆ. կանաչ վիկն	»	1	»	»	»
8 ֆ. » յերեքնուկ	»	1	»	»	»
15 ֆ. ճակնդեղի տերեփ	»	1	»	»	»
10 ֆ. դաղարի	»	1	»	»	»

ԱՐՄԱՏԱ-ՅԵՎ-ԹԱԼԱՐԱՊՏՈՒՂՆԵՐ

8—10 ֆ. ճակնդեղը	հավասար	ե	1	կերի	միավորի
10—12 ֆ. շաղգամը	»	1	»	»	»
8 ֆ. դաղարը	»	1	»	»	»
6 ֆ. կարտոֆիլը	»	1	»	1	

ՄՆԱՑԱԾ ԿԵՐԵՐԸ

6 ֆ. յերես քաշած կաթը հավասար ե 1 կերի միավորի

12 ֆ. պանրի շիճուկը
10 ֆ. թանը
8—10 ֆ. սելոսը

» 1 » »
» 1 » »
» 1 » »

Ուրիշ խոսքով 1 ֆ. ալյուրն իր մեջ պարունակում է նույնքան սնունդ, վորքան 3 ֆ. մարգագետնի չոր խոռը, 8 ֆ. կանաչ յերեքնուկը, կամ 6 ֆ. կարտոֆիլ և այլն։ Կամ թե կարելի յե ասել, վոր 1 ֆ. ալյուրն իր սննդով մոտավորապես համապատասխանում է 1 կերի միավորի, 1 ֆ. մարգագետնի չոր խոռը =^{1/3} կերի միավորի, 1 ֆ. կանաչ յերեքնուկը =^{1/8} կերի միավորի և այլն։ Բայց մենք ընդգծում ենք, վոր այս տախտակը կերերի համեստական արժանիքի մասին տալիս է միայն կոպիտ-մուտավոր բվեր։

Այս տախտակով ոգտվելիս մենք պետք են լավ հիշենք, վոր կերերի մարսելիությունը (բացի շատ ուրիշ պատճառներից) կախումն ունի նայել նրանից, թե ինչ քանակությամբ են նրանցից տրվում տավարին։ Այսպես որինակ. յեթե որական կերաբաժնի մեջ մտնում է 15 ֆ. յերեքնուկ, նա ավելի լավ կողտագործվի կովի կողմից, այսինքն յերեքնուկի ամեն մի ֆունտն ավելի շատ կաթ կտա, քան յեթե կերաբաժնի մեջ 15 ֆունտի փոխարեն մտնի 30 ֆ. յերեքնուկ։ Նույնը կարելի յե ասել մյուս կերերի վերաբերմամբ։ Բացի այդ, ճիշտ կազմված կերաբաժինը պետք է իր մեջ պարունակի զանազան կերեր. այսինքն կազմված չպետք է լինի միայն մի տեսակի կերից։ Դրա համար ել մի կերը մի ուրիշ կերով փոխարինելը կարելի յե կատարել միայն վորոշ սահմաններում։ Այդ սահմաններն առանձնապես կարեվոր են գիտենալ, յերբ ուժեղ կերերը փոխարինում ենք կոպիտ կերերով։

(Տես աղյուսակ յերես 53):

Կթի տավարի մի կերը մի ուրիշով փոխարինելիս չի կարելի հիշած տախտակում ցույց տված կերաբաժնի

չափից են կողմն անցնել. (այդ տախտակում ցույց են տված միայն կոպիտ-մոտավոր թվեր, վորոնք ստացված են գործնական աշխատանքների ընթացքում):

Ամառվա արոտից ստացած կովի կերի քանակը վորոշվում է ձմրան կերի և ստացվող կաթի համեմատ Այսպես՝ յեթե կովը ձմրանը իր կյանքի պահպանման համար պահանջում եր որական 8 կերի միավոր, այսինքն այնքան կեր, վոր իր սննդով հավասար լինի 8 ֆ. ուժեղ կերին, ապա նույն կովս ամառն արոտում պիտի ուտի որական այնքան կեր, վորն իր սննդով հավասար լինի 9 կերի միավորի: Արոտում կովը պետք է ուտի մի միավոր ավելի նրա համար, վոր ամառը շատ շարժումներ են անում և ուժ ե սպառում:

Նմանապես, յեթե կովը ձմրանն ամեն մի կերի միավորի դիմաց տալիս եր 3 ֆ. կաթ, ապա նա ամառն ամեն մի 3 ֆ. կաթ արտադրելու համար արոտում պետք է ուտի 1 ֆ. ուժեղ կերի չափ սնունդ պարունակող կեր կամ 8 ֆունտ կանաչ յերեքնուկ, վորը հավասար է մեկ կերի միավորի:

Որինակ, յեթե միջին մեծության կովս ամառն արոտում առանց լրացուցիչ կերի տալիս ե 21 ֆ. կաթ, ուրեմն նա արոտից վերցնում ե մոտ 16 միավոր կեր. այսինքն այնքան կեր, վորը իր արժանիքով հավասար ե 16 ֆ. ուժեղ կերին: Այդ 16 կերի միավորը ստացված ե հետեւյալ ձեվով.

Դանիացիք փորձի միջոցով հաստատել են, վոր միջին մեծության (որ. 24 փթանոց) կովը թե ամառը և թե ձմեռը իր կյանքը պահպանելու համար պահանջում ե 8 կերի միավոր, իսկ յուրաքանչյուր 3 ֆ. կաթ արտադրելու համար ելի մի կերի միավոր: Հետեւյալ վերեվում հիշված 21 ֆ. կաթ տվող կովը պահանջում ե իր կյանքի պահպանման համար 8 միավոր, 21 ֆ. կաթ ար-

Այս տախտակը ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է վոխարինել մի կերը
մյուսով՝ պահպանելով կերերի նորմալ քանակը կերաբաժնի մեջ:

ԿԵՐԵՐԻ

ԱՆՈՒՆԵՐԸ

Ամեն մի կերից մոտավորապես ինչքան
պետք է վերցնենք 1 կովի համար
որական կերաբաժնի կազմելիս

Խոշոր կով, կենդանի	Միջակ կով կենդանի	Մանր կով, կենդանի
Քաշ 27-35 կ.	Քաշ 20-26 կ.	Քաշ 12-19 կ.

Արեվածաղկի քուսալ	8	4	7	3	6	2
Կտավատի »	6	4	5	3	4	2
Բողկուկի »	4	2	3	1	2	1
Կանեփի »	6	4	5	3	4	2
Ճորենի թեփ	12	8	10	7	8	6
Աշուրու »	8	6	7	5	6	4
Դարի	12	8	10	6	8	4
Վարսակ	8	6	7	5	6	4
Յեգիպտացորեն	8	6	7	5	6	4
Աշուրա	8	6	7	5	6	4
Միսեռ	6	4	5	8	4	2

Մարգագետնի խոտ	20	15	15	12	12	9
Վիկա	26	20	20	16	16	12
Կարմիր յերեքնուկ	26	20	20	16	16	12
Տիմոֆեյ խոտ	20	15	15	12	12	9
Առվույտ	20	15	15	12	12	9
Վարսակի դարման	12	8	10	6	6	4
Գարու »	12	8	10	6	6	6
Աշուրու »	8	6	6	5	5	4
Ճորենի(աշն.) »	8	6	6	5	5	4

Կանաչ հասարակ խոտ	120	90	100	70	80	60
» Վիկա	120	90	100	70	80	60
» յոնջա	70	60	60	50	50	40
Ճակնդեղի տերեվ	50	40	40	30	30	20
Կարտոֆիլ	28	16	20	12	16	10
Ճակնդեղ	100	60	80	50	60	40
Ճաղպամ	100	60	60	40	50	30
Գազար	50	40	40	30	30	20

տադրելու համար 7 միավոր և 1 ավելորդ միավոր եւ
ուժեղ շարժումներ կատարելու համար, ընդամենը 16
միավոր։ Յեթե արոտը վատ է, կովին որական 16 կերի
միավոր չի տալիս, կովը լղարում է և կաթը պակսեց-
նում։

Այս տախտակի մեջ հիշված կոպիտ կերերի քանակ-
ները վերջնական չեն, կարելի յեւ և այդ քանակություն-
ներից ավելի վերցնել. այստեղ ցույց ե տված, թե մո-
տավորապես ինչ քանակությամբ վորեվե կոպիտ կեր կա-
րելի յեւ փոխարինել ուրիշ կերերով։ Մնացած կերերի հա-
մար արդեն ցույց ե տված այն քանակությունները,
վորոնց սահմաններում կարելի յեւ փոխարինել մի կերը
մի ուրիշով, առանց տավարի առողջության և կաթի վրա
ազդելու։ Յեվ վորպեսզի նույն քանակությամբ կաթ ստա-
նանք, անհրաժեշտ ե, վոր կովին տանք լրացուցիչ կեր։

Յեթե տավարն ամառը լրացուցիչ կեր ե ստանում,
այդ դեպքում արոտի կերարժանիքը վորոշելիս պետք ե
կերի միավորների ընդհանուր թվից դուրս գալ այդ լրա-
ցուցիչ կերի միավորները և մնացածը ցույց կտա, թե
տավարը քանի կերի միավոր ե ստանում արոտից։ Որի-
նակ. յենթադրենք, վոր մենք ըստ կերի և ըստ կենդանի
քաշի վորոշել ենք, վոր կովը որական պետք ե ստանա-
մոտ 17 միավոր կեր, իսկ տանը մենք նրան տալիս ենք
2 միավոր ուժեղ կեր, հետեւվարար մեր կովը արոտից
ստանում ե 15 միավոր կեր։

Հասկանալի յեւ, վոր այդ ձեվով արոտի կերարժանի-
քը վորոշելն այնքան ել ճիշտ չե, բայց համենայն դեպս
նա ավելի մոտ ե իրականության, քան ուրիշ շատ ձե-
վերը։ Ընդհանրապես կերի միավորների հետ ծանոթա-
նալով հեշտությամբ կկարողանանք կերերի վերաբերյալ
զանազան հարցեր վճռել, առանձին կերերն ըստ իրենց

արժանիքի իրար հետ համեմատել, մեր տարվա կերի պաշտու միավորներով հաշվել և այլն:

Բայց այդ ղեպքում պետք ե հիշել, վոր մի քանի կերերի ուժը խիստ տատանվում է: Այսպես որինակ, խոտի սննդարարությունը կախված է նրա կազմի մեջ մտնող զանազան տեսակ խոտերից, հնձելու ձեվից և ժամանակից: Այդ պատճառով յերբ ուզում ենք վորոշել, թե ովյալ խոտի քանի ֆունտը մի միավոր կեր ե կազմում, հարկավոր ե ծանոթանալ նրա մեջ մտնող խոտերի տեսակների հետ և վորոշել նրա հնձելու ժամանակը: Նույնպես և մնացած կերերը պետք ե նախապես նայել, տեսնել, փչացած չեն, միջին արժանիքի յեն և ապա վերածել կերի միավորների:

Ընդհանրապես դանիական կերի միավորներն ոգտագործելիս մենք պետք ե հիշենք, վոր նրանք զանազան կերերի արժանիքի նկատմամբ տալիս են միայն կոպիտմուավոր պատկերը:

9. ՏԵՐԵԲԵՐ ԿԵՆԴՐԱՆԻ ՔԵՇ ՈՒԽԵՑՈՎ ՏԱՎԱՐԻՆ Ի՞ՆՉ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ԿԵՐ Ե ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԻՐ ԱՌՈՂՋ ԳՈՅՆԻ ԹՅԱՄԲ ՊԱՀԱՎՈՐ ՀԱՄԱԴՐ ՊԱՀԱՎՈՐ ՀԱՄԱԴՐ

(Կենսապահ կեր)

Կերի այն մասը, վոր անհրաժեշտ ե կենդանուն իր առողջ գոյությունը պահպանելու համար, կոչվում ե կենսապահ կեր: Կենսապահ կերի քանակը վորոշվում ե տավարի կենդանի քաշի համաձայն. վորքան կենդանին ծանր ե, այնքան ավելի պահպանող կեր ե հարկավոր նրան:

Դանիացիների դիտողությունների համաձայն հասակ առած կոմի իր առողջ գոյությունը պահպանելու համար պահանջում ե ամեն մի 3 փութ կենդանի քաշին մոտավորապես 1 միավոր կեր (չհաշված այն կերը, վորը գնում ե կաթի կազմվելու և դեռ չծնած հոլթի սնունդի

համար): Որինակ, յենթադրենք, թե կովի կենդանի քաշը 27 փութ է, հետեւվաբար վերոհիշյալ կանոնի համաձայն այդ կովս իր առողջ գոյությունը պահպանելու համար կողահանջի որական 9 միավոր կեր (27:3=9), այսինքն այնքան կեր, վորն իր սննդարարությամբ հավասար լինի 9 ֆ. ուժեղ կերի: Յեթե կովը միայն խոտով ե կերակրվում, այն ժամանակ հարկավոր կլինի 27 ֆ. լավ խոտ (վորովհետեւվ 3 ֆ. լավ խոտը հավասար ե 1 միավորի, ուրեմն 9 միավ. հավասար կլինի 27 ֆ. խոտի): Հետեւվաբար դուրս ե գալիս, վոր իր առողջ գոյությունը պահպանելու համար ամեն մի կովի 1 փութ կենդանի քաշին պիտի հաշվել մոտ 1 ֆ. խոտ: Իսկ յեթե տավարին խոտ չի տրվում, այլ դարման, այն ժամանակ, վորպեսզի ունենանք 9 միավոր կեր, պետք ե վերցնենք 36 ֆ. դարման (9×4): Բայց վորովհետեւվ տավարն այդքան մեծ քանակությամբ դարմանը ախորժակով չի ուտում և դժվար ե մարսում, ուստի նրա մի մասը՝ այն ե 16 կամ 20 ֆ. փոխարինվում ե ուրիշ կերով, որինակ. թեփով: 16 ֆ. դարմանի փոխարեն պետք ե վերցնել 4 ֆ. թեփ, ստացվում ե այսպիսի կերաբաժին:

20 ֆ. դարման = 5 կերի միավոր

4 ֆ. թեփ = 4 » »

Ըստամենք = 9 կերի միավոր

Ըստհանրապես գործնականից պարզված է, վոր ձեռնու չե կաթնատու տավարին տալ 20 ֆնտից ավելի դարման, վորովհետեւվ ախորժակով չի ուտում և լավ չի ոգտագործում: Հենց նույնիսկ 20 ֆ. ել լավ ոգտագործելու համար պետք ե թրջել աղաջրով, խաշել և մի քիչ ալյուր կամ թեփ խառնել հետը:

Յեթե մենք ունենք և խոտ և դարման, այն ժամանակ մենք կարող ենք կենսապահ կերի համար անհրաժեշտ միավորները կազմել այդ յերկու կերից՝ տարբեր

հարաբերությամբ։ Որինակ, կարողենք 5 կերի միավոր տալ վորպես խոտ $(5 \times 3) = 15$ ֆ. և 4 միավոր կեր իրը եվ դարման $(4 \times 4) = 16$ ֆ., իսկ յեթե կովը կերակրվում է միայն առվույտով, այն ժամանակ կովահանջվի $(9 \times 2^1/2) = 22^{1/2}$ կամ 23 ֆ. առվույտ։

Այսպես ուրեմն, մենք արգեն ունինք 4 հատ որական կերաբաժին միյելվույն 27 փութ կենդանի քաշ ունեցող ցամաքած կովի համար։ Այդ 4 կերաբաժիններն ել մոտավորապես միյելվույն սնունդն են պարունակում, սակայն նրանք կալոր են տարբեր գներ ունենալ։

I	կերաբաժին	27 ֆ.	լավ խոտ	= 20 կ.	կերեր հաշված են
II	"	$\left\{ \begin{array}{l} 20 \text{ ֆ. դարման} \\ 4 \text{ ֆ. թեփ } \end{array} \right\}$	= 18 կ.	մինչպատերազմյան գներով—փութը՝	
III	"	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \text{ ֆ. լավ խոտ} \\ 16 \text{ ֆ. դարման} \end{array} \right\}$	= 19 կ.	առվույտ — 40 կ. խոտ — 30 կ. դարման — 20 կ.	
IV	"	23 ֆ. առվույտ	= 23 կ.	թեփ — 80 կ.	

Կարելի յե ելի ուրիշ շատ կերաբաժիններ կազմել՝ պահելով հետեւյալ կանոնները. հարկավոր ե՛ 1) աշխատել վոր կերաբաժնի մեջ ամեն մի փութ կենդանի քաշին 1 ֆ. կոպիտ կեր ընկնի, իսկ ընդհանրապես կերաբաժնի մեջ 15 ֆ. պակաս և 35 ֆ. ավել կոպիտ կեր չլինի։ Ծնչին 15 ֆ. կոպիտ կերից պակաս թույլատրելի յե տալ այն ժամանակ, յերբ կերաբաժնի մեջ արմատապտուղ շատ կտ. 2) կերի միավորների թիվը մեր արած հաշվից չպետք ե պակաս լինի. 3) կերաբաժնի մեջ դարմանի քանակը 20 ֆուտից ավելի չպիտի լինի (հասկանալի յե, վոր յեթե տնաեսության մեջ դարման շատ կա և նա առանձին գին չի ներկայացնում, կարելի յե 20 ֆ-ից ավելի դարման տալ. այդպիսի դեպքում կովը դարմանի լավ մասերը կջոկի—կուտի, իոկ մնացածը կթափի) և 4) հղի (թեկուղ և ցամաքած) կովին պետք ե որական կերաբաժնի հետ 2 ֆ. վոչ պակաս ուժեղ կեր տալ։

Վերոհիշյութ կերաբաժինները բավարար են միայն

բոլորովին առողջ, հասակ առած ստերջ, այսինքն՝ չկթվող և վոչ ել հղի կովերի համար:

Զահել, նոր մեծացող, ինչպես նայեվ հղի ու կթի կովը պահանջում ե վերոհիշյալ կերաբաժնից բացի ելք վորոշ քանակությամբ կեր թե իր մեծանալու, թե հորթը մեծացնելու և թե կաթ պատրաստելու համար:

Զահել կովին, բացի անհրաժեշտ կերի միավորներից, պետք ե տալ նայեվ որական 1-2 միավոր կեր: Որինակ, մի ջահել կով, վորի կենդանի քաշը 21 փութ ե, պահանջում ե որական վոչ թե 7 (21:3), այլ (7+1)=8 միավոր կեր: Ավելորդ 1 ֆ. կերը տրվում է կովի աճելու մեծանալու համար:

Հորթի մեծանալու համար հղի կովին բացի պահպանող կերից պետք ե տալ նայեվ որական 1 միավոր կեր հղիության սկզբին*), $1\frac{1}{2}$ միավոր կեր հղիության միջին մասում, իսկ 2 միավոր կեր վերջին մասում: Որինակ, մի ծանրած կով 24 փութ ե. Նրա կյանքը պահպանելու համար հարկավոր ե (24:3)=8 միավոր կեր, իսկ հղիության սկզբին հորթի մեծացման համար հարկավոր ե տալ նայեվ մեկ միավոր, հետեւլաբար ընդամենը 9 միավոր կեր:

Կենսապահ կերը կազմվում ե գլխավորապես դարմանից և խոտից:

Ինչպես մենք արդեն տսել ենք, ցամաքած բայց հղի կամ ծանրած կովերի համար կերաբաժին կազմելիս ցանկալի յե մտցնել վոչ պակաս 2—3 ֆ. ուժեղ կեր:

Կենսապահ կերի քանակը վորոշելիս պետք ե նայեվ ի նկատի ունենալ հետեւյալ հանգամանքը. տավարի քաշը մեծանալու հետ միյեմնույն չափով չի մեծանում նրան անհրաժեշտ կերի քանակը: Այդ քանակը, արտահայտ-

*) Հղիության սկիզբը համարվում է բուղի գալուց հետո միայն 3 ամիս, միջին շրջանը՝ 3-6 ամիս, իսկ վերջինը 6-9 ամիս:

ված կերի միավորներով, տատանվում ե 6-ի և 12-ի մեջ։
Ինչպես ցույց են տվել դանիացիների դիտողությունները, ինչպես նայեվ մի քանի գիտնականների ու սումմասիրությունները, անհրաժեշտ կերի քանակը կենդանի քաշից այնքան ուժեղ կերպով չի ազդվում, վորքան կաթնաբաղրությունից և մարմնի մակերեվույթից մեծությունից։ Վորքան կովը մեծ է, այնքան ավելի քիչ մարմնի մակերեվույթ ե ընկնում ամեն մի փութ կենդանի քաշին, իսկ վորքան կովը փոքր է, այնքան ավելի մեծ մարմնի մակերեվույթ ե ընկնում ամեն մի փութ կենդանի քաշին։ Իսկ վորքան մարմնի մակերեվույթը մեծ է, այնքան շուտ նա կսառչի, ուստի այնքան ավելի կեր կպահանջի մարմնի տաքությունը պահպանելու համար։

Բայց 40 փթանոց կովը չի պահանջում ուղիղ 2 անգամ ավելի կեր, քան 20 փթանոցը։ Յեթե այդ լերկու կովերը հագնասար չափով կաթ են տալիս, այն ժամանակ 40 փթանոց կովը կպահանջի 20 փթանոցից $1\frac{1}{2}$ անգամ ավելի պահպանող կեր, և վոչ թե 2 անգամ։

ԿԵՆՍԱՊԱՀ ԿԵՐԻ ԱՎԵԼԻ ՃԵՏԱՌ ԹՎԵՐ

ԿԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ ԱՐՑԱՀԱՅՏՎԱԾ

(Կազմել ե պրոֆ. Ե. Ֆ. Լիսկունը)

ԿԵՆԴԱՆԻ ԲԱԾ	ԿԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐ	ԿԵՆԴԱՆԻ ԲԱԾ	ԿԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐ
15	5,9	29	9,2
16	6,2	30	9,4
17	6,4	31	9,6
18	6,7	32	9,8
19	6,9	33	10,0
20	7,2	34	10,2
21	7,4	35	10,4
22	7,6	36	10,6
23	7,9	37	10,8
24	8,1	38	11,0
25	8,3	39	11,2
26	8,5	40	11,4
27	8,8	41	11,5
28	9,0	42	11,8

Այս տախտակը կազմելիս նկատի յէ առնված կենսապահ կերի քանակի փոփոխությունը համեմատած կենդանի քաշի և ժարմնի մակերեվութիւն մեծության հետ:

10. ՎՈՐՈՇ ՔԸՆԸԿՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԹ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎՈՐԸԸՆ ԿԵՐ Ե ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՏԱԼ ՏԱՎԱՐԻՆ

Բացի այն կերից, վոր տրվում է կովին իր կյանքը պահպանելու և իր պտուղը կերակրելու համար, պետք է նրան տալ նայել վորոշ քանակությամբ կեր՝ կաթ պատրաստելու համար:

Կերի այն քանակը, վոր կովը գործադրում է կաթ պատրաստելու համար, կոչվում է արտադրող կամ արդյունաբեր կեր:

Արդյունաբեր կերի քանակը վորոշվում է համեմատած կովի տված կաթի քանակի հետ: Վորքան կովը շատ կաթ է տալիս, այնքան ել շատ կեր պետք է տալ նրան:

Արդյունաբեր կերը կազմում են առավելապես ուժեղ կերերից կամ արմատապտուղներից. մինչդեռ ինչպես գիտենք, կենսապահ կերը կազմվում է գլխավորապես կոպիտ կերերից:

Պրակտիկ-տավորատերերը պարզել են, վոր կաթնատու կովը ամեն մի 3 ֆ. կաթ պատրաստելու համար պահանջում է 1 միավոր կեր (բացի կենսապահ կերից): Այսպես, յեթե կովը տալիս է 24 ֆ. կաթ, ուրեմն նաայդ քանակությամբ կաթ պատրաստելու համար պահանջում է $(24:3)=8$ կերի միավոր:

Բայց ամեն մի միավոր կերին 3 ֆ. կաթ տալիս է միայն լավ կաթնատու կովը. միջակ-կաթնատու կովը 1 միավոր կերից տալիս է միայն $2 \frac{1}{2}$ ֆ. կաթ: Միջակից ցածր կաթնատու կովերը 1 միավոր կերից տալիս են միայն 2 ֆ. կաթ:

Բացի կենսապահ կերից մի միայն կաթ արտադրելու համար կովին տրվող կերի (այսինքն արդյունաբեր կերի) չափը վորոշելիս մենք պետք եւ լավ հաշիվ տեսնենք, թե ի՞նչ արժե մեր տված արդյունաբեր կերը, և ի՞նչ արժե դրա դիմաց կովի տված կաթը։ Միայն մոտավոր հաշվով կարելի յեւ ասել, թե ինչքան արդյունաբեր կեր պետք եւ տանք կովին վորոշ քանակությամբ կաթ ոտանալու համար. դրա պատճառները շատ են և դրանց մասին առաջուց խոսել ենք։ Ինչպես ասացինք, լավ կաթնատու կովը կարող է տալ մոտավոր հաշվով ամեն մի կերի միավորի դիմաց 3 ֆ. կաթ։ Բայց դա ել մի վորոշ սահման ունի. փորձ ված ե, վոր լավ կաթնատու կովը այդ հաշվով հեշտությամբ կաթ կտա, որինակ մինչեւ 36 ֆ. այս քանակից ավելի կաթ կտա միայն վորոշ լարումով, որինակ 36 ֆ-ից ավելի կաթ կտա վոչ թե 1 կերի միավորից 3 ֆ. այլ կարող ե պատահել 2 ֆ. Յեթե ելի ավելացնենք հեշտ մարսվող կերեր, շատ դեպքերում գուցե հաջողվի կերն ավելի բարձրացնել, բայց արդեն այս անգամ մեկ կերի միավորից կըստանանք $1\frac{1}{2}$ ֆ. կաթ։ Իսկ յեթե ելի շարունակենք ավելացնել կերը, կհասնենք այնտեղ, յերբ կիմն այլևս չի ավելանում։

Այդ առթիվ մենք կարող ենք մեջ բերել հետեւյալ մոտավոր թվերը աղյուսակի մեջ։ Յեթե վերցնենք շատ կաթնատու նոր ծնած կով և նրա կերի վրա ավելացնենք հեշտ մարսվող կեր, ապա այս մոտավոր թվերից կտեսնենք, թե ինչ ազդեցություն եւ թողել ավելացրած կերը կիմը բարձրացնելու վրա.

ԹՈՒՆՏԵՐ

Բացի կենսապահ կերից ավելացրած եւ ուժեղ կեր կամ կերի միավորներ	6	9	12	15	18	20
Սահցված եւ կաթ	24	32	38	45	48	50
Մեկ կերի միավորից ստացված եւ կաթ	4	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{6}$	3	$2\frac{2}{3}$	$2\frac{1}{2}$

Վորքան ել կերն ավելացնենք, կիթը 50-60 ֆնտից ավելի չի կարելի բարձրացնել. որական մինչեւ 60 ֆ. կիթ կարելի յե ստանալ համեմատաբար քիչ դեպքերում, այն ել շատ կաթնառատ կովերից (հոլանդական):

Տավարատիրոջ գործն ե արդեն հաշվել, թե վորքան կարելի յե բարձրացնել արդյունաբեր կերի քանակը, վոր կերակրելը կաթի ու կերի գների համեմատ ձեռնութինի:

Յեթե կովը կերակրվում ե միայն խոտով և ուժեղ կերով, այն ժամանակ կարելի յե դեկավարվել հետեւյալ մոտավոր պարզ հաշվով, այն ե՝ ամեն մի փութ կենդանի քաշին տալ 1 ֆ. լավ խոտ, և բացի դրանից ամեն մի 3 ֆ. կաթին տալ 1 ֆ. ուժեղ կեր:

Պրակտիկ-տավարատերերը տավարի մոտավոր կերաբաժինը վորոշում են հետեւյալ ձեվով.—սկզբում իմանում են տավարի կենդանի քաշը և համապատասխան քաշին վորոշում են կենսապահ կերի չափը. այդ կերը կազմում են տնտեսության մեջ գտնվող կոպիտ կերերից: Որինակի համար 27 ֆ. կենդանի քաշ ունեցող և որական 30 ֆ. կաթ տվող կովի կենսապահ կերի քանակը պետք ե լինի 9 միավոր. այդ 9 միավորը կազմում են ձեռքի տակ յեղող կոպիտ կերերից. որինակ առվույտից, խոտից, դարմանից և այլն, այնպես վոր մոտավորապես ամեն մի փութ կենդանի քաշին ընկնում ե 1 ֆունտ կոպիտ կեր: Այս դեպքում կոպիտ կեր պետք ե վերցնել 27 ֆ: Այս քանակությամբ կոպիտ կերը 3 նվազում են տալիս տավարին. այդ 9 միավորը բաժանում են տնտեսության մեջ գտնվող 3 տեսակի կոպիտ կերերի վրա՝ համապատասխան նրանց պաշարին, այսինքն խնայելով այն կերը, վորից քիչ կա և վորը թանկ արժե: Այս դեպքում խնայելով առվույտը վերցնենք նրանից 2 միավոր, այսինքն 5 ֆ., ապա մարզագետնի խոտ 6 միավոր, այսինքն 18 ֆ: Պակասող մեկ

միավորի համար վերցնենք դարման, այսինքն 4 ֆ., ընդամենը 9 միավոր կեր:

Սովորաբար նոր կթվող կովին չի կարելի որական 4-5 ֆ. դարմանից ավելի տալ, յեթե կերաբաժինը մեծ մասամբ կոպիտ կերերից եւ կազմված. բացի հիշյալ կենաւալի կերից անհրաժեշտ եւ նայեվ տալ արդյունաբեր կեր: Մեր որինակում բերած կովին, պետք եւ տանք 10 միավոր կեր, հաշվելով մոտավորապես ամեն մի 3 ֆ. կաթին մի միավոր կեր: Մեկ միավոր կերին 3 ֆ. կաթ կարելի յեւ սպասել լավ կաթնատու կովից: ~~Պակաս կաթնատու և հին կթվող կովերը տալիս են ամեն մի կերի միավորին~~ 2—2 $\frac{1}{2}$ ֆ. կաթ: Այս 10 միավոր կերը կազմում են գլխավորապես ուժեղ կերից և մասամբ ել արմատապտուղներից, յեթե դրանցից կա: Զալետք եւ վերցնել միմիայն մի տեսակի ուժեղ կեր, այլ ըստ հնարավորության, մի քանի տեսակ, որինակ թեփ, վարսակի ալյուր, քուսպ և այլն: Յենթադրենք, թե մենք ունենք քուսպ, թեփ և վարսակի ալյուր: Այդ դեպքում ցանկալի յեւ հիշյալ 10 միավոր կերը կազմել հետեւյալ կերով՝

3 ֆ. քուսպ = 4 կերի միավ.

4 » թեփ = 4 » »

2 » վարս. ալյուր = 2 » »

Ընդամենը 10 կերի միավոր:

Անհրաժեշտության դեպքում, կարելի յեւ վերցնել ուժեղ կերեր և ուրիշ հարաբերությամբ, բայց միայն աչքի առաջ պետք եւ ունենալ, վոր կերի միավորների թիվը չը գոխվի:

Որինակ

1 $\frac{1}{2}$ ֆ. քուսպ = 2 կերի միավ.

4 » թեփ = 4 » »

4 » վարս. ալյուր = 4 » »

Ընդամենը 10 » »

Յեթե արմատապուղ կա, շատ ցանկալի յե արդյունաբեր կերի միավորների մոտավորապես կեսը փոխարինել արմատապուղներով:

Որինակ, յեթե ունենք ճակնդեղ, (տակ) կարելի յե 5 կերի միավորը փոխարինել նրանով, այն ժամանակ արդյունաբեր կերը կազմված կլինի 5 ֆ. ուժեղ կերից և 50 ֆ. ճակնդեղից:

Մեր հիշած կովի համար, վորի կենդանի քաշն եր 27 ֆ. և որական կիթը 30 ֆ. կերի միավորների ընդհանուր գումարն ե 19: Այդ 19 միավոր կերը մենք վերցրինք զանազան կերերից և ստացանք զանազան կերաբաժիններ՝ համապատասխան մեր տրամադրության տակ գտնվող կերերի և նրանց գների: Հետեվաբար նման հարցերը կարելի յե լուծել զանազան ձեվով, բայց համենայն դեպս չպետք ե փոփոխել, այսինքն չպետք ե վոչ ավելացնել և վոչ ել պակասացնել անհրաժեշտ կերի միավորների թիվը, խստությամբ հետեվելով այն կանոններին, վոր վերաբերում են կոպիտ և ուժեղ կերի և արմատապուղների քանակին:

Վերջնականապես ամբողջ որաբաժինը այսպես կազմվեց՝ (վերցրած ե որինակներից մեկնումեկը):

Առվույտ	·	5 ֆ.	=	2 կեր.	միավ.
Խոտ-մարզագետնի	·	18 »	=	6 »	»
Դարման	·	4 »	=	1 »	»
Քուսպ	·	3 »	=	4 »	»
Թեփ	·	4 »	=	4 »	»
Վարսակի ալյուր	·	2 »	=	2 »	»
<hr/>					
Ընդամենը	·	19 կերի միավ.			

Այդ նույն կովի համար կերաբաժին կարելի յե կազմել և ուրիշ կերից: Որինակ 4 ֆ. թեփը մենք կարող ենք փոխարինել 1 փութ ճակնդեղով, կամ թե 4 ֆ. դարման՝ 1 ֆ. քուսպով: Յեթե ընդհանրապես կերաբա-

Ժինը ձիշտ ե կազմված, այդ փոխարինումներից կաթի քանակը նկատելի չափով չպետք է փոխվի:

11. ԿԵՐԵԲԵԺԻՆ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Ամեն անգամ կերաբաժին կազմելիս պետք է աշխատենք, վոր նա 1) պարունակի բավարար քանակությամբ կերի միավորներ, 2) լինի վորքան կարելի յե բաղմատեսակ և համեղ տավարի համար, 3) հեշտ մարսվի և շատ չծանրաբեռնի տավարի ստամոքսը և 4) լինի հնարավոր չափով եժան:

Առանձին կերերի արժեքը վորոշելու համար հաշվում ենք՝ ինչ ե նստում մեր վրա ամեն մի առանձին կերի միավորը շուկայի գներով: Որինակ 1 փ. խոտը արժե 26 կոպ. *) իսկ մեկ փութ խոտի մեջ կա 13 միավոր կեր. հետեվաբար խոտի մեկ միավորը արժե 2 կոպ. 1 փութ ճակնդեղը արժե 4 կոպ. իսկ 1 փութ ճակնդեղի մեջ կա 4 միավոր կեր, հետեվաբար մեկ միավոր ճակնդեղը արժե 1 կոպ. այսինք 2 անգամ ավելի եժան, քան խոտը: Հետեվաբար, յեթե մենք ունենք բավարար քանակությամբ ճակնդեղ, կերաբաժին կազմելիս պետք ե աշխատենք վորքան կարելի յե շատ միավորներ զցել ճակնդեղի վրա, բայց ի հարկե առանց չափն անցկացնելու:

Վորքան կարելի յե, պետք ե աշխատել կերաբաժինը կազմել հատկապես այն կերից, վորոնց կերի մի միավորը ամենից եժան ե նստում: Այս հաշվով կերաբաժին կազմելիս վոչ միայն կաթ շատ կը ստանանք, այլև կաթը մեր վրա ավելի եժան կնստի:

Վորպես որինակ վերցնենք 2 բնորոշ դեպք: առաջին դեպքում կոպիտ կերի 1 միավորը 2 անգամ ավելի թանկ ե, քան ուժեղ կերինը. յերկրորդ դեպքում ընդհա-

*) Մինչ-պատերազմյան գներով

Կառակը կոպիտ կերի միավորը 2 անգամ եժան ե ուժեղ կերի միավորից:

Յենթադրենք, թե միեվսույն կովի համար մենք ուզում ենք վերոհիշյալ կերից կազմել կերաբաժին համապատասխան նրանց գների: Դիցուք թե ունենք մի կով, վոր ունի 24 փութ կենդանի քաշ և տալիս ե որական 36 ֆ. կաթ. հետեվաբար այդ կովին պետք ե տալ ընդամենը $(8+12)=20$ միավոր կեր:

Կերերի անունները	Մեկ փութ	Քանի կերի	Մեկ կերի
	կերի արժեք	միավոր կա փթի մեջ	միավորի արժեքը
Առաջին դեպքում			
Խոտ մարգագետնի. . . .	52 կոպ	13	4 կոպ.
Ցերենի թեփ.	80 »	40	2 »
Կտավատի քուսպ. . . .	106 »	53	2 »
Յերկրորդ գեպիում			
Խոտ մարգագետնի. . . .	26 կ.	13	2 կ.
Ցորենի թեփ.	160 կ.	40	4 կ.
Կտավատի քուսպ. . . .	212 կ.	53	4 կ.

Առաջին դեպքում, յերբ կոպիտ կերի միավորը 2 անգամ թանկ ե, պետք ե վերցնել կոպիտ կերից այն անհրաժեշտ քանակը, վորից պակաս չի կարելի տալ. իսկ դրա փոխարեն մասցած կերի միավորները լրացնել ուժեղ կերերով: Խոտի ամենափոքր քանակը, վոր անհրաժեշտ ե տալ կովին, այդ 15 փունտն ե = 5 միավոր կերի: Պակասում ե 15 միավոր. յեթե այդ կերին ավելացնենք ելի 4 ֆ. կտավատի քուսպ և 10 ֆ. թեփ, կստանանք պակասող 15 միավոր կերը:

Հետեվաբար հիշյալ կովի կերաբաժինը առաջին դեպքում կլինի:

15	ֆ.	խոտ	.	.	.	=	5	կերի	միավ.	և	արժե	20 կ.
10	»	թեփ	.	.	.	=	10	»	»	»	»	20 »
4	»	կտավատի	քուսպ	=	5	»	»	»	»	»	»	20 »

Ընդամենը 20 կերի միավոր արժե 60 կ.

Յերկրորդ դեպքում, յերբ կոպիտ կերի միավորը եժան է, իսկ ուժեղ կերի միավորը թանկ, պետք է վերցնել կոպիտ կեր վորքան կարելի յե շատ: Հիշյալ կովի համար պետք է վերցնել 30 ֆ. խոտ = 10 միավորի: Պակասում է ելի 10 միավոր. այդ 10 միավորն ել կը վերցնենք ուժեղ կերերից, այն ե 4 ֆ. կտավատի քուսպ և 5 ֆ. ցորենի թեփ: Այսպիսով կստանանք հետեւյալ կերաբաժինը:

30	ֆ.	խոտ	.	.	.	=	10	կերի	միավ.	և	արժե	20 կ.
5	»	ցորենի	թեփ	+	=	5	»	»	»	»	»	20 »
4	»	կտավատի	քուսպ	=	5	»	»	»	»	»	»	20 »

Ընդամենը 20 կերի միավ. արժե 60 կ.

Տեսնենք, թե ինչքան կնստեր մեզ վրա միեվնույն կովի կերաբաժինը, յեթե մենք փոխված գների հետ կոպիտ կերի քանակը չփոխեյինք:

Դրա համար առաջին կերաբաժինը թողնենք անփոփոխ և միայն բերենք յերկրորդ դեպքում յեղած գները, ուրիշ խոսքով թեպետ գները փոփոխվում են, մենք կերի քանակը չենք փոխում:

15	ֆ.	խոտ	=	5	կերի	միավորի—արժե	10 կ.
10	»	թեփ	=	10	»	»	» 40 »
4	»	քուսպ	=	5	»	»	» 20 »

Ընդամենը 20 կերի միավոր արժե 20 կ.

Հետեվաբար, յեթե մենք կերի մեջ փոփոխություն կատարենք համապատասխան նրանց փոխված գների, մենք հնարավորություն կունենանք կերաբաժինը եժանացնել 10-20 կոպեկով:

Կերաբաժին կազմելու ժամանակ, ինչպես արդեն

ասված ե, մենք պետք ե իմանանք, բացի կենդանի քաշից ու կիթից, նայեվ կովի չաղության աստիճանը, գոմի տաքությունը և մեր կերերի վորակը: 10⁰ տաքությունից ցած ամեն մի աստիճան կպահանջի վորոշ քանակությամբ ավելորդ կեր: Լղարած կովը հակառակ նորմայի կպահանջի 2-3 ֆ. ավելորդ ուժեղ կեր, իսկ չաղ կովն ընդհակառակը՝ 1-2 ֆ. պակաս:

Վատ ճահճային խոտի վոչ թե 3 ֆ.-ը, այլ 4 կամ նույնիսկ 5 ֆունտն ե հավասարվում 1 կերի միավորի: յեթե մենք առանց ուշադրություն դարձնելու այդպիսի խոտը համարենք միջակ արժանիքի կեր (այսինքն 3 ֆ. = 1 միավորի), այն ժամանակ կերաբաժինը սխալ կըկազմըվի:

Ընդհանուրապես վոչ մի ժամանակ չպետք ե կազմել կերաբաժին, առանց նախապես տավարին տեսնելու, առանց գոմի տաքությունն իմանալու և կերերը տեսնելու:

Այսպես ուրեմն, կերաբաժին կազմել նշանակում ե նախ վորոշել այն կերի միավորների թիվը, վոր պահանջում է կովը որական՝ համապատասխան իր կենդանի քաշին ու կիթին, ապա այդ կերի միավորները բաժանեք տնտեսության մեջ գտնվող զանազան կերերի վրա: Առ այդ, նորից հիշեցնում ենք, վոր չի կարելի պահանջվող կերի բոլոր միավորը կազմել միայն մի տեսակի կերից, որինակ միմիայն դարմանից կամ ուժեղ կերից կամ արմատապտուղներից, վորովհետեւ դա վատ ե ազդում տավարի առողջության վրա և մնաս ե տավարատիրոջ համար:

Կաթնատու տավարի կերաբաժին կազմելու ընդհանուր կանոնն այս է.—մենք պետք ե աշխատենք այնպես կազմել կերաբաժինը, վոր նրա մեջ մանեն վորքան կարելի յե շատ զանազան տեսակի կերեր, վոր նրա մեջ լինի դարման, արմատապտուղ և պալարապտուղ, խոտ և

ուժեղ կերեր, այն ե՛ տլյուրի թեփ, վարսակի ալյուր և քուսպ:

Բայց քիչ դեսլքերում են այդ բոլոր կերերը լինում մեր տնտեսության մեջ։ Մեծ մասամբ ստիպված ենք կերաբաժինը կազմել 3-4 տեսակի կերից։ Ամեն մի կովի համար կարելի յե կերաբաժին կազմել, յեթե կա թեկուզ հենց խոտ, դարման և թեփ կամ վարսակի ալյուր։ Բայց միմիայն խոտ ու դարմանից չի կարելի ճիշտ կերաբաժին կազմել լավ կաթնատու կովի համար այլ անհրաժեշտ ենայեվ ուժեղ կեր։

Յյուրաքանչյուր կերաբաժնին անհրաժեշտ ե ավելացնել գոնե քիչ քանակությամբ դարման, մանավանդ յերբ տավարին առատ արմատապտուղ ե տրվում, վորովհետեւ դարմանը վորպես կոպիտ կեր նպաստում ե մեծ քանակությամբ ստամոքսի հյութ առաջանալուն, վորով և հեշտացվում ե կերի մարսվելը։ Յեթե մեր կազմած կերաբաժնի մեջ կոպիտ կերը 15 ֆնտից պակաս ե, այն ժամանակ (յեթե արմատապտուղն ել քիչ ե) կովն իրեն կուշտ չի զգա, թեկուզ և կերաբաժնի մեջ ըստ հաշվի բավարար սննդարար նյութեր լինեն։ Վորպեսզի կովը իրեն կուշտ զգա, պետք ե կերաբաժնի մեջ լինի հայտնի քանակությամբ կոպիտ կեր։ Բայց դե ելի չի կարելի տալ չափից դուրս կոպիտ կեր, վորովհետեւ այդ դեպքում կովի ստամոքսը շատ կը լեցվի և կդադարի աշխատել։ Բացի դրանից, յեթե կոպիտ կերը վատ խոտ կամ դարման ե, կովս այդպիսի լերից շատ չի ուտի, ինչքան ել վոր առաջը լցնես։

Ընդհանուրապես պարզել են, վոր կերաբաժնը լավ ե ոգտագործվում այն ժամանակ, յերբ նրա մեջ մտնող կոպիտ կերն ու ուժեղ կերը կամ արմատապտուղները վորոշ կապակցության մեջ են իրար հետ քանակի և վորակի տեսակետից։

Պըակտիկ տավարատերերը հաշվում են, վոր որական

կերաբաժնի մեջ կոպիտ կերի քանակը չպետք է լինի ավելի 32-36 ֆնտից, արմատապտուղների քանակը վոչ ավել 80-100 ֆ.-ից, իսկ խտացրած ուժեղ կերի քանակը վոչ ավել 15 ֆնտից. բայց չի կարելի նայել տալ 15 ֆընտից պակաս կոպիտ կեր և 2 ֆնտից պակաս ուժեղ կեր։

Յեթե կոպիտ կերի մեջ լավ խոր կամ առվույտ շատ ե մտնում, այն ժամանակ հիշյալ 2 ֆ. ուժեղ կերը ցամաքած կամ հին ծնած, մոզամեր կովերին կարելի յե և չտալ։ Իսկ յեթե կերաբաժնի մեջ արմատապտուղ շատ ե մտնում, այն ժամանակ կոպիտ կերի քանակը կարելի յե պակսեցնել մինչեվ 10 ֆ. որական ամեն մի կովին։ Այն դեպքերում, յերբ տնտեսության մեջ կոպիտ կեր շատ կա և եժան ե, այլ և յեթե կոպիտ կերը վատն ե, կարելի յե նրանից տալ տավարին որական 35 ֆնտից ավելի, վորովհետեւվ այդ դեպքում տավարը կերի միջից կջոկի լավ մասը և կուտի, իսկ վատը կթողնի։

Զի կարելի կերաբաժնի մեջ մտնող ուժեղ կերն ամբողջովին մեկ տեսակի կերից վերցնել, այլ պետք է կազմել խառնուրդ թեփից, քուսպից և ալյուրից (վարսակի կամ յեղիպտացորենի) մոտավորապես հավասար քանակություններով։ Այսպես, յեթե պետք է որական տալ 12 ֆ. ուժեղ կեր, ցանկալի յե վերցնել 4 ֆ. թեփ, 4 ֆ. վարսակի ալյուր (կամ յեղիպտացորենի) և 4 ֆ. արեվածաղկի կամ կտավատի քուսպ։ Այսպիսի խառնուրդով (12 ֆ.) կերակրելիս ավելի շատ կաթ կստանանք, քան յեթե միայն ամբողջովին 12 ֆ. թեփով կերակրելինք։

Յերբ ցանկանում են վորոշել կիթին համապատասխան անհրաժեշտ արդյունաբեր կերի քանակը, դեկավարվում են հետեւյալ կանոններով։

Լավ կաթնատու կովին կթվելու ժամանակաշրջանի առաջին կեսին անհրաժեշտ ե տալ առավելապես ուժեղ կերերից կամ արմատապտուղներից կազմված կերաբաժննոր ծնած կովի կերաբաժնի մեջ դարմանի և խոտի քա-

նակը միավորների կեսից ավելի չպետք է լինի:

Յեթե կոպիտ կերի մեջ մի միավորն ավելի եժան է նստում, քան ուժեղ կերի մեջ, այն ժամանակ կթվելու ժամանակաշրջանի յերկրորդ կեսից հարկավոր է կամաց-կուտաց պակսեցնել ուժեղ կերի և թե արմատապտուղ-ների քանակը և դրանց փոխարինել խոտով ու դարձանով:

Ցամաքած կովի կերաբաժինը պետք է կազմվի զըլ-խավորապես խոտից կամ դարմանից և աննշան քանակությամբ ուժեղ կերերից:

Յուրաքանչյուր կովին ծնելուց հետո, քանի դեռ չկազդուրվել, մոտավորապես 6 որ կերակրում են թեթեվ, բայց սննդարար կերերով: Հենց վոր կատարելապես կազ-դուրվեց, կապում են այն կովերի շարքում, վորոնք ստա-նում են ամենալավ կերը, և թողնում են այդտեղ 10-15 որ (կաթի քանակի վրա ուշադրություն չեն դարձնում): Այդ ժամանակվա ընթացքում կովը կարծես թե փորձ-վում է, թե ինչքան կաթ կարող է տոլ: 10-15 որ հետո կերաբաժինը վերածում են կերի միավորների և հաշ-վում: Յեթե կովը տալիս է ամեն մի կերի միավորի դի-մաց 3 ֆնտից պակաս կաթ, այն ժամանակ նրան փոխա-դրում են իր կերին համապատասխան կեր ստացողների շարքը:

Յեթե պետք է լինում կերաբաժին կազմել այնպիսի կովերի համար, վօրոնց կերն ոգտագործելու ընդունակությունը մեզ սննայտ է, այն ժամանակ կիթին և կենդա-նի քաշին համապատասխան կերաբաժին կազմելուց հետո, ավելացնում ենք նորմայից դուրս որական յերեքական ֆ-ուժեղ կեր ամեն մեկին: Այդ այսպես կոչված փորձնա-կան կերաբաժինը մնում է 10-15 որ, վորից հետո նայած թե վորքան ե ավելացել կամ պակասել կիթը, սահմանում են ճիշտ կերաբաժին՝ համապատասխան կենդանի քաշին և որական կիթին:

12. ՆՈՐՄԵՆԵՐԱՎ. ԿԵՐԲԸԸԹԻՆՍԵՐ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՈՐԻ-
ՆԱԿՆԵՐ

Դիցուք թե մենք ունենք 3 կով. մեկը ցամաքած և
և ունի 30 ֆ. կենդանի քաշ. յերկրորդը՝ հին ծնած և,
ունի 21 ֆ. կենդանի քաշ և որական տալիս է 15 ֆ.
կաթ. յերրորդը նոր ծնած և, կենդանի քաշը 27 ֆ. և
որական կիթը 27 ֆ. եւ նոր ծնած կովը գեռ բուղի չի
յեկել, իսկ մյուս յերկուսը յեկել են. Մեր տրամադրու-
թյան տակ կան հետեվյալ կերերը՝ խոտ, առվույտ, դար-
ման, կտավատի քուսպ, ցորենի թեփ և ճակնդեղ: Յենթա-
դրենք, թե խոտն ու դարմանը բավարար քանակությամբ
են, իսկ մնացած կերերը քիչ են, ուստի և կերաբաժնի
մեջ պետք է մտնեն վորքան կարելի յե մեծ քանակու-
թյամբ խոտ ու դարման:

Կասկած չկա, վոր մենք այդ 3 կովերին չենք կերա-
կրի միատեսակ, այլ նախ կիմանանք, թե ամեն մի կովը
քանի միավոր կեր պիտի ստանա համաձայն իր կենդանի
քաշին և որական կիթին, ապա ամեն մի կովին համոզ
կերի միավորները կկազմենք մեր տրամադրության տակ
գտնվող կերերից: Միաժամանակ կաշխատենք խնայողու-
թյուն կատարել այն կերերի նկատմամբ, վորոնցից քիչ
ունենք և վորոնք թանկ են:

Ցամաքած կովի կենդանի քաշը 30 փութ է. հետե-
վաբար նա, ինչպես խոշոր կով, պետք է ստանա իր
կյանքը պահպանելու համար որական 10 միավոր կեր և
բացի դրանից փորի հորթի համար՝ ելի 1 կերի միավոր,
ուրեմն մեր ցամաքած կովը ամբողջ որվա համար պետք
է ստանա 11 միավոր կեր:

Յերկրորդ, հին ծնած կովը իր 27 փութ կենդանի
քաշի դիմաց պետք է ստանա որական 7 միավոր կեր.
բայց վորովհետեւ նա ծանրած է, ուրեմն պետք է ավե-
լացնել ելի 1 միավոր կեր փորի հորթի սնուցման համար.

բացի դրանից այդ կովը տալիս է որական 15 ֆ. կաթ, վորի համար նա պահանջում է 5 միավոր կեր: Հետեւ քար հին ծնած կովը պահանջում է որական 15 միավ. կեր, նոր ծնած կովը համաձայն իր 27 ֆ. կենդանի քաշին պետք է ստանա 9 միավոր պահպանող կեր., իսկ 27 ֆ. կաթ կազմելու համար ելի 9 միավոր: Հետեւ քար նոր ծնած կովին անհրաժեշտ է որական 18 միավոր կեր:

Իմանալով ամեն մի կովի կերի միավորների քանակը՝ մենք սկսում ենք ամեն մի կովի համար առանձին կերաբաժին կազմել մեր ունեցած կերերից այնպես, վոր վերցրած կերերն ընդհանուր առմամբ պարունակեն կերի միավորների այն քանակը, վոր մենք դուքս բերինք կովերի համար: Այդ անում են հասարակ ձեվով. նորմաները փոփոխում են այնքան ժամանակ, մինչեվ վոր վերցրած կերերի մեջ գտնում են կերի միավորների ցանկալի քանակությունը:

Բաշխելով կերերը և հաշվելով կերի միավորները, մենք կգտնենք ամեն մի առանձին կովի կերի նորման:

Վերեվում ըերած 3 կովերի կերակրմանը վերաբերող տվյալները հարմարության համար ի մի յեն հավաքված և արտահայտված են այս տախտակի ձեվով:

Դ Ա Վ Ե Ր Լ	Կ Ե Ն Պ Ա Խ Ա Դ	Գ Ր Ա Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Դ	Ա Մ Պ Ա Ր Ա Ջ Ա Դ	Կ Ե Ր Վ Ո Ր Ա Դ	Գ Ր Ա Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Դ	Կ Ե Ր Վ Ո Ր Ա Դ	Գ Ր Ա Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Դ	Կ Ե Ր Վ Ո Ր Ա Դ	Գ Ր Ա Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Դ	Կ Ե Ր Վ Ո Ր Ա Դ	Գ Ր Ա Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Դ		
Ցամաքածը .	30	—	11	—	11	16	12	—	2	—	1	—	11
Հին կթվողը .	21	15	8	5	13	8	9	5	2	2	2	—	13
Նոր ծնածը .	27	17	9	9	18	8	9	10	2	2	2	30	18

Հասկանալի յե, վոր այս նորմաները միշտ ճիշտ չեն.
Նրանց պետք է ամեն անգամ վորոշ փոխության յեն-
թարկել համաձայն տեղական տավարին ու կերերին:

Կարելի յե, իհարկե, կերաբաժին կազմել և ուրիշ
կերերից:

* Յեթե որինակ մենք չունենայինք ճակնդեղ, մենք
նրան կարող կլինեյինք փոխարինել Յ ֆ. վարսակի ալյու-
րով (Յ ֆ. ճակնդեղը իր սննդով հավասար է մոտավո-
րապես Յ ֆ. վարսակի ալյուրի): Կամ յեթե մենք չունե-
նայինք վորսակի ալյուր, մենք նրան կփոխարինեյինք Յ
ֆ. թեփով: Այսպիսի փոխարինումներից կովի կիթը շատ
քիչ է փոխվում:

Մի խոսքով, իմանալով առանձին կերերի սննդաբար-
ությունը, մենք կարող ենք կերաբաժնի մեջ վորոշ քա-
նակությամբ և վորոշ սահմաններում մեկը միուսով փո-
խարինել: Յեթե այս դեպքում կպահվեն այն կանոնները,
վորոնց մեջ ցույց են տրված կերաբաժնի մեջ մտնող
կոպիտ և ուժեղ կերերի ամենաբարձր և ամենացածր
քանակությունները, ապա այս ձեզով մի կերը մյուսով
փոխարինելիս կիթը նկատելի չափով չի պակասի: Միայն
անհրաժեշտ է հետեւել, վոր այդ փոխարինումների ժա-
մանակ կերի միավորների ընդհանուր գումարը չփոխվի:

Մի ուրիշ որինակ.

Կովի կենդանի քաշը 25 փութ է, իսկ որական կիթը
Յ ֆ. ունենք՝ խոտ, դարման, վարսակի ալյուր, ճակն-
դեղ, վարսակի դարման, ցորենի թեփ և արեվածաղկի
քուսպ:

Կովի որական պետք է ստանա:

Կենսապահ	կեր	8	միավ.
Արդյունաբեր	»	10	»

Ընդամենը 18 միավոր կեր.

Կենսապահ կերը համարյա ամբողջովին վերցնում են
կոպիտ կերերից, այն եւ

15 ֆ. խոտ. = . . . 5 կ. միավ.

10 ֆ. վարսակի դարման. $2^1/2$ » »

Արդյունաբեր կերը վերցնում ենք հեշտ մարսվող և
յուրացվող կերերից, այն ե'

25 ֆ. ճակնդեղ $2^1/2$ կ. միավ.

2 » վարսակի ալյուր . . . 2 » »

2 » ցորենի թեփ 2 » »

3 » արեվածաղկի քուսպ . 4 » »

Ընդումենը . . . $10^1/2$ կ. միավ.

Յեթե կովը հղի լե, պետք ե ավելացնել յեվո մեկ ֆ-
ուժեղ կեր:

Բայց մենք պետք ե ընդգծենք, վոր բոլոր մեջ բե-
րած նորմաները միայն միջին թվեր են: Յեթե կաթը
թանկ ե ծախվում, իսկ կերերը եժան են, անհրաժեշտ ե
կերաբաժինը միջին նորմալից ավելի բարձրացնել: Յեթե
կաթի գինը միջակ ե, պետք ե պահել կերաբաժնի միջին
նորման, իսկ յեթե կաթը եժան ե, պետք ե տավարը
կերակրել միջակից մի քիչ ավելի պակաս նորմաներով
Որինակ, յերբ կաթը թանկ ե և կերը համեմատաբար
եժան, պետք ե մեծացնել արդյունաբեր կերի քանակը՝
հաշվելով ամեն մի $2-2^1/2$ ֆ. կաթին 1 միավոր կեր:

13. ՏԱՎԱՐԻՆ ԿԵՐԱԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Կերաբաժինը կազմելուց հետո մենք պետք ե վորո-
շենք թե 'սախ' քանի անգամ պետք ե կերակրենք տա-
վարին, յերկրորդ՝ կերակրելու ժամերը և յերրորդ՝ առան-
ձին կերերը տալու կարգը:

Միաժամանակ պետք ե հիշենք, վոր 1) կովին պատ-
ճառած ամեն մի անհանգստություն վատ ե անդրադառ-
նում կիթի վրա. 2) ժամանակին չկերակրված կովը պա-
հում է կաթը և 3) կաթնատու կովը ընդունած կերը ծա-
մելու-վորոճալու համար պահանջում է յերկար ժամանակ
և յեթե նրան շուտ-շուտ մանր բաժիններով կերակրենք,

Նա ժամանակ չի ունենա կերը լավ ծամելու-մանրացնելու, ուստի և կերը լավ չի ոգտագործվի, քան յեթե կերը ուշուշ և խոշոր բաժիններով տանք։ Այդ նրանից ե, վոր կովի ստամոքսն առանձին կազմություն ունի։ Ուստի մենք պետք ե աշխատենք վորքան կարելի յե քիչ անհանգստացնենք մեր տավարը և ճիշտ վորոշված ժամերին կերակրենք, մաքրենք և կթենք։

Այն տնտեսություններում, վորտեղ տավարը բացառապես կոպիտ կերերով ե կերակրվում, խորհուրդ ենք տալիս որական 3 անգամ կերակրել տավարին. իսկ այն տնտեսություններում, վորտեղ տավարը կերակրվում ե բազմազան և ուժեղ կերերով, լավ ե և ձեռնտու, տավարին կերակրել միայն յերկու անգամ, վորովհետեւ կերերի ընդհանուր ծավալն այնքան մեծ չի, վորքան առատ խոտու դարման տալու ժամանակ։ Բացի այդ բազմազան կերը զրգում ե տավարի ախորժակը, ուժեղացնում ե թուքի և ստամոքսի հյութերի արտադրությունը, արագ և հաճախորդ ե ուտքում։ Այդ պատճառով, յեթե կերերը տալու կարգը ճիշտ ե վորոշված, ապա որական 2 անգամ կերակրելիս կերերը ավելի լավ են ոգտագործվում, քան յերեք անգամ կերակրելիս։ Իսկ յեթե ունենք բազմազան կեր և փոխանակ 2 անգամ կերակրելու յերեք անգամ ենք կերակրում, այդ դեպքում մենք իզուր տեղն ավելորդ անգամ անհանգստացնում ենք տավարին. իսկ ամեն մի ավելորդ անհանգստություն վատ ե անդրադառնում կիթի վրա։ Ահա թե ինչու Դանիայում սովորաբար տավարին կերակրում են որական 2 անգամ։

Յեթե տավարին կերակրում ենք 3 անգամ, այդ դեպքում կեր տալու ամենալավ ժամերն են՝ առավոտյան 5—7-ը, ցերեկվա 12-2 և յերեկոյան 6—8-ը։

Իսկ յեթե տավարին կերակրում եք որական 2 անգամ, այդ դեպքում կեր տալու ամենալավ ժամանակը առավոտյան ժ. 5—7-ն ե, և յերեկոյան ժ. 5—7-ը։

Տավարին որական 2 անգամ կեր տալու սովորությունը կա վոչ միայն ՚իանիայում, այլ և Արեվմտյան Ռուսաստանում և մեծ հաջողություն ունի:

Տավարին որական 3 անգամ կեր տալիս կերերը (արմատապտուղներ, խոտ և դարման) բաժանում են 3 մասի, մի մասը տրվում է առավոտյան, մյուսը՝ կեսորին, իսկ մնացածը՝ յերեկոյան:

Կերը տալու կարգը այսպես է. — սկզբում տալիս են ուժեղ կերերը, ապա արմատակամ պալարապտուղները, իսկ հետո կոպիտ կերերը: Ընդհանորապես պետք է սկսել լավ կերերից և վերջացնել վատերով:

Ուժեղ կերերը տրվում են կամ չոր դրությամբ, կամ թե մի քիչ դարմանի հետ խառնած ու ջրով թաց արած:

Վորպեսզի թուքի և ստամոքսի մարսողական հյութերի արտադրությունը ուժեղանա, պետք է կերաբաժնի մեջ մտնող ալյուրը կամ թեփը մի լավ խառնել թրջված և աղ արած դարմանի հետ: ՚Իարմանը վերցնում են ծավալով հաշված, ալյուրից մոտ 2 անգամ շատ. որինակ 1 աման ալյուրին վերցնում են 2 աման դարման:

Կովի ջրի տաշտի մեջ պետք է մշտապես մաքուր ջուր լինի, վորպեսզի կովն ուզած ժամանակը կարողանախմել, ՚Իանիացիք սովորություն չունեն ուժեղ կերերից ջրի հետ խաշիլ պատրաստել և տալ տավարին, վորովիետեվ նկատել են, վոր ջրի հետ խառնած ուժեղ կերը ավելի վատ է ոգտագործվում, քան չոր կամ դարմանի հետ խառնած դրությամբ: Իսկ յեթե կերաբաժնի մեջ դարման շատ է մտնում, այն ժամանակ նրա մի մասը պետք է թրջել աղաջրով, վրան շաղ տալ թեփ կամ ալյուր և խաշել. այդ դրությամբ կովերն ավելի ախորժակով են ուտում դարմանը:

14. ԻՆՉՊԵ՛Մ ԿԵՐԱԿՐԵԼ. ՏԱՎԱԹԻՆ ԱՄԱԾՈՅ

Ի՞նչպես իմանանք, թե ստանում ե՞ արդյոք մեր տալարը արոտից բավարար քանակությամբ կեր, թե վոչ։ Փորձված տավարատերը տավարի չաղությունից և կիթից համարյա միշտ ավել կամ պակաս ճշտությամբ կը-պատասխանի այս հարցին։

Յեթե տավարը լղարում ե (բայց ընդհանրապես առողջ ե) և արագ կերպով կիթը պակսեցնում, այդ նշանակում ե, վոր նա արոտից բավարար կեր չի ստանում, հետեւվաբար անհրաժեշտ ե լրացուցիչ կեր տալ նրան։

Իբրեւ լրացուցիչ կեր ամենից եժան են նստում զանազան տեսակի վիկաները, կանաչ առվույտը, այգու խոտը, զանազան տեսակի բանջարանոցային բույսերի տերեփսեր, այսինքն ընդհանրապես կանաչ կեր։ Բայց յեթե կանաչ կերը քիչ ե, այն ժամանակ անհրաժեշտ ե տալ ուժեղ կեր (ալյուր, թեփ, քուսպ) մի քիչ թացդարմանի հետ խառնած։

Լրացուցիչ կերի չափը վորոշվում ե գլխավորապես համաձայն տավարի կիթին ու չաղությանը։ Վորքան կովը շատ կաթ ե տալիս, կամ յեթե նա մինչ այդ վատ կերակրված լինելու պատճառով ե, վոր քիչ կաթ ե տալիս, պետք ե ավելացնել լրացուցիչ կերը։ Բայց միաժամանակ մենք պետք ե հաշիվ տեսնենք, թե ինչ ե նստում մեր վրա որական կերաբաժինը և ինչ արժե ստացված կաթը։ այնպես պետք ե լինի, վոր ստացված կաթի արժեքը ծածկի կերի ծախսը և մի բան ել մնա։

Ամառը, արածելու ժամանակ կաթնատու տավարին որվելիք լրացուցիչ կերի բանակը վորոշվում ե դիտողությունների միջոցով։

Յենթադրենք, թե մենք ունենք մի նոր ծնած կով,

վորը տալիս ե 12 ֆ. կաթ. Յեթե կովը լղար ե, բայց ընդհանրապես առողջ ե, պարզ ե, վոր արոտը նրան չի կշտացնում, վորպեսզի մեծ քանակությամբ կաթ տա և չլղարի: Ուստի մենք պետք ե կովին լրացուցիչ կեր տանք: Այդ լրացուցիչ կերի քանակը վորոշվում ե փորձով: Որինակ վերոհիշյալ նոր ծնած կովին ավելացնում ենք ելի 12 կամ 15 ֆ. լրացուցիչ կեր և դիտում ենք, թե ինչքան կովը կաթն ավելացը եց այդ լրացուցիչ կերն ստանալուց հետո: Յեթե կովն ավելացը եց ավելի պակաս կաթ, քան նրան տրված լրացուցուցիչ կերն արժեր, այն ժամանակ լրացուցիչ կերը պակսեցնում ենք: Այս հաշիվը տեսնում են կերն ավելացնելուց հետո յուրաքանչյուր 10 որը մի անգամ:

Հուլիսին և ոգոստոսին արոտում կանաչն սկսում ե պակասել և վորակով ել վատանում ե: Այդ տմիսներին արոտի կանաչը հազիվ բավականացնում ե տավարի կյանքը պահպանելու և 10 ֆ. կաթ տալու համար:

Յեթե կովը որական 10 ֆուտից ավելի կաթ ե տալիս, այդ դեպքում 10 ֆուտից ավելի տված ամեն մի 3 ֆ. կաթի համար նրան պետք ե տալ լրացուցիչ 1 ֆ. ուժեղ կեր կամ նրան համապատասխան ուրիշ կեր:

Հուլիսին և օգոստոսին նոր ծնած կովերին սովորաբար պետք ե տալ որական 6 ֆ. լրացուցիչ ուժեղ կեր կամ 90 ֆ. կանաչ կեր:

Սեպտեմբերին, հոկտեմբերի առաջին կեսին յեթե տավարն արածում ե մեր սովորական արոտներում, նա այնտեղից հազիվ իր կյանքը պահպանելու և 4-5 ֆ. կաթ տալու չափ կեր ե ընդունում, այն ել վոչ միշտ: Հետեւ վարար այդ ամիսներին, նույն հաշվով, ինչ վոր անցյալ ամիսներին, մանավանդ նոր ծնած կովերին, որական պետք ե տալ մոտ 8 ֆ. լրացուցիչ ուժեղ կեր: Յեթե այդ ժամանակ նոր ծնած կովերին լավ ուժեղ կեր չտանք, նրանք կլղարեն և արագությամբ կաթը կպակսեցնեն.

իսկ ձմրանն արդեն դժվար կլինի նրանց չաղացնել ու կիթը շատացնել:

Անհնարին ե տալ վորոշ ցուցմունքներ, թե ինչքան լրացուցիչ կեր ե հարկավոր ամառը արոտում արածող տավարին, վորովհետեւ այդ լրացուցիչ կերի քանակը մեծ կախումն ունի արոտի մեծությունից ու արժանիքից, վորը ամեն գեղքում մեկ չի լինում: Բայց այնուամենայնիվ մեջ բերված տվյալները, ստացված լինելով զործնական դիտողությունների միջոցով, կարող են տավարատիրոջը զերծ պահել կոպիտ սխալներից՝ այդ ուղղությամբ փորձեր կատարելու ժամանակ: Իսկ ավելի ճիշտ տվյալներ ստանալու համար պետք ե ամեն մի տավարատեր յուրաքանչյուր առանձին կենդանու և արոտի վերաբերմամբ փորձեր անի:

Գլխավորը, վոր ամեն մի տավարատեր պետք ե հիշի, այդ այն ե, վոր նրա տավարը ամբողջ տարին պետք ե կարգին դրության մեջ լինի:

Նորմալ չաղություն ունեցող տավարն ավելի լավ ե ոգտադործում իր ստացած կերը, այսինքն ամեն մի Փ. կերից տալիս ե ամենաշատ քանակություն կաթը:

Չպետք ե թույլ տալ, վոր կոթի քանակը խիստ կերպով միանգամից ընկնի – պակասի: Կարող ե շատ հեշտությամբ 2-3 որում կիթը կիսով չափ պակասել, բայց կիթը բարձրացնելն անհամեմատ դժվար ե: 2-3 որում պակասած կիթը 2-3 շաբաթում հազիվ կարելի յե բարձրացնել: Կիթերի խիստ տատանումները չափազանց վնաս են տավարատիրոջ համար և ցույց են տալիս, վոր տավարը կամ վատ ե կերակրվում կամ անկանոն ե պահպատմությունը:

15. Ի՞նչ ՏԱՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՈՏԱՏԵղ Ե ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՄԻ ՏԵՎԱՐԻ ՀԵՄԱՐ

Դժվար ե նախապես վորոշել, թե մի տավարի համար ինչ տարածություն արոտատեղ ե հարկավոր, վորովհետեւ ամենամեծ կաթը կամ ամենաշատ պահպատմությունը:

հետեւ ավելի ճիշտ վորոշելու համար պետք է ծանոթանալ արոտի հետ, տեսնել ինչ խոտ և և ինչ քանակությամբ ե աճում. աղա պետք է իմանալ տավարի կենդանի քաշը և թե վորքան ժամանակ տավարն այնտեղ պիտի արածի:

Այս հարցի վերաբերյալ կարելի յե միայն հետեւյալ մոտավոր տվյալները տալ.

Ամեն մի գլուխ տավարին հարկավոր է արոտատեղ՝

շատ լավ — $\frac{1}{2}$ դիսիատին

լավ — $\frac{3}{4}$ »

միջակ $1\frac{1}{2}$ »

վատ 2 և ավելի

Բայց, ինչպես մենք վերելում ցույց տվինք, այս սվյալները միայն կոպիտ-մոտավոր թվեր են:

Ամեն մի գլուխ կովին անհրաժեշտ տարածություն արոտատեղ վորոշելիս վոչ միայն պիտի ի նկատի ունենալ արոտի վորակը, այլ և կովերի հասակն ու կաթնատվությունը: Վորքան կովը խոշոր ու կաթնոտ է, տյնքան ավելի մեծ արոտատեղ է պահանջում:

Ի հարկե, այդ բոլորը հաշվել դժվար է, այդ պատճառով ստիպված ենք ոգտվել կոպիտ-մոտավոր տվյալներից:

16. ՑՈՒԼԻՆ ՊԵՏԵԼՈՒ ՅԵՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆԵՐԸ

Վորովիետեվ ցուլին պահելու և կերակրելու յեղանակը մի քիչ տարբերվում է կովերին պահելու ու կերակրելու յեղանակից, այդ պատճառով տալիս ենք դրավերաբերյալ կարճ կանոններ. . .

I. Ցուլը պետք է ամեն որ քարմողում ման զա: Այդ նպաստում է նրա սեռական ընդունակության պահպանամանը:

II. Ցուլին պետք է մաքուր պահել, վորովիետեվ կեղտու ցուլերի վրա վո՞լի և այլ միջատներ կառաջա-

նան, վորոնք կարող են անցնել կովերին՝ դուգավորման ժամանակ:

III. Ցեղական ցուլի կերաբաժինն ե միջին հաշվով 18 ֆ. խոտ, 4-8 ֆ. գարնան դարման և 5-10 ֆ. մանրացրած վարսակ: Զուգավորումների ուժեղ շրջանում ցուլին տրվում ե որական 10 ֆ. մանրացրած վարսակ, իսկ մնացած ժամանակը 3-4 ֆ. որական: Ցուլին արմատապառող տալ հարկավոր չի: Այսոր խոտին ու դարմանին փոխարինում ե արոտը:

IV. Ցուլին կերակրում ու ջրում են որական 2 անգամ. առավոտ և յերեկո ժ. 6—7.ին, դրա համար կերաբաժինը բաժանում են 2 հավասար մասերի. ցուլին մաքուր ջուր են տալիս: Կերերը պետք ե լինեն լավ տեսակի և չփշացած:

V. Չպետք ե ցուլին կերակրել իր ուղածի չափ. նաշուտով կդառնա դանդաղկոտ և շատ ծանը:

VI. Չի կարելի ցուլին տալ աշորու, սիսեռի և գարու ալյուր, ինչպես նաև չի կարելի նրան կերակրել արմատապառներով և սիլոսով, վորովհետեւ այդ կերերից նա շուտ չաղանում և զուգավորման համար անպետք ե դառնում:

VII. Չի կարելի ցուլին ծեծել. այլ պետք ե նրա հետքնքույշ վարվել. ցուլերի հետ կոպիտ վարվելիս նրանք չարանում են և այնուհետեւ դժվար կլինի նրա հախից զու:

ԿԼՅՈՒՎԵՐ-ՀՏՏՐԱՌԻՒՄ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ԿՐՁՔԻ ԳՐԱԲԵՐ	ԱԱՆՄԻՋԻՆ- ԱՄԵՐԻԿԱՆԴ	Կ ՀԱՆԴԱՆԻ- ՐԱԿ	ԿՐՁՔԻ ԳՐԱԲԵՐ	ՀԱՆԴԱՆԻ- ՐԱԿ								
ՅԵՐԿԱՐ.	122	ՅԵՐԿԱՐ.	126	ՅԵՐԿԱՐ.	130	ՅԵՐԿ.	134					
120	351	124	399	128	443	132	479					
122	367	126	415	130	456	134	499					
124	382	128	431	132	472	136	520					
126	396	130	444	134	488	138	543					
128	415	132	462	136	503	140	564					
130	431	134	478	138	520	142	581					
132	447	136	493	140	545	144	595					
134	460	138	512	142	562	146	617					
136	475	140	532	144	565	148	632					
138	494	142	549	146	597	150	647					
140	512	144	562	148	611	152	661					
142	528	146	583	150	625	154	686					
144	542	148	597	152	639	156	700					
146	560	150	603	154	661	158	717					
148	575	152	627	156	677	160	732					
150	588	154	654	158	683	162	756					
152	603	156	664	160	707	164	773					
154	620	158	678	162	732	166	793					
156	636	160	698	164	748	168	815					
158	651	162	715	166	766	170	832					
ՅԵՐԿԱՐ.	124	ՅԵՐԿԱՐ.	128	ՅԵՐԿԱՐ.	132	ՅԵՐԿ.	136					
122	372	126	424	130	447	134	527					
124	388	128	439	132	468	136	538					
126	404	130	454	134	490	138	549					
128	421	132	467	136	522	140	571					
130	437	134	487	138	534	142	588					
132	451	136	500	140	554	144	603					
134	466	138	517	142	571	146	625					
136	482	140	538	144	585	148	640					
138	501	142	555	146	608	150	655					
140	522	144	569	148	622	152	670					
142	538	146	589	150	637	154	694					
144	550	148	604	152	651	156	710					
146	571	150	617	154	673	158	726					
148	585	152	632	156	683	160	741					
150	601	154	654	158	705	162	766					
152	615	156	669	160	720	164	783					
154	632	158	683	162	742	166	804					
156	643	160	699	164	761	168	825					
158	655	162	725	166	781	170	842					
160	678	164	738	168	804	172	865					

<i>Կրծքական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կենդանական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կրծքական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կենդանական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կրծքական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կենդանական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կրծքական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>	<i>Կենդանական փաթետիկ սահմանային արևելյան լուսական ժամանակը</i>
<i>Յերկար.</i>	138	<i>Յերկար.</i>	142	<i>Յերկար.</i>	146	<i>Յերկար.</i>	150
136	539	140	597	144	669	148	705
138	558	142	615	146	674	150	722
140	577	144	630	148	689	152	739
142	597	146	654	150	705	154	764
144	610	148	669	152	722	156	782
146	632	150	660	154	747	158	800
148	648	152	700	156	764	160	817
150	664	154	725	158	781	162	844
152	678	156	742	160	798	164	864
154	703	158	759	162	825	166	886
156	720	160	775	164	843	168	910
158	736	162	800	166	865	170	927
160	750	164	817	168	880	172	947
162	776	166	839	170	906	174	971
164	793	168	864	172	926	176	996
166	815	170	881	144	949	178	1015
168	834	172	898	176	974	180	1046
170	853	174	920	178	992	182	1066
172	869	176	954	180	1021	184	1068
174	891	178	963	182	1133	186	1108
<i>Յերկար.</i>	140	<i>Յերկար.</i>	144	<i>Յերկար.</i>	148	<i>Յերկար.</i>	152
138	562	142	623	146	681	150	731
140	588	144	638	148	697	152	748
142	603	146	661	150	712	154	773
144	620	148	677	152	730	156	792
146	644	150	693	154	756	158	810
148	659	152	709	156	773	160	827
150	677	154	733	158	792	162	854
152	691	156	750	160	808	164	874
154	712	158	767	162	834	166	897
156	730	160	784	164	853	168	920
158	747	162	810	166	875	170	939
160	764	164	828	168	898	172	959
162	788	166	850	170	916	174	983
164	805	168	874	172	936	176	1008
166	827	170	891	174	959	178	1027
168	849	172	909	176	983	180	1052
170	866	174	932	178	1004	182	1080
172	883	176	955	180	1033	184	1100
174	908	178	975	182	1046	186	1120
176	920	180	1003	184	1067	188	1152

<i>զբարքի փաթել սահմանի միա- ուղիղը լուր</i>	<i>կենդանի բաշխութեա- ռակ</i>	<i>զբարքի փաթել սահմանի միա- ուղիղը լուր</i>	<i>կենդանի բաշխութեա- ռակ</i>	<i>զբարքի փաթել սահմանի միա- ուղիղը լուր</i>	<i>կենդանի բաշխութեա- ռակ</i>	<i>զբարքի փաթել սահմանի միա- ուղիղը լուր</i>	<i>զբարքի փաթել սահմանի միա- ուղիղը լուր</i>
Յերկար.	170	Յերկար.	174	Յերկար.	178	Յերկար.	182
168	1031	172	1100	176	1182	180	1271
170	1053	174	1127	178	1205	182	1293
172	1075	176	1157	180	1241	184	1320
174	1102	178	1179	182	1265	186	1344
176	1130	180	1213	184	1290	188	1385
178	1152	182	1237	186	1314	190	1409
180	1186	184	1259	188	1351	192	1438
182	1209	186	1283	190	1376	194	1463
184	1232	188	1321	192	1402	196	1487
186	1255	190	1347	194	1427	198	1527
188	1291	192	1371	196	1465	200	1564
190	1315	194	1396	198	1492	202	1598
192	1340	196	1433	200	1525	204	1613
194	1364	198	1459	202	1558	206	1643
196	1401	200	1491	204	1585	208	1688
198	1426	202	1525	206	1613	210	1721
200	1458	204	1540	208	1647	212	1752
202	1490	206	1576	210	1682	214	1795
204	1515	208	1610	212	1709	216	1824
206	1542	210	1645	214	1752	218	1852
Յերկար.	172	Յերկար.	176	Յերկար.	180	Յերկար.	184
170	1063	174	1142	178	1222	182	1301
172	1085	176	1171	180	1239	184	1328
174	1111	178	1193	182	1283	186	1359
176	1141	180	1227	184	1308	188	1398
178	1164	182	1253	186	1332	190	1423
180	1198	184	1276	188	1370	192	1449
182	1221	186	1301	190	1397	194	1476
184	1244	188	1337	192	1423	196	1515
186	1269	190	1363	194	1448	198	1545
188	1316	192	1388	196	1487	200	1579
190	1329	194	1413	198	1514	202	1613
192	1354	196	1451	200	1548	204	1640
194	1379	198	1477	202	1582	206	1669
196	1415	200	1510	204	1596	208	1703
198	1452	202	1543	206	1636	210	1740
200	1484	204	1569	208	1671	212	1769
202	1516	206	1596	210	1707	214	1813
204	1542	208	1631	212	1735	216	1842
206	1568	210	1667	214	1778	218	1871
208	1584	212	1693	216	1807	220	1901

<i>ԿԸՆՂԱՆԻ ՊՐԵՎՈՐ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>						
<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>	<i>ՎԻՆԱՐԵՎ</i>
<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	154	<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	158	<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	162	<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	166
152	760	156	823	160	884	164	954
154	787	158	842	162	914	166	981
156	805	160	860	164	933	168	1008
158	823	162	888	166	959	170	1027
160	842	164	908	168	985	172	1049
162	869	166	932	170	1004	174	1076
164	888	168	956	172	1024	176	1103
166	911	170	976	174	1050	178	1125
168	936	172	998	176	1077	180	1159
170	955	174	1022	178	1098	182	1181
172	975	176	1049	180	1109	184	1205
174	1000	178	1069	182	1131	186	1226
176	1026	180	1110	184	1176	188	1261
178	1046	182	1122	186	1198	190	1286
180	1076	184	1144	188	1231	192	1308
182	1098	186	1166	190	1253	194	1332
184	1119	188	1198	192	1278	196	1369
186	1139	190	1220	194	1301	198	1393
188	1172	192	1244	196	1336	200	1425
190	1194	194	1266	198	1360	202	1459
<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	156	<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	160	<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	164	<i>ՅԵՐԿԱՐ.</i>	168
154	797	158	850	162	924	166	996
156	811	160	872	164	943	168	1015
158	833	162	890	166	967	170	1042
160	841	164	917	168	994	172	1064
162	878	166	943	170	1004	174	1091
164	898	168	967	172	1033	176	1118
166	922	170	989	174	1060	178	1139
168	947	172	1008	176	1087	180	1174
170	965	174	1031	178	1110	182	1198
172	986	176	1063	180	1143	184	1220
174	1011	178	1085	182	1165	186	1349
176	1038	180	1113	184	1189	188	1278
178	1052	182	1135	186	1210	190	1303
180	1088	184	1158	188	1246	192	1325
182	1110	186	1179	190	1266	194	1349
184	1130	188	1211	192	1292	196	1386
186	1152	190	1235	194	1315	198	1413
188	1183	192	1258	196	1351	200	1444
190	1209	194	1280	198	1375	202	1476
192	1237	196	1315	200	1405	204	1501

<i>Երջքի գալոց պահեց սանութեա- տղնելուկ</i>	<i>Կենդանիի ըստ գնահա- րութեա- լու</i>	<i>Երջքի գալոց պահեց սանութեա- տղնելութեա- լութեա- լունիութեա- լու</i>	<i>Երջքի գալոց պահեց սանութեա- տղնելութեա- լութեա- լու</i>				
<i>Յերկար.</i>	186	<i>Յերկար.</i>	190	<i>Յերկար.</i>	194	<i>Յերկար.</i>	198
184	1340	188	1442	192	1525	196	1632
186	1371	190	1469	194	1552	198	1664
188	1410	192	1496	196	1596	200	1701
190	1437	194	1525	198	1624	202	1734
192	1463	196	1556	200	1660	204	1763
194	1490	198	1590	202	1697	206	1792
196	1530	200	1630	204	1725	208	1829
198	1558	202	1667	206	1754	210	1871
200	1592	204	1693	208	1791	212	1901
202	1627	206	1724	210	1830	214	1952
204	1656	208	1759	212	1859	216	1981
206	1685	210	1797	214	1907	218	2013
208	1720	212	1827	216	1937	220	2043
210	1750	214	1875	218	1969	222	2091
212	1785	216	1903	220	2001	224	2125
214	1829	218	1934	222	2047	226	2169
216	1859	220	1964	224	2070	228	2209
218	1890	222	2011	226	2120	230	2244
220	1919	224	2042	228	2161	232	2275
222	1965	226	2075	230	2165	244	2293
<i>Յերկար.</i>	188	<i>Յերկար.</i>	192	<i>Յերկար.</i>	196		
186	1391	190	1481	194	1573		
188	1430	192	1510	196	1618		
190	1457	194	1538	198	1646		
192	1484	196	1581	200	1682		
194	1510	198	1610	202	1720		
196	1552	200	1645	204	1748		
198	1580	202	1681	206	1778		
200	1615	204	1709	208	1815		
202	1651	206	1740	210	1854		
204	1679	208	1776	212	1884		
206	1708	210	1813	214	1932		
208	1743	212	1842	216	1963		
210	1781	214	1891	218	1995		
212	1810	216	1920	220	2028		
214	1856	218	1952	222	2074		
216	1886	220	1984	224	2108		
218	1917	222	2030	226	2150		
220	1947	224	2062	228	2191		
222	1993	226	2101	230	2224		
224	2025	228	2131	232	2257		

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Եջ

Յերկու Խոսք	3
Մասն I Ինչպես պետք է պահել կարնատու տավարը	5
1. Կաթնատու տավար պահելու նպատակը	5
2. Կաթնատու տավար պահելու ընդհանուր կանոնները	6
3. Տավարն ինչպես պետք է պահել ամառը	23
4. Տավարի վատության գլխավոր պատճառներից մեկը վատ արոտն է	24
5. Մի քանի ընդհանուր կանոններ ամառը տավարն արո- տում պահելու վերաբերյալ	26
Մասն II Ինչպես պետք է կերակրել կարնատու տավա- րին Դանիայում ընդունված ձեզով	29
6. Ինչու պետք է կաթնատու տավարին կերակրել անպայ- ման իր քաշի համեմատ	29
7. Կերի տեսակները	33
8. Ինչպես փոխարինել մի կերը մյուսով	—
9. Տարբեր կենդանի քաշ ունեցող տավարին ի՞նչ քանակու- թյամբ կեր է հարկավոր իր առողջ գոյությունը պահ- պանելու համար	55
10. Վորոշ քանակությամբ կաթ ստանալու համար վորքան կեր և հարկավոր տալ տավարին	60
11. Կերաբաժին կազմելու ամենակարեվոր կանոնները	65
12. Նորմանելով կերաբաժիններ կազմելու որինակները	72
13. Տավարին կերակրելու կարգը	75
14. Ի՞նչպես կերակրել տավարին ամառը	78
15. Ի՞նչ աւարածության արստատեղ է հարկավոր տավարի համար	80
16. Ցուլին պահելու և կերակրելու կանոնները	81
17. Կլյուշեր - Շտրառուխի աղյուսակը	83

ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

Եջ—20 վերեվից հաշված 13 և 14-րդ տողերը ավելորդ են, ամ-
բողջովին պետք է ջնջել:

» 22 » » 3-րդ տողում տպած է «ուստի զագ» պետք
» կարդալ «ուսի գազաթից»

» 64 » » 21 տողում տպած է «մեկն ու մեկը»
պետք է լինի «մեկը»



ՀՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ Խ. ՅԵՐԻՑՅԱՆԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ «ՄԱՑԿԱԼԻ»
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՐԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼ
ԳՐՔՈՒՅԿԱՆԵՐԸ

1. Խ. ՅԵՐԻՑՅԱՆ — Ինչպիսի աերժացու ղիտի ցանել (սպառված)
2. Բամբակի և կաղումքի զատատուները Գինն և 12 կ. չերվ.
3. Խ. Կ. Բագդանով — Ընտանի կենդանիների քոռը
Գինն և 12 կ. չերվ.
4. Պ. Գրնելյան — Բամբակի չոռ հիվանդությունը
Գինն և 12 կ. չերվ.
5. Պ. Կ. Սոկովնին — Ի՞նչպես պետք է կովել չորության դեմ
անջրդի հողերում — Գինն և 15 կ. չերվ.
6. Պրոֆ. Պ. Կոսիկյան — Ի՞նչ կա հողի մեջ և ինչպիսի հողեր են
լինում — — — Գինն և 10 կ. չերվ.
7. Խա. Տեր-Շերտիսյան — Խճճորենու զատատուները և նրանց դեմ
կովելու միջոցները — Գինն և 12 կ. չերվ.

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0002742

264.

A II
23868



Օ Ա Տ Վ Զ Գ
ԳԻՆՆ Ե Յ Յ ԿՈՊ.
—