

04 AUG 2010

ՍՍՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄՍՏԻ ՏԵԽՊՐՈՂ

ՈՐԻՆՈՒԿԵԼԻ

ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀԱՏԻԿԱՅԻՆ
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ИСТОРИКО-ЭТНОЛОГИИ
Ленинградского Науч
СССР

ԱԶԵՐՆԵՇՐ

ԴՅՈՒՂԱՏՆՏ. ԲԱԺԻՆ

ԲԱԳՈՒ

1934

630.018

Ա - 11

630.013
634-11

С 34-И
Ca 674

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ПОСТОЯНСТВЕННОГО
Академии Наук
СССР

ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԱՐ- ՆԱՆԱՅԻՆ ՀԱՅԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒ- ՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՎՈՐՈՇՈՒՄ № 119

ԱՍԽՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ, 1934 թ.
ՓԵՏՐՎԱՐ 7-ԻՑ.

Տեխարայի յեվ դաշագործական վարչության ներկայացրած որինակելի ագրիկանոնները չալթուկի կենափի, կանեփի, այգեգործության, բանջարաբուծության, արախիսի, խաղողագործության, գարնանային ցորենի ու գարու յեվ ծխախոտի համար, հաստատել:

Առաջարկել բոլոր ուայ. հողբաժինների յեվ ՄՏԿ-ներին, յուրաքանչյուր կուլտուրայի համար սրվող ագրիկանոնների հիման վրա առաջափոր կոլտոգների յեվ սովխոզների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կազմել ագրիկանոններ համաձայն իրենց ուայոնների պայմաններին յեվ Ռայգործկոմների կողմից քննարկվելուց հետո մինչեվ մարտի 20-ը ներկայացնել ԱՍԽՀ Հողծողկոմատին՝ հաստատելու համար:

Հողծողկոմատից հաստատված ուայոնական ագրիկանոնները, վորոնք պեժ Ե հրասարակվեն վորպես պարտադիր վորոշում—Ռայգործկոմի նախագահությանը՝ անցկացնել կյանում:

Հողծողկոմ Վ.ԵԶԻՐՈՎ.

Հայերենը խմբագրեց Ս. Շախունի,
Թարգմանեց Հ. Սարգսյան,
Տեխ.-խմբագիր Կ. Թառյանյան

Баş Мәтбуат Мыдриллиги Мывәккиллиги № 2030 Сифариş № 313 Тираж 500.
İstehsalata verilmiş 15/III-34 Capa verilmiş 2/IV-34. Cap listi 110.
Kağız formatı 82X110. Azərnəşr mətbəəsində basıldı. Bakı, Əli
Bajramov küçəsi, 26"-lar adına, Kitab Sarajı"

15.01.2013

1 ՅՈՐԵՆ, ԳԱՐԻ ՅԵՎ ՎԱՐՍԱԿ

1. Հողի նախապատրաստելը.— Նոր հողամասեր յուրացնելուց, վորոնք հերկված չեն յեղել, նույնպես և վաղուց հերկված հողամասերում թփուտների, կոճղերի, քարերի առկայության դեպքում պարտադիր կերպով հողամասերի մաքրումը կատարել, գյուղատնտեսական գործիքների անարգել աշխատանքի համար:

2. Հողի մեակումը: Սովխոզների և կոլխոզների, նույնպես և անհատական տնտեսությունների համար գաղնանային հացահատիկի համար աշնանավար կատարելը պարտադիր է: Աշնանավարը կատարել հոկտեմբերի և նոյեմբերի ընթացքում: Հերկված դաշտի ծայրերը չորս կողմից պիտի հերկվեն: Աշնանավարի խորությունը 15-18 սանտիմետր: Արմատավոր մուխոտներով վարակված հողերը պետք է հերկել մինչև 20 սանտիմետր, նայած արմատի արձակած խորության, բայց այն պայմանով, իսկ թույլ չլորվի հողի ներքին շերտի շրջելը: Դեկտեմբերյան և առանձնապես հունվարյան հերկը բերքը զգալիորեն ավելի քիչ չափով է բարձրանում, քան թե աշնանային հերկը:

Աճանազավարի նախացանխային մեակումը.— աշնանավարի հերկի նախացանքային փխրացումը կատարել յերեսահերկիչներով կամ չորս խոփանի գութաններով, ցաքանները քիչ են պետքական այդ նպատակի համար:



56058-66

Գարնանահերկ. — Գարնանային հացահատիկային կուլտուրաների գարնանահերկին անցնել, հենց վոր այդ թույլ կտա հողի խոնավության զրուծյունը. հերկել 12-15 սանտիմետր խորությամբ: Ավելի ծանր հողերում պարտադիր կերպով սկալառակել հերկը և այնուհետև զիգ-զազ ցաքանով 1-2 հետք անցնելով, անմիջապես ցանել:

3. Սերմերի ցանքսին նախապատրաստելը. — Ցանելու հատիկի 100⁰/0-ային զտումը տրեւերներով և տեսակավորող մեքենաներով, պարտադիր է:

Մըով, կամ այլ սունկային հիվանդություններով վարակված սերմերը — թունախեղդել:

Ցորենը թունախեղդել չոր յեղանակով, վարսակը և գարին — թաց:

Բացառապես թունախեղդել զտած սերմանյութը: Թունախեղդումը կատարել գյուղատնտեսի կամ վնասատուների դեմ պայքարող ընկերության հրահանգի դեկավարությամբ:

Չոր թունախեղդումը կատարել փարիզյան կանաչ թունավոր փոշիի ոգնությամբ (յուրաքանչյուր 16 կիլոգրամ հատիկին 8 կամ 9 գրամ) կամ Դավուզովի պրեպարատով (յուրաքանչյուր 16 կիլոգրամ հատիկին 16-18 գրամ), մկնդեղաթթվային կալցիոնի փոշիով կամ AB պրեպարատով:

Թաց թունախեղդումը կատարել ֆորմալին թունավոր նյութը ջրի մեջ լուծելու ոգնությամբ. տակառներում, գուլներում կամ ուրիշ ամանում պատրաստում են լուծույթը մի բաժին ֆորմալին (ըստ ծավալի) լուծելով 300 ծավալ ջրում:

Վորպեսզի 160 կիլոգրամ հատիկ լվանալ, պետք է վերցնել 100 գրամ 40⁰/0 ֆորմալին և նրան լուծել 36 լիտրի մեջ (3 գուլ ջրում):

4. Ցանքսի ժամկետները. — Գարնանային հացահատիկները ցանքսի սկիզբն ու վերջը յուրաքանչյուր ռայոնում հաստատվում է Ռայոնդեպոնի կողմից և պարտադիր են յուրաքանչյուր տնտեսության համար:

Հանձնարարվում են հետևյալ որինակելի ժամկետները.

Գարնան ցորեն, լեռնային ռայոններում	10/IV — 25/IV
նախալեռնային	25/III — 14/IV
Գարնան գարի, լեռնային ռայոններում	1/IV — 15/IV
նախալեռնային	10/III — 1/IV
Վարսակ, լեռնային ռայոններում	20/III — 15/IV
նախալեռնային	5/III — 1/IV

5. Սերմելու յեղանակները. լեռնային վայրերում, վորտեղ շարքացանից ոգտվելն անհնար է շնորհիվ մակերևութի կազմության պայմանների, թույլատրվում է շաղացան: Հարթ հողամասերում կատարել շարքացան:

Հացահատիկային կուլտուրաների սերմերի սերմելու խորությունը 2-4 սանտիմետր, նայած հողի վերին շերտի խոնավությանը, վորքան նա խոնավ է, այնքան ցանքսը յերես է կատարվում: Փխրուն հողում սերմերն ավելի մեծ խորությամբ են սերմրվում, քան թե ավելի ծանր հողերում:

6. Մի հեկտարի վրա ցանելու նորման:

	Շարքացան	Շաղացան
1) Գարնան ցորեն . . .	1,2 ցենտներ	1,5 ցենտ.
2) Գարնան գարի . . .	1,0 »	1,3 »
3) » վարսակ . . .	1,1 »	1,3 »

Նորման յենթակա յե Ռայնոդրաթնի ճշտմանը և հաստատմանը:

7. Աղտոսված հողամասերում կատարել մոլախոտերի այրումը.—Մոլախոտերը տեղերում և ցանքսի շուրջը հարել:

8. Ջրելը.—Ջրովի ուայոններում, վորտեղ գարնանային բույսերից հիմնականում կարելի յե հանդիպել միայն վարսակ, պետք ե յերկու անգամ ջրել.

1) — Բուղում գցելու ժամանակ

2) — Ծաղկելու ժամանակ

9. Բերահավաք.—Հարթ հողամասերում հունձը կատարել մեքենաներով. ցորենի հունձը, վորոնք հեշտ թափվող են, կատարել մոմային հասունության շրջանում այն հաշվով, վոր հունձն ավարտվի 5-7 որվա ժամկետում:

2թափվող ցորենի համար հնձի ժամկետը կարելի յե յերկարացնել մինչև 10 որ:

Գարին հնձել կատարյալ հասունացման սկզբին, հնձելու ժամկետը 8-10 որ:

Վարսակի հունձը կատարել ներքևի հասկերի հասունության մոմենտին: Հնձելու ժամկետը 5-7 որ:

10. Պայքար կորուսների դեմ բերահավաքի շրջանում.

1.) Հունձը կատարել սահմանված ժամկետին, թույլ չտալ ցանքսերի յերկար կանգնելը վոտի վրա, վորից թափվում ե:

2.) Հնձած հացը խուրձեր կապել և կազմել կուտակներ կամ բարդեր, հենց այստեղ դաշտում չորացնելու համար:

3.) Դաշտում մնացած բոլոր հասկերը հավաքել ձիան կամ ձեռքի փոցիների ոգնությամբ:

4.) Հնձած հացը տեղափոխելուց սայլերը կամ ֆուրգոնները կահավորել տակի փողոցներով, թույլ չտալով, վոր հատիկները ճանապարհին թափվեն:

11. Կալսելը վոչ մի դեպքում չձգձգել, այն վերջացնել վոչ ավելի քան 10-15 որվա ժամկետում:

Կալսելուց առաջին հերթին ոգտագործել յեղած կալսիչ մեքենաները:

Կալսած հացահատիկն անմիջապես անցկացնել յերնելու մեքենայով, տեսակավորողով և տրիերով:

Հացահատիկը պահել ախտանանած, չոր և լավ քամհարած ամբարներում:

12. Կալսումը վերջացնելուց անմիջապես հետո պետությանը հանձնել պարտավորության համաձայն հասանելիք հացահատիկի քանակը, ավելի առողջ և վորակավոր հացահատիկից սերմային և ապահորդրական ֆոնդերի առանձնացում կատարել:

Սերմային և ապահովագրական ֆոնտերն առանձնացնելիս ղեկավարվել հատուկ հրահանգով:

II ՅԵԳԻՊՏԱՅՈՐԵՆ

Հողի նախապատրաստումը և մշակումը (աշնանավար, գարնան հերկ) կատարվում ե այնպես, ինչպես այդ հաստատված ե գարնանային հացահատիկների (ցորենի, գարու, վարսակի) համար:

1. Յեգիպտացորենի սերմերի նախապատրաստումը. սերմերի համար ընտրել առողջ, լիքը և մի գույնի գլուխներ:

Ցանելու համար ընտրած գլուխները պետք ե կալսվեն վոչ ուշ քան 15-20 որ ցանելուց առաջ և շնորհիվ նրանց սովորական խոնավության, պետք ե չորացրվեն մինչև նրանց կարծրանալը:

Չորացիները կատարվում է հատիկները բարակ շերտով փոշիով, չոր և լավ քամհարվող շենքերում, յերանելով ամեն օր:

Ցանելուց առաջ յեգիպտացորենի սերմերը պետք է փորձել նրանց տնտեսական պիտանիության և ճուշակության տեսակետից:

2. Յեգիպտացորենի ցանքսը կատարվում է հետևյալ ժամկետներում

Լեռնային ռայոնները	. . .	25/IV—15/V
Նախալեռնային »	. . .	20/IV—15/V
Դաշտավայրերում »	. . .	20/V—10/V

Այդ ժամկետները սահմաններում յեգիպտացորենի ցանելու ժամանակը ճշտվում է Ռայոնդեմոնի կողմից:

Մի հեկտարի վրա ցանելու յեգիպտացորենի նորման—32 կիլոգրամ հատիկ է:

Յեգիպտացորենի ցանելը պարտադիր կերպով կատարել յեգիպտացորենի կամ բամբակի հատուկ շարքացանով:

Ցանելուց պահպանել ուղիղ և հավասար շարքեր կուլտիվատորով միջշարքային մշակումն կատարելու համար:

Ցանող մեքենաների բացակայության դեպքում, շարքացանը կատարել թորխով, բուկիկերով կամ թևը հանած թեթև գուլթանով:

Սերմերը գցելու խորությունը 5-7 սանտիմետր: Շարքերի մեջ տարածությունը պահպանել 50-80 սանտիմետր, իսկ շարքերում նոսրացում կատարելու դեպքում, տարածությունը պետք է լինի 30 սանտիմետր:

Վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում յեգիպտացորենի ցանելը չորացած հողում:

3. Ջրելը—Յեթև ցանելու ժամանակ հողը չորանում է (Ջրովի ռայոններում), յեգիպտացորենի ցանումը կատարել արաթով, վերջինիս նորման՝ 1500—2000 խորանարդ մետր մի հեկտարին:

1 Ջրելը—(չհաշված արաթը) կատարել ծողկելու ժամանակ, 11 Ջրելը՝ հատիկները լցնելու ժամանակ: Նորման 1000-1200 խորանարդ մետր մի հեկտարին:

4. Անամբր.—Առաջին քաղհանը շարքերի 30 սանտիմետր տարածության վրա նոսրացման հետ կատարել առաջին հինգ տերեր յերևալու ժամանակ:

Հետագայում, կախված մոլախոտերի զարգացման ուժից, կատարել վոչ պակաս քան միջշարքային յերևու կուլտիվացիա, վորից մի կուլտիվացիան կատարել շարքերի մշակման (քաղհանի) գուգընթաց: Կուլտիվացիայի և փխրացման խորությունը վոչ ավել 7.8 սանտիմետր:

Յեգիպտացորենի վրա սուռնկային հիվանդություն յերևալուց (բշտկավոր մուր), վնասված բույսերը հեռացնել դաշտից և այրել:

5. Յեգիպտացորենի քաղումը հատիկ դարձնելու համար կատարել հատիկի կատարյալ հասունացած մոմենտին: Հավաքած յեգիպտացորենը պահել գլուխներով չոր և լավ քամհարվող շենքերում:

Գլուխները կախել հարկ յեղած դեպքում:

6. Գլուխները չորացնելուց անմիջապես հետո կատարել սերմային և ապահովագրական ֆոնդերի առանձնացումը լավ հատիկի հաշվին:

III ԲԱՎԿԱԲՈՒՅՍԵՐ

1. Բակկաբույսերի ցանքսը անպայման կատարել աշնանավարում (տես I գլուխ):

2. Սերմերի նախապատրաստելը:—Յանելուց առաջ անպայման կատարել սերմերի մաքրումը և նրանց տեսակավարումն՝ ըստ քաշի և չափի:

Այն դեպքում, յեթե բակլաբույսերի սերմացուների մեջ մնաստառուներ լինեն, անպայմանորեն սերմացուն պետք է թունախեղդել:

Յանելուց առաջ անհրաժեշտ է սերմերը փորձել. 80-90%-ից ցածր և մաքրությունը 90 տոկոսից ցածր սերմերը հանձնարարվում է չցանել:

3. Յանելը:—Սիսեռը, փոլորն և լոբին պարտադիր կերպով ցանել շաբաթային յեղանակով 60-70 սանտիմետր շաբաթամիջով:

Վոսպ ցանելը, նկատի առնելով վոր նա բուսնում է ԱՍՍՆ լեռնային ռայոններում թույլատրվում է շաղաքացան:

1 Հեկտարի ցանելու նորման

Սիսեռի	. . .	0,9	ցենտներ
Վոլորն	. . .	0,9	"
Լոբի	. . .	0,7	"
Վոսպ	. . .	1,0	"

Բակլաբույսերի ցանքը պետք է կատարվի հետևյալ ժամկետներում.

Զոնաներ . Սիսեռ և փոլորն	Լոբի	Վոսպ
(Ռայոններ)		
Լեռնային	—	25/IV-15/V 1/IV-25/IV
Նախալեռնային	25/III-15/IV	5/IV-10/V 25/III-20/IV
Դաշտային	15/III-1/IV	15/IV-5/V —

Սերմերը գցելու խորությունը, կախված նրանց չափից և հողի հերկած շերտի դրությունից, պետք է լինի 4-6 սանտիմետրի սահմաններում: Վոչ մի դեպքում թույլ չի տրվում բակլային բույսերի ցանումը չորացած հողում:

4. Ձրելը.—Բակլաբույսերը ջրովի ռայոններում ցանելու մոմենտին հողը չորացած լինելու դեպքում անհրաժեշտ է արաթ կատարել 1 հեկտարին 1500.1600 խորանարդ մետր նորմայով:

Բակլաբույսերի (գլխավորապես նոխուղի) վեգետացոն ջրումը դաշտային և նախալեռնային վայրերում վորպես կանոն, կատարել մի անգամ ծաղկելու շրջանում:

5. Բակլաբույսերի ցանսի խնամք. Պարտադիր կերպով անցկացնել վոչ պակաս քանյերկու քաղհան, վորոնցից.

1-ը միաժամանակ նոսրացումով անցկացնել յերրորդ դոյդ տերեւները յերեալու ժամանակ:

2-րդը, կախված մոլախոտների զարգացման չափից, բայց վոչ ուշ ծաղկելու սկզբից:

Վոչ մի դեպքում թույլ չտալ ցանքներում մոլախոտային բուսականության խիստ զարգացումը:

Դաշտային հարթ տեղերում պարտադիր կերպով առաջին քաղհանի փոխարեն անցկացնել յերկու կուտիվացիա ձիով, փխրացնելով շաբաթամեջերը:

6. Բերհաճավաք.—վոչ մի դեպքում թույլ չտալ բակլաբույսերի վոտի վրա յերկար կանգնելը: Ժամանակին չհաժաքելն առաջացնում է բերքի զգալի կորուստներ:

Հարած բույսերը փոքրիկ դեղերով դարսվում են դաշտում չորանալու համար:

Հասունացած բանլաբույսերը բարձելուց և տեղափոխելուց թույլ չտալ ուժեղ թափահարումը:

Դա մեծ կորուստներ է պատճառում:

Բակլաբույսը դաշտից տեղափոխել սայերով և սայլակներով, վորոնց տակը փռել կապերաներ կամ բրեգենտներ:

կայսումը կատարել 10-15 որում:

7. Կայսումը.—կայսելուց հետո կատարել պետա-
կան պարտավորությունները—առանձնացնել սերմա-
յին և սպահովագրական ֆոնդերը բացառապես տմե-
նախոշոր, առողջ և չոր հատիկի հաշվին:

Սերմերը պահել նախորոք ախտահանված չոր և
քամհարվող շենքերում, պահեստներում:

IV ԿՈՐԵԿ

Կորեկի ցանքսը կատարել գարնանն աշնանավարի
վրա:

Հողի գարնանավարի նախապատրաստելը, մշա-
կումը և նախացանքային մշակումը պետք է կատար-
վեն, ինչպես և մնացած հատիկայիններինը (տես վերև):

1. Կորեկ ցանելու հետևյալ որինակելի ժամկետ-
ներն են սահմանված:

Լեռնային ռայոնները . . . 1/V-20/V

Նախալեռնային . . . 1/V-25/V

Դաշտային(ջրովի) . . . 1/V-1/V

2. Ցանքսը հարթ տեղերում կատարել շաբաթյին:

Ցանելու նորման—30 կիլոգրամ մի հեկ-
տարին: Սերմանյութերի զտումը—100 տոկոս:

Սերմելու խորությունը—2-4 սանտիմետր:

3 Խնամքը. մոլախոտերի քաղհանումը սկսել առա-
ջին տերևները դուրս գալուց անմիջապես հետո,
վորովհետև այդ ժամանակ կորեկն առանձնապես
կարիք է զգում խնամքի:

Հետագայում, նայած մոլախոտերի զարգացման
ուժին, կատարել վոչ պակաս քան 2-3 թեթի քաղհան:

4. Բերհանավար. հունձը սկսել ներքին հաս-
կերի և միջին հասկերի մեծ մասի հասունանալու
մոմենտին:

ԱԳՐԱՄԻՆԻՄՈՒՄ ՎԱՂ ՅԵԼԻ ՀԱՄԱՐ

1. Վաղ ցելը (ինչպես և սեր) միայն այն ժամա-
նակ է իր նշանակությունը ստանում, վորը կայա-
նում է հողի քերրիություն բարձրացման մեջ, յերբ
ժամանակին մշակելով պահվում է մոլախոտ բույսե-
րից մաքուր դրության մեջ: Հակառակ դեպքում ցելը
փաստակար է և հանդիսանում է մոլախոտների բու-
սատեղ:

2. Յելերը մոլախոտային բուսականությունից
մաքուր վիճակում պահելը պարտադիր է հայտարար-
վում:

3. Մոլախոտերի դեմ պայքարը պետք է տանել
վոչ թե ցաքանելով, այլ բազմախոփ դութանի հեր-
կով:

4. Վաղ ցելերը պարտադիր են այն ռայոնները
սովխոզների, կոլխոզների և անհատական տնտեսու-
թյունների համար, վորտեղ ամառային տեղումներ
են լինում:

Ծանոթություն: Այն ռայոններում, վորտեղ չոր անանձրե
ամառներ են լինում, հանձնարարվում է ուշ ցելը, առանց
ցաքանելու և կրկնահերկի:

5. Վաղ ցելի հերկի ժամկետ է սահմանվում ապ-
րիլ և մայիսը, ուշի համար 18-20 սանտիմետր:

6. Վաղ ցելի հերկի խորությունը 15-18 սանտի-
մետր, ուշի համար հունիսը:

<< Ազգային գրադարան



NL0276843



2Р/

15177

С 34-1
С 674

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ПОСТОЯНСТВЕНН
Академия Наук
СССР

27 МАЯ 1934

Техпрот НКЗ АССР

Примерные агроправила по зерновым
яровым культурам

Азербайджан—Сельхозотдел Баку—1934.

63
U-11