




Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported** (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

30 JUL 2010

ԲԺ. Բ. Հ. ՆԱԶԱՐԵԱՆ

ԹՈՒՔԱԽՏԸ ՅԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԵՋ



616.9
u - 15

ԹՈՒՔԱԽՏԻ ՅԵՐՈՐՅԱԿ ԱՆԻՐԿ. ՅԵՐԿԱԹԱԳԾԻ ՎՐԸ
ԹԻՖԼԻՍ—1925

09 JUL 2013

610
159-ՆԱ

ՅԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ԲԱՐԱԿԱՑԱԿԸ
(ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈՋԸ)

1003
10309



ԱՇԽԱՏԵՑԵՔ ԱՄԵՆԱՅՆ ՏԱՐԻ ՅԵՐԵՒԱՆԵՐԻՆ ԱՄԱՌԸ ԳՅՈՒՂ ՈՒՂԱՐԿԵԼ:
ՊԱՀՊԱՆԵՑԵՔ ՅԵՐԵՒԱՆԵՐԻՆ: ԹՈՒԲԱՏՈՎ, ԱՎԵԼԻ ՀԱՃԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱ-
ՆՈՒՄ ԵՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿՈՒՄ:

ՅԵՐԵՐԵ ԶՊԵՏՔ Ե ՀԱՄԲՈՒՐԵԼ, ՅԵՐԵՒԱՅԻ ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԸ:


ՅԵՐԵՒԱՆԵՐ, ԹՈՒՅԼ ԶՏԱՔ ՄԵԾԵՐԻՆ ՀԱՏԱԿԻ ՅԵՎ, ԳԵՏՆԻ ՎՐԱ
ԹՔԵԼ:

ՅԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Ե ԿԱԶՄԻ ՆՈՒՅՆ-
ՊԵՍ ՊԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԻՆԶՊԵՍ ՅԵՎ, ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄԸ:

ՍՅ-ԲՅԻ

ՅԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ԲԱՐԱԿԱՑԱՎԸ

Մոտ անցեալում բարակացավ (տուբերկուլոզ) համարվում եր զուտ մեծերի հիվանդութիւնն և վոր այդ ախտը խնայում է մանկական հասակը:



Գեորգիանական հայոցի գիւմական Ռ. ԿՈՆՏ, վորին հաջողվեց 1882 թ. գտնել բարակացավի բացիւնները

Այդ կարծիքը տիրապետում եր մինչև 1882 թ. յերբ գերմանական հայտնի գիտնական Ռ. Կոխին հաջողվեց գտնել բարակացավի բացիւնները:

Բարակացավի բացիլները

Այդ բացիլները պատճառ չեն դառնում մարդկության սոսկալի հիվանդության՝ բարակացավի — թոքախտի ու իրենցից ներկայացնում չեն մանր ցուպիկներ, վորոնք նկատելի են դառնում միայն խոշորացույցի միջոցով. 400 անգամ մեծացրած:



Բարակացավի բացիլները խոշորացույցի տակ:

Բարակացավի բացիլի ապրելու ու աճելու համար ամենահարմար պայմաններն են ջերմություն 37° — 38° . ապրելի բարձր կամ ցածր տաքությունն աստիճանը մեղմում է այդ ախտի բացիլները:

Արևի ջերմությունը մահաբեր է համարվում այդ բացիլների համար: Բարակացավը ավելի տարածված է այն ընտանիքներում, վորոնք ապրում չեն խոնավ, արևից ու առհասարակ լույսից զուրկ բնակարաններում՝ և այդ պատճառով աղքատ ու աշխատավոր դասակարգը ավելի շատ զոհեր է տալիս, քան հարուստ ու բարեկից կեանք ունեցող դասակարգը:

Բարակացավի լավ բարեկամներն չեն համարվում. չքավորությունը, հարբեցողությունը, չարքաշ աշխատանքը և տգիտությունը:

Մատաղ սերնդի ամենամեծ տոկոսն է բռնված այդ ախտով: Մինչև հինգ տարեկան յերեխաների 43% վարակված է թոքախտով: Հինգից մինչև 15 տարեկանը վարակված չեն 90% — 95% , գրեթե ամբողջ մանուկ սերունդը:

Այսպես ուրեմն դեռ չըհասունացած ու ամրապնդված մանկական որգանիզմը ամենահամար և դյուրամատչելի պայմանների մեջ է գտնվում բարակացավի տարածման ու զարգացման համար:

Բարակացավի բացիլների վարակման ճանապարհները

Թոքախտի բացիլներն իրենց մուտք չեն գործում մանկական որգանիզմի մեջ զանազան ճանապարհներով:

Այսպես որինակ բարակացավի վարակման հաճախ յենթարկվում չեն շնչառության գործարանները: Նույնիսկ յենթե յերեխան ապրում է բարենաշող պայմաններում դարձյալ ապահովված չէ թոքախտի վարակումից, շնորհիվ նրան, որ այդ ախտով վարակված հիվանդներ ամեն տեղ ու ամենուրեք կան, մանավանդ մեծ քաղաքներում, վորտեղ նրանք թքում չեն գետնին, իսկ մենք գիտենք, վոր նրանց խորխոր իրեն մեջ պարունակում է ահագին թվով տուբերկուլոզային (բարակացավային) բացիլներ, այդ բացիլները փոշու հետ խառնվում չեն շնչելիք ոդի մեջ և այդպիսով ընկնում մանկան շնչառության գործարանը, կամ թե չէ մանկան կերակրող հարազատ մայրը կամ ծծմայրը հիվանդ չեն թոքախտով և հազարու ժամանակ իրենց խորխոր հետ դուրս չեն ցայտեցնում բարակացավի բացիլները վորոնք վարակում են մանուկի շնչելիք ոդը:

Վարակման գլխավոր պատճառներից մեկն էլ մանկական հասակում շատ տարածված գեղծախտն է (զոլոտոխան): Գեղծախտով յերեխաները շատ հաճախ չեն հիվանդանում նույնպես բրոնխիտով կամ շնչառության ճանապարհների բորբոքումով՝ և այդպիսով լավ հող են պատրաստում բարակացավի բացիլների ներսմուծման մանկան մարմնի մեջ:

Բարակացավի վարակումն կատարվում է նույնպես մարսողական ապարատի միջոցով: Բարակացավի բացիլները ուտելիքի, կամ ինչպես տեղի է ունենում շատ հաճախ մանկական հասակում, ըմպելիքի հետ են ներս մտնում մանկան որգանիզմը: Որինակ վարակումը կատարվում է կովւ կաթի միջոցով յեթե մանկան կերակրում չեն բարակացավով հի-

վանդ կովի հում կաթով, կամ յեթե մանկան ծնողները հիվանդ յեն լինում բարակացավով և համբուրում յեն մանկան բերանն ու շրթունքները և կամ թուքով թրջում յեն մանկան կերակրելիք (սոսկան) ծծակը, կամ ուտելիք հացը:



Գեղձախտով (զոլոսուխա) հիվանդ յերեխաներ:

Վերջապես բարակացավի ախտով վարակումը կատարվում է մարդու մաշկի միջոցով. յեթե վեելինս լինում և վիրավորված. վերքը ախտավորվում է բարակացավի բացիւններով: Շատ հաճախ և պատահում, վոր փոքր յերեխաները սկսում յեն սողալ դետնի վրա ու յերբեմն ել զանազան տեսակի վերքեր են գոյացնում նրանց վուրքերի, ձեռքերի և մարմնի զանազան մասերում և այդ վերքերը թեև շատ աննշան են, բայց ախտոտվելով հատակի փոշու մեջ, ուր արդեն դուբերկուրդի բացիւնները կան, վերջինքս մտնում յեն վերքերի մեջ ու այն տեղից արդեն անցնում ավշանոթների (лимфатический путь.) միջոցով ու կանգ առնում մոտակայ ավշադեղձերում, վորով և առաջ յեն բերում վերջինքիս բորբոքումը:

Բարակացավով հիվանդության տեսակները

Այսպիսով մենք համառոտակի ծանոթացանք բարակացավի բացիւնների և մանկական որգանիզմի նրանցով վարակման ճանապարհների հետ:

Այժմս անցնենք բարակացավի այն ձևերին, վորոնցով հիվանդանում են մանկական հասակում:

Գեղձային բարակացավ

Ամենա բարենթացք ու քիչ մահաբեր է յերեխաների գեղձային տեսակի բարակացավով հիվանդությունը, վորը առաջ է գալիս նրանից, վոր այս կամ այն ճանապարհով բարակացավի բացիւնները մուտք են գործում մանկան գեղձերի մեջ, վորտեղ կարող են յերկար տարիներ մնալ առանց վորև և մի հիվանդություն պատճարելու: Բայց բավական է, վոր մանկան որգանիզմը յենթարկվի վորևե աննպաստ պայմանների ու թուլանա մանկան մարմնի ինքնապաշտպանողական ուժը, իսկույն և յեթ բարակացավի բացիւնները սկսում են իրենց մահաբեր գործը:

Հիվանդ յերեխաները սկսում են ջերմել, նիհարել, գունատվել, ախորժակը ընկնում է, գիշերները քրտնում են ու վերջապես աչքի է ընկնում յերեխաների հազը, վորը նմանում է հաչոցի. այդպիսի հազը շատ անգամ շրփովում են կոկլուշի (կապպտահազի) հետ, բայց հիվանդի հետ մոտիկ ծանոթանալը փարատում է կասկածները, և համոզվում յերեխայի ռարակացավով հիվանդ լինելուն— ցինցղային (бронхиальные железы) գեղձերի ուտած լինելու պատճառով, այդ դեպքում մանկան շնչառությունը շատ դժվար է կատարվում: Շատ անգամ պատահում է վոր ծնոտի և վզի գեղձերը ուռչում են, բորբոքվում, թափափալում և բացվում. իսկ յերբ թարախից մաքրվում են, վզի ու ծնոտի վրա թողնում են սպի (рубец):

Վոսկրային քարակացավ

Այդ ձևի վարակումը թեև հիվանդի համար ավելի թեթև է անցնում, վոր մահացու հետևանք չի ունենում, բայց և այնպես մանկանը այլանդակում է ու շատ հաճախ անդամալույծ է դարձնում մինչև կյանքի վերջը. բոլոր կու-



Կուզիկ յեթխան, վոսկրային քարակացավով հիվանդանալու հետևանքով:

արդեն բորբոքումը անցնում է և թարախը կանգ է առնում, այդ ժամանակ արդեն ձեռքի կամ վոտքի հիվանդ խաղերը կորցնում են իրենց նորմալ ձևը և աշխատողները են լինում:

Թոքերի քարակացավը

Մահաբեր ու վտանգավոր է թոքախտը մանկական հասակում յերբ քարակացավը. թոքերի բորբոքումն է առաջ բերում ու թոքերը կարճ ժամանակամիջոցում կարծես թե քարակացավի բույսերի ավերիչ գործունեյու-

ղիկները, կաղերի մեծ մասը, կամ ծուռ ձեռքերով անդամալուծները, սրանք բոլորը զոհ են վոսկրային քարակացավի, վորով վարակված են յեղել մանկական հասակում:

Մեծ մասամբ վոսկրի քարակացավը սկսվում է վոտքերի ու ձեռքերի խաղերի բորբոքումից, վորոնք թարախակալում են ու յերկար ժամանակ թարախը կանգ չի առնում և վոսկորը վերքի սահմաններում քանի դնում փրկաբանում, փշրվում է ու յերբ

թյան տակ այրվում են, հիվանդ յերեխան շատ դժվարությամբ է շունչ քաշում: Հազում է, խորխը ահագին քանակությամբ քարակացավային բացիլներ են պարունակում. տաքությունը հասնում է բարձր աստիճանի:



Վոսկրային քարակացավի հետևանքով յեթխայի վոտքի վրա ազդումը:

Աղիքների քարակացավը

Վոչ պակաս մահաբեր ու քայքայիչ է աղիքների քարակացավը:

Մարսողության գործարանների քարակացավը բնվորոշում են ստամոքսային խանգարումները, վորոնք շատ անգամ առաջ են բերում քարակացավային վերքեր աղիքներում: Սաստիկ ու անդադար լուծելը, վորը տեղի է ունենում այդպիսի վարակման դեպքերում, քամում, հալ ու մաշ է անում մանկական որզանիզմը ու շատ հաճախ պատճառ դառնում նրա մահվան:

Քարակացավային մենինգիտ

Յեթե քարակացավի բացիլները ընկնում են ընդհանուր արյան հոսանքի մեջ, այն ժամանակ քարակացավի բացիլները կանգ են առնում զանազան գործարաններում և այնտեղ բուռն են դնում ու շատ հաճախ մանկական հասակում այդպիսի սերմված ու թագնված քարակացավի բները պատճառ են լինում մանկական հասակում հազվագյուտ մահաբեր հիվանդության տուբերկուլոզային մենինգիտի, վորը իրենից ներկայացնում է ուղեղապատյանի բորբոքումը:

Յերեխաների բարակացավի դեմ կռվելու միջոցները


Այդպես ուրեմն, մենք գտնում ենք, վոր մանկական հասակում բարակացավի տարածումը համեմատ ե մեծ ծավալի և հիվանդութեան տեսակները բազմաթիվ են.

Զնայած նրան վոր մահացողութեան 0/6-ը քիչ է, բայց այդ ախտը մանկական հասակում հոգ է պատրաստում իր զարգացման համար ավելի մեծ հասակում:

Վորպեսզի մանուկ սերունդը ազատ պահել թոքախտի վարակումից, անհրաժեշտ է ձեռք առնել մի շարք կարևոր միջոցներ. նախ յեւ առաջ անհրաժեշտ է բարելավել ինչպես ընակչութեան այնպես յեւ տնտեսական ու նյութական պայմանները: Վորքան վոր մանկան մնումը և վ է, այնքան նրա որգանիզմը հաջող կարողանում է ղիմաղըել այդ ախտի ներգործման: Միաժամանակ անհրաժեշտ է բարելավել ընակարանային յեւ սանիտարական պայմանները, նամանավանդ մեծ քաղաքներում: յերեխաները չպետք է ապրեն խոնավ, մութ յեւ արեգակի լոյսից զուրկ ընակարաններում:

Պետք է ամեն կերպ արգելի գետնին թքելը, կերակրելը յերեխաներին կեղտոտ ծծակով, համըտրելը մանկան ընդանը յեւ վերջապես նպաստել յերախտների ֆիզիոլոգիայով պարապելուն, վորպեսզի նրանց ֆիզիկական դրութեանը ավելի ամրապնդվի:

Բժ. Բ. 2. ՆԱԶԱՐՅԱՆ



«Ազգային գրադարան»



7205

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՐՈ. ՅԵՐԿԵԹ. ԸԹՎԵՐՉՈՒԹ. ՍԵՆԻՏԵՐ. ԼՈՒՍԵՎՈՐ. ՅԵՆԹՐԵԹՆԻ

Главлит № 927.

Тираж 500.

Թբիլիս, ժ. Տ. Գ. Խ. Պոլիգր. Տր. 4-րդ ապ., Պաշկին, փ. № 3