




Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
նչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material

633.5
7-48

20642

24 SEP 2010

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ Լ
ՐԱՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

№ 5

**ԾԽԱԽՈՏՆԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐԻ
ՑԱՆՈՒՄԸ**

633.5
7-48

9

3

1

Մասնաշաղկապներն փորձեր անելը գյուղատնտեսության արագորեն սոցիալիստական վերակառուցման գրավականն է:

Կոլխոզներ, սովխոզներ, դաշտային տնտեսություններ լավագույն ձևով տանելու համար, գիտական հարցերը փորձերի միջոցով վճռեցեք:

Գյուղատնտեսական խմբակների միջոցով փորձեր կատարեցեք ձեր հողերի վրա, գյուղատնտեսի անմիջական ցուցմունքներով:

Աշխատեցեք ձեր դաշտերի ծխախոտի բերքը և վորակը բարձրացնել:

Ծխախոտի ամեն մի ավելի ցենտները, կուլակին—խորհրդային իշխանություն թշնամուն—տրված հարված է:

— ՅԱՆՆԵԼԻՔ ՀՈՒՆՏԻ ՎՈՐՆԿԸ ԵՎ ՔՆՆՆԵԼԸ.

Առողջ շիթիլ ստանալու համար, պետք է հետևել պետական ծխախոտաբուծական հիմնարկի փորձերով ստուգված ծխախոտի հունտեր ցանելու չափանիշներին, այսինքն ապակյա շերմոցի 1 քառ. մետրի վրա ցանելու յե 1 գրամ, իսկ բացողչա ածուներում 1, 1 գր.: Լավագույն պայմաններում հունտը ծլում է 90%: Որինակ՝ մի հեկտար տնկելու համար, ապրիլի շերմոցում, պետք է ունենալ 42 քառ. մետր ցանված մակերես, բացողչա ածուների պայմաններում՝ 45 քառ. մետր, վորի համար առաջին դեպքում որոշվում է 42, իսկ յերկրորդ դեպքում 45 գր. ծխախոտի հունտ: Յուրյ տրվածի հակառակ, ցանքի չափը ավելացնելու դեպքում, տալիս է թույլ, յերկարած շիթիլներ, վորոնք շատ անգամ շերմոցներում յենթարկվում են հիվանդությունների և դաշտում տնկելիս վատ են բռնում ու փճանում են, հետևաբար առաջացնում են բանվորական ուժի անարդյունաբեր վատնում: Չափից ավելի ցանցառ ցանելիս, շիթիլները նույնպես լավ վորակ չեն ունենում—կարճ ցողունավոր—վորը հնարավորություն չի տալիս շիթիլը պահանջված յորությամբ տնկելու և մեծ տոկոսով տնկում է առաջացնում:

Ինչքան հունտ պետք է ցանել շերմոցներում, վորպես զի 100 հեկտար ծխախոտ տնկվի:

Վերև բերված հաշվից կարելի յե յենթադրել, վոր բավական է ունենալ մոտավորապես 5 կիլոգրամ հունտ: Պետական ծխախոտաբուծական հիմնարկությունը յորհուրդ է տալիս կրկնակի չափով ունենալ, այսինքն 10 կիլո

գրամից վոչ պակաս, հետևյալ պատճառներով: Անբարենպաստ յեղանակները կարող են ուշացնել պատրաստի ծլեցրած հունտերի ցանումը, իսկ հետո զրանք անպետք կլինեն, սառնամանիքներ պատահելու կամ ուրիշ պատճառներով շիթիլների փճացում, վորի համար պետք է լինում նորից ցանել կամ թե չե, հունտը քիչ տոկոսով ծլելիս, պետք է լինում չափանիշը ավելացնել:

— ԶԵՐՄՈՅՆԵՐՈՒՄ ՅԱՆՆԵԼՈՒ ՓՆՄՆՆԵԼԸ.

Յանքսի ժամանակը աչքի առաջ ունի գլխավորապես ծխախոտի հասունացնելու շտապեցումը, ամենանպաստավոր յեղանակին հավաքելը և չորացնելը: Իրա համար, նկատի ունենալով, վոր ծխախոտը դաշտում աճելու և հասունանալու համար պահանջում է 3—4 ամիս և վերջին հավաքվածը չորացնելու համար բարենպաստ 3 շաբաթ ժամանակամիջոց, հետևաբար պետք է ջանալ շուտ ցանել շերմոցում, շիթիլները տնկելուց գրեթե 2 ամիսներ առաջ:

Վորպեսզի ծխախոտի տնկումը իրա ժամանակին ապահովվի, շերմոցներում ցանելը սկսելու յե մարտ ամսի կեսերին: Այս ժամկետը այս կամ այն կողմ կարող է փոխվել, նայած շրջանի կլիմայական պայմաններին:

Շիթիլների տեղափոխումը պետք է կատարել յերկու—յերեք ժամկետներով, վորպեսզի յերկրանդ ապահովես, պատրաստի շիթիլներով, ցուրտ յեղանակների կամ հողի պատրաստումը ուշանալու դեպքում տնկումը ձգձգելու կամ ուշացնելու դիմաց:

Ինչ վերաբերում է չոր հունտի ցանումը կարծրահող ածուներում, այդպիսիները շերմոցում ցանելու ժամկետից 2 շաբաթ շուտ—պետք է սկսել, վորովհետև չոր հունտերը բուսնում են 7 ուր ուշ, քան ծլեցնելով ցանելը: Յանել կարելի յե թե չոր և թե ծլեցրած հունտերով:

Յանքսը ծլած հունտով կատարելիս, շիթիլի բուսնելու ժամանակը կըրճատում ենք, որինակի համար՝ մի շաբաթով: Անբարենպաստ գաղնանը այս միջոցը միակն է հանդիսանում, վորպեսզի տնկելու ժամանակը բաց չլքողնվի:

Վստահությունամբ կարելի յե չոր հունտով ցանելը հանձնարարել: Այդպիսի ցանքսը տալիս է ավելի առողջ և դիմացկուն շիթիլներ, շրելու, ծածկելու ավելի քիչ աշխատանք է պահանջում: Չոր հունտ ցանելը ունի նաև յոր բացասական կողմեր, այսպես, անպետք բուսականությունը ավելի շուտ է աճում բան ծխախոտը, վորոնք թույլ արմատ են բռնել և հեշտությամբ մնապում են:

— ՀՈՒՆՏԻ ԾԼԵՑՈՒՄԸ.

Ծխախոտի հունտը ծլեցնելու լավագույն բարեխառնությունը համարվում է 25° սենտիգրով (կամ 31° ցելսիով):

Ծլեցնելու հունտերը վոչ այնքան մեծ, վոչ շատ խիտ տուրբակներին—վորոնց պարունակությունը 1 կիլոգրամից ավել չե և ավելի լավ է 0,5 կիլոգրամ—մեջ յցնելով 12 ժամ դնելու յե տաք, բայց վոչ յեռ, ջրի մեջ, թրջած հունտը ջրից հանելով, մաքուր ջրով դարձյալ պետք է լվանալ և ավելորդ ջուրը հեռացնելով տեղավորել տաք սենյակում, հունտի վրա մի բանով ծածկելու յե, վոր շատ չի չորանա: Շատ ոգտակար է հունտը ծլեցնել փոփոխական բարեխառնությամբ, այսինքն, մի առժամանակ բարեխառնությունը պակասեցնել 6—7°, այս դեպքում ուճացման տոկոսը բարձրանում է: Կա-



7488-53



րևոր ե նույնպես, վոր հետին ողբ մատչելի լինի, դրա համար խիտ ստալրակ ների մեջ չպետք ե լեցնել:

Շուտը կարելի չե ավարտած համարել, յերբ հունար ցույց ե տալիս սալիտակ ծիլեր: Այլևս պահել պետք չե, վորովհետև ծիլերը աճելիս հեշտու թյամբ կոտրվում են և ցանելիս իրար հետ շղթայվում են ու ջերմոցի մա կերեսի վրա անհավասարաչափ են բաժանվում:

— ԺԽՍԽՈՏԻ ՀՆՏԻ ՅԱՆԵԼԸ.

Նախ քան ցանելը, ջերմոցի յերեսը պետք ե լավ մանրել, հավասարեցնել և մի քիչ խտացնել տախտակի կամ թակի միջոցով: Միահավասար ցանելու համար ցանվելիք հետերը պետք ե խառնել ավազի կամ ջերմոցային խառնուրդի հետ, վորը ցանելու համար ե պատրաստած:

Ածուռ կամ ջերմոցը յերկայնությամբ դժով բաժանում են յերկու հավասար կեսերի, նախ ածուռի մի կեսն են ցանում, հետո մյուսը:

Վորպեսզի ցանելու չափը ուղիղ պահվի և միահավասար ցանվի, պետք ե մի ածուռի կամ ջերմոցի պահանջած չափով հունտ խառնել խառնուրդի հետ, վերև տրված քանակությամբ և ապա նույն հաշվով պատրաստել նույն տեսակ հունտի խառնուրդ ցանվելիք ամբողջ մակերեսի համար: Որինակի համար՝ ջերմոցում 45 քառ. մետր ցանելու համար, այսինքն. մի հեկտար տնկելու համար, պետք ե 45—50 գր. հունտ խառնել յերկու դույլ ջերմոցային խառնուրդի հետ:

Այդ քանակությամբ հնտախառն խառնուրդը ամբողջովին բավարար ե 45 քառ. մետր մակերես միահավասար ցանելու համար:

Հունտի հետ խառնվելիք բաղադրության հողը, բուսահողը կամ ջերմոցային խառնուրդը պետք ե չվարակված, փափկացրած լինի:

— ՅԱՆԻՍԻ ԺԱԺԿԵԼԸ.

Հատուկ ուշադրություն պետք ե դարձնել ցանքսի ծածկմանը: Ջերմոցում ցանելուց անմիջապես վերջ ցանվածքը ծածկելու չե մաղված, մանր, փոսած գոմաղբով կամ ջերմոցային խառնուրդով, վորը բաղկացած ե լինում 2 թի գոմաղբից, 1 թի ավազից և 1 թի հողից: Յանվածքը զգուշությամբ պետք ե խտացնել թափով:

Հունտի ծածկվածքի խորությունը, այսինքն ծածկելու համար փոված հողի շերտի հաստությունը պետք ե հավասար լինի 3—4 միլիմետրի (մատիտի հաստության կեսին):

Ավելի թանձր փովածքը բուսանելը ուշացնում ե և նույն իսկ կարող ե փճացնել, իսկ հունտը նոսր ծածկելիս ջրելու ժամանակ հունտը կհոսի և ցանքսը ճիշտ չի լինիր:

Ջերմանոցներում և ածուռներում ցանելուց հետո մանր անցքեր ունեցող ցնցուղով ջրելու չե և ծածկելու չե կախարիչով, փեղկերով, խաբրներով, նույն իսկ փայտյա տախտակիկներով կամ այդ նպատակով շինված նյութերով:

